

# ELEMENTI DI GEOMETRIA

E

## TRIGONOMETRIA

DEL SIG. LEGENDRE

MEMBRO DELL'ISTITUTO DI FRANCIA

E DELLA LEGION D'ONORE

EC. EC.

NUOVAMENTE TRADOTTI IN ITALIANO  
SULLA SETTIMA ED ULTIMA EDIZION DI PARIGI  
CON ALCUNE ADDIZIONI

---

FIRENZE

PRESSO GUGLIELMO PIATTI

MDCCCIX.





**ELEMENTI.**  
**DI GEOMETRIA**  
**DEL SIG. LEGENDRE**

**EC. EC.**





# L' EDITORE

## A CHI LEGGE

---

*Esce per la seconda volta dai torchj Toscani la Versione Italiana della GEOMETRIA di Legendre, ma unitamente alle Note, ed alla TRIGONOMETRIA piana e sferica del medesimo Autore, che non erano state tradotte nè pubblicate nella prima Edizione di Pisa. Questa seconda versione, che si pubblica adesso, è stata diligentemente fatta sul Testo Francese di Didot della VII.<sup>ma</sup> ed ultima Edizion di Parigi, che rispetto alle precedenti ha molte variazioni ed aggiunte del precitato celebratissimo Matematico. Per comodo degli Studenti s' è giudicato espediente divider l'Opera in due Volumi, riservando*

al II.° le Note, che oltrepassano comunemente la capacità degli Studiosi nel primo anno o nella prima lettura degli ELEMENTI, e le due TRIGONOMETRIE, che come quelle suppongono qualche notizia dell' ALGEBRA. In virtù di questa separazione restando pochissime cose nel I.° Volume scritte in carattere più minuto di quello del Testo andante, e gli Appendici segnatamente dei Libri IV.° e VII.° non rassembrando esser tali da rimandarsi a una seconda lettura, s' è preso il partito di non cambiar forma nè grandezza di carattere in tutto il suddetto Tomo I.° degli ELEMENTI, che vien ora alla luce. Atteso il consiglio d'alcuni dotti Geometri s'aggiunge alla TRIGONOMETRIA di Legendre la pregevolissima Memoria analoga del Principe degli Analisti Lagrange inserita nel Tomo II.° del Giornale della Scuola Politecnica pubblicato a Parigi nell' Anno VII.°, insieme con un compendio della Dissertazione sopra l'istesso argomento, che si legge nel Tomo XII.° degli Atti e Memorie della Società Italiana

delle Scienze col titolo di *PARALLELI EC.  
DELLE DUE TRIGONOMETRIE*, della qual ultima ne restano poche Copie vendibili nel Negozio Piatti in Firenze, unite ad altre sugli usi della Logistica nella costruzione degli Organi. Nulla s'è ommesso di diligenza perchè la traduzione riescisse letterale e fedele quanto poteva permetterlo il genio diverso delle due Lingue; i termini tecnici son quei medesimi adoperati da altri valenti Scrittori Toscani; le Tavole delle Figure sono state incise e corrette colla massima accuratezza possibile; nè s'è posta tampoco in dimenticanza nella soggetta materia didascalica la purità dello stile coerentemente alla sintassi, interpunzione, e chiarezza degli enunciati, costruzioni, e dimostrazioni geometriche. Tutto quello in somma, che poteva dipendere per'avventura dall'attenzione del traduttore; e dalla nitidezza e correzion della stampa, non è stato in uinaparte negletto, affinchè i Giovani Italiani, che s'iniziassero nelle Matematiche, s'assuefacessero di buonora a gustare

la rigorosa Sintesi degli Antichi , ch' è il maggiore e più commendevol pregio di questi ELEMENTI, i quali, come vera Logica universale, dovrebbero servire di Rudimenti preliminari a tutte le nobili Discipline, e Facoltà del sapere. Le replicate, e sempre applaudite Edizioni, che di là dai Monti, e in Italia sonosi succedute rapidamente, attestano a un tempo e l'universale accoglienza dell' Opera, che ora si riproduce; e l'utilità della pubblica Istruzione sperimentatane dalle Scuole, Accademie, e Licei mercè delle dotte fatiche impiegate in comporla, accrescerla, e riordinarla dal rispettabile Autore.

---

# ELEMENTI DI GEOMETRIA

## LIBRO PRIMO.

### I PRINCIPI

#### DEFINIZIONI

1. La Geometria è una scienza, che ha per oggetto la misura dell'estensione.

L'estensione ha tre dimensioni, lunghezza, larghezza, ed altezza.

2. La *Linea* è una lunghezza senza larghezza.

Le estremità d'una linea si chiamano *punti*: il punto non ha dunque alcuna estensione.

3. La *Linea retta* è il più corto cammino da un punto a un altro.

4. Ogni linea, che non è retta, nè composta di linee rette, è una *linea curva*.

Così AB è una linea retta, ACDB una *Fig. 1.*  
linea spezzata, o composta di linee rette, e  
AEB è una linea curva.

5. *Superficie* è ciò che ha lunghezza, e larghezza senza altezza, o grossezza.

6. Il *Piano* è una superficie, nella quale prendendo due punti a piacere, e unendo questi due punti con una linea retta, questa linea sta tutta nella superficie.

7. Ogni superficie, che non è piana, nè composta di superficie piane, è una *superficie curva*.

8. *Solido*, o *Corpo* è ciò che riunisce le tre dimensioni dell'estensione.

Fig. 2. 9. Quando due linee rette AB, AC s'incontrano, la quantità più o meno grande, di cui sono distanti quanto alla lor posizione, l'una dall'altra si chiama *angol.*; il punto d'incontro, o d'intersezione A è il *vertice* dell'angolo, le linee AB, AC ne sono i *lati*.

L'angolo s'indica talora colla sola lettera del vertice A, talora con tre lettere BAC o CAB, osservando di porre in mezzo la lettera del detto vertice. Gli angoli sono, come tutte le quantità, suscettibili d'addizione, di sottrazione, di moltiplicazione, e di divisione: così l'angolo DCE è la somma dei due angoli DCB, BCE, e l'angolo DCB è la differenza dei due angoli DCE, BCE..

Fig. 3. 10. Quando la linea retta AB incontra un'altra linea CD talmente che gli angoli adiacenti BAC, BAD siano uguali fra loro, ognuno di questi angoli si chiama un *angolo retto*, e la linea AB vien detta *perpendicolare* sopra CD.

Fig. 4. 11. Ogni angolo BAC minore d'un angolo retto è un *angolo acuto*; ogni angolo maggiore DEF è un *angolo ottuso*.

12. Due linee si dicono *parallele* quando Fig. 5. essendo situate nel medesimo piano non possono incontrarsi fra loro, benchè si prolunghino ambedue a qualunque distanza.

13. *Figura piana* è un piano terminato per ogni parte da linee.

Se le linee sono rette, lo spazio che esse Fig. 6. racchiudono si chiama *figura rettilinea*, o *poligono*, e le linee stesse prese insieme formano il contorno o *perimetro* del poligono.

14. Il poligono di tre lati è il più semplice di tutti, e si chiama *triangolo*; quello di quattro lati si chiama *quadrilatero*; quello di cinque *pentagono*; quello di sei *esagono*, &c.

15. Si chiama *triangolo equilatero* quello Fig. 7. che ha i tre lati uguali; *triangolo isoscele* Fig. 8. quello di cui due soli lati sono uguali; *triangolo scaleno* quello che ha i tre lati disuguali Fig. 9.

16. Il *triangolo rettangolo* è quello che ha Fig. 10. un angolo retto. Il lato opposto all'angolo retto si chiama *ipotenusa*. Così ABC è un triangolo rettangolo in A, e il lato BC è la di lui *ipotenusa*; e CA, BA sono i *cateri*.

17. Fra i quadrilateri si distingue:

Il *quadrato*, che ha i lati uguali, e gli angoli retti. (Vedete la Prop. XXI. lib. I.) Fig. 11.

Il *rettangolo* che ha gli angoli retti senz'aver Fig. 12. i lati uguali. (Vedete la medesima Proposizione).

Il *parallelogrammo* o *Romboide* che ha Fig. 13. lati opposti paralleli.

Il *Rombo*, i di cui lati sono uguali senza Fig. 14. che gli angoli siano retti.

(a) e gli altri due formanti l'angolo retto si chiamano Cateri.

W. del Traduttore

Fig. 15. Finalmente il *Trapezio* di cui due soli lati son paralleli.

18. Si chiama *diagonale* la linea che unisce i vertici di due angoli non adiacenti:

Fig. 42. tale è AC.

19. Poligono *equilatero* è quello di cui tutti i lati sono uguali; Poligono *equiangolo* quello di cui tutti gli angoli sono uguali.

20. Due Poligoni sono *equilateri fra loro* quando hanno i lati uguali rispettivamente, e situati nel medesimo ordine, vale a dire, allorchè seguitando il loro contorno pel medesimo verso il primo lato dell'uno è eguale al primo dell'altro, il secondo dell'uno al secondo dell'altro, il terzo al terzo, e così di seguito. Nella stessa maniera si concepisce cosa s'intende per due Poligoni *equiangoli fra loro*.

In ambedue i casi i lati uguali o gli angoli uguali si chiamano lati o angoli *omologhi*.

N. B. Ne' quattro primi Libri non si tratterà che delle figure piane, o fatte sopra una superficie piana.

*Spiegazione de' termini, e de' segni.*

*Assioma* è una proposizione evidente da per se stessa.

*Teorema* è una verità che diviene evidente per mezzo d'un ragionamento chiamato *dimostrazione*.

*Problema* è una questione proposta che esige una *soluzione*.

*Lemma* è una verità impiegata sussidiaria-



mente per la dimostrazione d'un teorema, o la soluzione d'un problema. \*

Il nome comune di *proposizione* si attribuisce indifferentemente ai teoremi, problemi, e lemmi.

*Corollario* è la conseguenza che deriva da una o più Proposizioni.

*Scolio* è un'osservazione sopra una o più Proposizioni precedenti, tendente a far vedere il loro legame, la loro utilità, la loro restrizione, o la loro maggiore estensione.

*Ipotesi* è una supposizione fatta o nell'enunciato d'una Proposizione, o nel corso d'una dimostrazione.

Il segno  $=$  è il segno dell'uguaglianza; così l'espressione  $A=B$  significa che  $A$  è uguale a  $B$ .

Per esprimere che  $A$  è minore di  $B$ , si scrive  $A < B$ .

Per esprimere che  $A$  è maggiore di  $B$ , si scrive  $A > B$ .

Il segno  $+$  si pronunzia *più*, e indica l'addizione.

Il segno  $-$  si pronunzia *meno*, e indica la sottrazione. Così  $A+B$  rappresenta la somma delle quantità  $A$  e  $B$ ;  $A-B$  rappresenta la loro differenza, o ciò che resta togliendo  $B$  da  $A$ : così  $A-B+C$ , o  $A+C-B$  significa che  $A$  e  $C$  debbono essere aggiunte insieme, e che  $B$  dev'esser tolta dal totale.

Il segno  $\times$  indica la moltiplicazione; così  $A \times B$  rappresenta il prodotto d' $A$  moltiplicato per  $B$ . In vece del segno  $\times$  si adopera talora un punto; così  $A . B$  è lo stesso che  $A \times B$ . S'indica ancora il medesimo prodotto senza alcun

segno intermedio da  $AB$ ; ma non bisogna impiegare questa espressione che quando non si ha nel medesimo tempo da impiegare come fattore la linea  $AB$ , distanza dei punti  $A$  e  $B$ .

L'espressione  $A \times (B+C-D)$  indica il prodotto di  $A$  per la quantità  $B+C-D$ . Se bisognasse moltiplicare  $A+B$  per  $A-B+C$ , s'indicherebbe il prodotto così  $(A+B) \times (A-B+C)$ . Tutto ciò che è rinchiuso tra parentesi è considerato come una sola quantità.

Un numero posto innanzi a una linea o a una quantità serve di moltiplicatore a questa linea o a questa quantità; così, per esprimere che la linea  $AB$  è presa tre volte, si scrive  $3AB$ ; per indicare la metà dell'angolo  $A$ , si scrive  $\frac{1}{2} A$ .

Il quadrato della linea  $AB$  s'indica con  $\overline{AB}^2$ ; il suo cubo con  $\overline{AB}^3$ . Si spiegherà a suo luogo ciò che significa propriamente il quadrato, e il cubo d'una linea.

Il segno  $\sqrt{\phantom{x}}$  indica una radice da estrarsi: così  $\sqrt{2}$  è la radice quadrata di 2;  $\sqrt{A \times B}$  è la radice del prodotto  $A \times B$ , o la media proporzionale tra  $A$  e  $B$ .

#### ASSIOMI

1. Due quantità uguali a una terza sono uguali fra loro.
2. Il tutto è maggiore della sua parte.
3. Il tutto è uguale alla somma delle parti, nelle quali è stato diviso.

4. Da un punto a un altro non si può condurre che una sola linea retta.

5. Due grandezze, linee, superficie, o solidi, sono uguali allorchè, essendo situate l'una sull'altra, coincidono in tutta la loro estensione

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA

*Gli angoli retti sono tutti eguali fra loro.*

Sia la linea retta  $CD$  perpendicolare ad  $AB$  e  $GH$  ad  $EF$ , dico che gli angoli  $ACD$ ,  $EGH$  saranno uguali fra loro. Fig. 16.

Prendete le quattro distanze uguali  $CA$ ,  $CB$ ,  $GE$ ,  $GF$ , la distanza  $AB$  sarà uguale alla distanza  $EF$ , e si potrà situare la linea  $EF$  sopra  $AB$  in maniera che il punto  $E$  cada in  $A$ , e il punto  $F$  in  $B$ . Queste due linee così situate coincideranno intieramente l'una con l'altra; poichè altrimenti vi sarebbero due linee rette da  $A$  a  $B$ , il che è impossibile \*; \* Ass. 4. dunque il punto  $G$  mezzo di  $EF$  cadrà sul punto  $C$  mezzo d' $AB$ . Essendo così il lato  $GE$  applicato sopra  $CA$ , dico che il lato  $GH$  cadrà sopra  $CD$ ; poichè supponiamo, s'è possibile, che cada sopra una linea  $CK$  differente da  $CD$ ; siccome, per supposizione \*, l'angolo  $EGH = HGF$ , bisognerebbe che fosse  $ACK = KCB$ . Ma l'angolo  $ACK$  è maggiore di  $ACD$ , e l'angolo  $KCB$  è minore di  $BCD$ ; d'altronde, per supposizione,  $ACD = BCD$ ; dunque  $ACK$  è maggiore di  $KCB$ ; dunque la linea  $GH$  non può cadere sopra una linea  $CK$  diffe- Dcf. 10.

tente da CD; dunque essa cade sopra CD, e l'angolo EGH sopra ACD; dunque tutti gli angoli retti sono uguali fra loro.

### PROPOSIZIONE II.

#### TEOREMA

**Fig. 17.** *Ogni linea retta CD che ne incontra un'altra AB, fa con questa due angoli adiacenti ACD, BCD, la di cui somma è uguale a due angoli retti.*

Dal punto C alzate sopra AB la perpendicolare CE. L'angolo ACD è la somma degli angoli ACE, ECD; dunque  $ACD + BCD$  sarà la somma de' tre ACE, DCE, BCD. Il primo di questi è retto, gli altri due fanno insieme l'angolo retto BCE dunque la somma dei due angoli ACD, BCD è uguale a due angoli retti.

*Corollario I.* Se uno degli angoli ACD, BCD è retto, l'altro lo sarà parimente.

**Fig. 18.** *Corollario II.* Se la linea DE è perpendicolare ad AB, reciprocamente AB sarà perpendicolare a DE.

Poichè dall'esser DE perpendicolare ad AB ne segue che l'angolo ACD è uguale al suo adiacente DCB, e che sono ambedue retti. Ma dall'essere ACD un angolo retto ne segue che il suo adiacente ACE è pure un angolo retto: dunque  $ACE = ACD$ ; dunque AB è perpendicolare a DE.

**Fig. 34.** *Corollario III.* Tutti gli angoli consecutivi BAC, CAD, DAE, EAF, formati da una medesima parte della retta BF, presi insieme, valgono due angoli retti, perchè la loro somma è eguale a quella dei due angoli BAC, CAF.

## PROPOSIZIONE III.

## TEOREMA

*Due linee rette, che hanno due punti comuni, coincidono l'una coll'altra in tutta la loro estensione, e non formano che una sola e medesima linea*

Siano i due punti comuni A e B; prima di tutto le due linee non ne devono formare che una sola fra A e B, poichè altrimenti vi sarebbero due linee rette da A a B, il che è impossibile\*. Supponiamo in seguito che queste linee, essendo prolungate, comincino a separarsi al punto C, l'una divenendo CD, l'altra CE. Conduciamo al punto C la linea CF che faccia con CA l'angolo retto BCF. Poichè la linea ACD è retta, l'angolo FCD sarà un angolo retto\*; poichè la linea ACE è retta, l'angolo FCE sarà parimente un angolo retto. Ma la parte FCE non può essere uguale al tutto FCD; dunque le linee rette, che hanno due punti A e B comuni, non possono separarsi in verun punto del loro prolungamento; dunque non formano che una sola e medesima linea retta.

## PROPOSIZIONE IV.

## TEOREMA

*Se due angoli adiacenti ACD, DCB equivalgono insieme a due angoli retti, i due lati AC, CB saranno in linea retta.*

Poichè se CB non è il prolungamento di AC, sia CE questo prolungamento; allora essendo retta la linea ACE, la somma degli

angoli  $ACD$ ,  $DCE$  sarà uguale a due retti.

Ma, per supposizione, la somma degli angoli  
 \* Pr. 2.  $ACD$ ,  $DCB$  è pure uguale a due retti; \* dunque  $ACD + DCB$  sarebbe uguale ad  $ACD + DCE$ ; togliendo da ambe le parti l'angolo  $ACD$ , resterebbe  $DCB = DCE$ , o la parte uguale al tutto, il che è impossibile. Dunque  $CB$  è il prolungamento d'  $AC$ .

### PROPOSIZIONE V.

#### TEOREMA

Fig. 21. *Tutte le volte che due linee rette  $AB$ ,  $DE$  si tagliano, gli angoli opposti al vertice sono uguali.*

Poichè, siccome la linea  $DE$  è retta, la somma degli angoli  $ACD$ ,  $ACE$  è uguale a due retti; e siccome la linea  $AB$  è retta, la somma degli angoli  $ACE$ ,  $BCE$  è pure uguale a due retti. Dunque la somma  $ACD + ACE$  è uguale alla somma  $ACE + BCE$ . Togliendo da ambe le parti lo stesso angolo  $ACE$ , resterà l'angolo  $ACD$  uguale al suo opposto  $BCE$ .

Si dimostrerebbe medesimamente che l'angolo  $ACE$  è uguale al suo opposto  $BCD$ .

*Scglie.* I quattro angoli formati intorno a un punto da due rette che si tagliano, equivalgono insieme a quattro angoli retti. Poichè gli angoli  $ACE$ ,  $BCE$  presi insieme equivalgono a due angoli retti; e gli altri due  $ACD$ ,  $BCD$  hanno lo stesso valore.

Fig. 22. In generale, se quante si vogliano rette  $CA$ ,  $CB$  ec. s' incontrano in un punto  $C$ , la somma di tutti gli angoli consecutivi  $ACB$ ,  $BCD$ ,  $DCE$ ,  $ECF$ ,  $FCA$  sarà uguale a quattro an-

goli retti. Poichè se si formassero al punto C quattro angoli retti col mezzo di due linee perpendicolari fra loro, lo stesso spazio sarebbe occupato tanto da quattro angoli retti, che dagli angoli successivi ACB, BCD ec.

## PROPOSIZIONE VI.

## TEOREMA

*Due triangoli sono uguali quando hanno un angolo uguale compreso tra lati rispettivamente uguali.*

Sia l'angolo A uguale all'angolo D, il lato AB uguale a DE, il lato AC uguale a DF; dico che i triangoli ABC, DEF saranno uguali.

In fatti questi triangoli possono esser posti l'uno sull'altro in maniera che coincidano perfettamente. E in primo luogo, se si pone il lato DE sul suo uguale AB, il punto D cadrà in A, e il punto E in B. Ma poichè l'angolo D è uguale all'angolo A, subito che DE sarà situato sopra AB, il lato DF prenderà la direzione AC. Di più DF è uguale ad AC; dunque il punto F cadrà in C, e il terzo lato EF coprirà esattamente il terzo lato BC, dunque il triangolo DEF è uguale al triangolo ABC. As. 5.

*Corollario.* Dunque, dall'essere uguali tre cose in due triangoli; cioè, l'angolo  $A=D$ ,  $AB=DE$ ,  $AC=DF$ , si può conchiudere che le altre tre lo son pure, cioè, l'angolo  $B=E$ , l'angolo  $C=F$ , e il lato  $BC=EF$ .

## PROPOSIZIONE VII.

## TEOREMA

*Due triangoli sono uguali quando hanno*

*un lato uguale adiacente a due angoli rispettivamente uguali.*

Fig. 23. Sia il lato BC uguale al lato EF, l'angolo B uguale all'angolo E, e l'angolo C all'angolo F; dico che il triangolo DEF sarà uguale al triangolo ABC.

Poichè, per eseguire la sovrapposizione, sia situato EF sul suo uguale BC, il punto E cadrà in B, e il punto F in C. Poichè l'angolo E è uguale all'angolo B, il lato ED prenderà la direzione di BA, onde il punto D si troverà su qualche punto della linea BA. Così, poichè l'angolo F è uguale all'angolo C, la linea FD prenderà la direzione di CA, e il punto D si troverà su qualche punto del lato CA; dunque il punto D, che dee trovarsi a un tempo stesso sulle due linee BA, CA, cadrà sulla loro intersezione A; dunque i due triangoli ABC, DEF coincidono l'uno coll'altro, e sono perfettamente uguali.

*Corollario.* Dunque dall'essere uguali tre cose in due triangoli, cioè,  $BC=EF$ ,  $B=E$ ,  $C=F$ , si può conchiudere che le tre altre son pure uguali, cioè,  $AB=DE$ ,  $AC=DF$ ,  $A=D$ .

## PROPOSIZIONE VIII.

### TEOREMA

*In un triangolo un lato qualunque è minore della somma degli altri due.*

Fig. 23. Poichè la linea retta BC, per esempio, è  
 \*Def. 3. il più corto cammino da B in C, \* ne vien che BC è minore di  $BA+AC$ .



## PROPOSIZIONE IX.

## TEOREMA

*Se da un punto O preso dentro al trian- Fig. 24.  
golo ABC si conducono alle estremità d'un  
lato BC le linee rette OB, OC, la somma di  
queste linee sarà minore di quella degli altri  
due lati AB, AC.*

Sia prolungato BO finchè incontri il lato AC in D; la linea retta OC è più corta di OD+DC; aggiungendo da ambe le parti BO, si avrà  $BO+OC < BO+OD+DC$ , o  $BO+OC < BD+DC$ .

Si ha parimente  $BD < BA+AD$ ; aggiun-  
gendo da ambe le parti DC, si avrà  $BD+DC < BA+AC$ . Ma avevamo trovato  $BO+OC < BD+DC$ ; dunque con maggior ragione  $BO+OC < BA+AC$ .

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA

*Se i due lati AB, AC del triangolo ABC so- Fig. 25.  
no uguali rispettivamente ai due lati DE, DF  
del triangolo DEF, e se nel tempo stesso l'an-  
golo BAC compreso da' primi è maggiore  
dell'angolo EDF compreso da' secondi, dico  
che il terzo lato BC del primo triangolo sarà  
maggiore del terzo EF del secondo.*

Fate l'angolo  $CAG=D$ , prendete  $AG=DE$ , e tirate CG; il triangolo GAC sarà uguale al triangolo DEF, giacchè hanno, per costruzione, un angolo uguale compreso fra lati uguali; \* si avrà dunque  $CG=EF$ . Ora \* Pr. 6. possono darsi tre casi secondo che il punto

**G** cade fuori del triangolo  $ABC$ , o sul lato  $BC$ , o dentro del medesimo triangolo.

Fig. 25. *Primo caso.* La linea retta  $GC$  è più corta di  $GI+IC$ ; la linea retta  $AB$  è più corta di  $AI+IB$ ; dunque  $GC+AB$  è più corta di  $GI+AI+IC+IB$ , o, ciò che torna lo stesso,  $GC+AB < AG+BC$ . Togliendo da una parte  $AB$ , e dall'altra la sua uguale  $AG$ , resterà  $GC < BC$ ; ma  $GC=EF$ ; dunque  $EF < BC$ .

Fig. 26. *Secondo caso.* Se il punto  $G$  cade sul lato  $BC$ , è chiaro che  $GC$ , o la sua uguale  $EF$  sarà minor di  $BC$ .

Fig. 27. *Terzo caso.* Se il punto  $G$  cade dentro il triangolo  $ABC$ , si avrà, per il teorema precedente,  $AG+GC < AB+BC$ . Togliendo da una parte  $AG$ , e dall'altra la sua uguale  $AB$ , resterà  $GC < BC$ , o  $EF < BC$ .

## PROPOSIZIONE XI.

### TEOREMA

*Due triangoli sono eguali allorchè hanno i tre lati rispettivamente eguali.*

Fig. 23. Sia il lato  $AB=DE$ ,  $AC=DF$ ,  $BC=EF$ ; dico che sarà l'angolo  $A=D$ ,  $B=E$ ,  $C=F$ .

Poichè, se l'angolo  $A$  fosse maggiore dell'angolo  $D$ , siccome i lati  $AB$ ,  $AC$  sono rispettivamente uguali ai lati  $DE$ ,  $DF$ , ne seguirebbe per il teorema precedente che il lato  $BC$  sarebbe maggiore di  $EF$ ; e se l'angolo  $A$  fosse minore di  $D$ , ne seguirebbe che il lato  $BC$  sarebbe minore di  $EF$ ; ma  $BC$  è uguale ad  $EF$ ; dunque l'angolo  $A$  non può essere nè maggiore nè minore dell'angolo  $D$ ; dunque gli è uguale. Si proverà nello stesso

modo che l'angolo  $B=E$ , e che l'angolo  $C=F$ .

*Scolio.* Si può osservare che gli angoli uguali sono opposti ai lati uguali. Così gli angoli uguali  $A$ , e  $D$  sono opposti ai lati uguali  $BC$ ,  $EF$ .

## PROPOSIZIONE XII.

## TEOREMA

*In un triangolo isoscele gli angoli opposti ai lati uguali sono uguali.*

Sia il lato  $AB=AC$ ; dico che sarà l'angolo  $B=C$ . Fig. 23.

Tirate la linea  $AD$  dal vertice  $A$  al punto  $D$  mezzo della base  $BC$ ; i due triangoli  $ABD$ ,  $ADC$  avranno i loro tre lati rispettivamente uguali, cioè,  $AD$  comune,  $AB=AC$  per supposizione, e  $BD=DC$  per costruzione; dunque, in virtù del teorema precedente, l'angolo  $B$  è uguale all'angolo  $C$ .

*Corollario.* Un triangolo equilatero è nel medesimo tempo equiangolo, cioè ha tutti i suoi angoli uguali.

*Scolio.* L'uguaglianza de' triangoli  $ABD$ ,  $ACD$  prova nel tempo stesso che l'angolo  $BAD=DAC$ ; e che l'angolo  $BDA=ADC$ ; dunque questi due ultimi sono retti; dunque la retta condotta dal vertice d'un triangolo isoscele al mezzo della sua base è perpendicolare alla base, e divide l'angolo al vertice in due parti uguali.

In un triangolo non isoscele si prende indifferentemente per base un lato qualunque,



ed allora il *vertice* è quello dell' angolo opposto. Nel triangolo isoscele si prende particolarmente per *base* il lato, che non è uguale agli altri.

## PROPOSIZIONE XIII.

## TEOREMA

*Reciprocamente, se due angoli sono uguali in un triangolo, i lati opposti saranno pure uguali, e il triangolo sarà isoscele.*

Sia l'angolo  $ABC = ACB$ ; dico che il lato  
Fig. 29.  $AC$  sarà uguale al lato  $AB$ .

Poichè, se questi lati non sono uguali sia  $AB$  il maggiore d'essi. Prendete  $BD = AC$ , e tirate  $DC$ . L'angolo  $DBC$  è, per supposizione, uguale all'angolo  $ACB$ ; i due lati  $DB$ ,  $BC$  sono uguali ai due  $AC$ ,  $BC$ ; dunque il triangolo  $DBC$  \* sarebbe eguale al triangolo  $ACB$ : ma la parte non può essere eguale al tutto; dunque non vi è inegualianza tra i lati  $AB$ ,  $AC$ ; dunque il triangolo  $ABC$  è isoscele

## PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA

*Di due lati d'un triangolo il maggiore è quello, che è opposto ad un angolo maggiore, e reciprocamente di due angoli d'un triangolo il maggiore è quello, che è opposto ad un lato maggiore.*

Fig. 30. 1.° Sia l'angolo  $C > B$ ; dico che il lato  $AB$  opposto all'angolo  $C$  è maggiore del lato  $AC$  opposto all'angolo  $B$ .

Sia fatto l'angolo  $BCD = B$ ; nel triangolo

BDC si avrà \*  $BD=DC$ . Ma la linea retta \*Pr. 13. AC è più corta di  $AD+DC$ , e  $AD+DG = AD+DB=AB$ . Dunque AB è maggiore d'AC.

2.° Sia il lato  $AB > AC$ ; dico che l'angolo C opposto al lato AB sarà maggiore dell'angolo B opposto al lato AC.

Poichè, se fosse  $C < B$ , seguirebbe da ciò, che si è dimostrato, che AB sarebbe minore d'AC; il che è contro della supposizione. Se poi fosse  $C=B$ , sarebbe \*  $AB=AC$ ; il che \*Pr. 13. è pure contro della supposizione. Dunque bisogna che l'angolo C sia maggiore di B.

## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA

*Da un punto dato A fuori d'una retta DE Fig. 31. non si può condurre che una sola perpendicolare a questa retta.*

Poichè supponiamo che se ne possano condurre due AB, e AC; prolunghiamo una d'esse AB d'una lunghezza  $BF=AB$ , e tiriamo FC.

Il triangolo CBF è uguale al triangolo ABC, poichè l'angolo CBF è retto, come pure CBA, il lato CB è comune, e il lato  $BF=AB$ . Dunque questi triangoli sono uguali \*; e ne \*Pr. 6. segue che l'angolo  $BCF=BCA$ . L'angolo BCA è retto, per supposizione; dunque l'angolo BCF lo è pure. Ma se gli angoli adiacenti BCA, BCF equivalgono insieme a due angoli retti, bisogna che la linea ACF sia retta \*; \*Pr. 4. donde resulta che fra i due medesimi punti A, e F si potrebbero condurre due linee rette ABF, ACF, il che è impossibile \*; dunque \*Ass. 4.

è parimente impossibile che da un medesimo punto sian condotte due perpendicolari sulla medesima linea data.

Fig. 17. *Scolio.* Da un medesimo punto C dato sopra la linea AB è egualmente impossibile di condurre due perpendicolari a questa linea: perchè se CD, e CE fossero queste due perpendicolari, l'angolo DCB sarebbe retto, come pure BCE, e la parte sarebbe eguale al tutto.

### PROPOSIZIONE XVI.

#### TEOREMA .

Fig. 31. *Se da un punto A situato fuori d'una retta DE si conducono la perpendicolare AB su questa retta, e differenti oblique AE, AC, AD, ec. a differenti punti di questa medesima retta,*

1.° *La perpendicolare AB sarà più corta d'ogni obliqua.*

2.° *Le due oblique AC, AE, condotte da una parte e dall'altra della perpendicolare a distanze uguali BC, BE, saranno uguali.*

3.° *Di due oblique AC e AD, o AE e AD, condotte come si vorrà, quella, che si allontani di più dalla perpendicolare, sarà la più lunga.*

Sia prolungata la perpendicolare AB d'una lunghezza  $BF=AB$ , e siano tirate FC, FD.

1.° Il triangolo BCF è uguale al triangolo BCA, perchè l'angolo retto  $CBF=CBA$ , il lato CB è comune, e il lato  $BF=BA$ ;

\*Pr. 6 dunque \* il terzo lato CF è uguale al terzo AC. Ora ABF linea retta è più corta d'ACF

linea spezzata; dunque  $AB$  metà d' $ABF$  è più corta d' $AC$  metà d' $ACF$ ; dunque 1.° la perpendicolare è più corta d'ogni obliqua.

2.° Se si suppone  $BE=BC$ , siccome si hanno inoltre  $AB$  comune, e l'angolo  $ABE=ABC$ , ne segue che il triangolo  $ABE$  è uguale al triangolo  $ABC$ . Dunque i lati  $AE$ ,  $AC$  sono uguali. Dunque 2.° due oblique, che sono lontane ugualmente dalla perpendicolare, sono uguali.

3.° Nel triangolo  $ADF$  la somma delle linee  $AC$ ,  $CF$  è minore \* della somma de' lati  $AD$ ,  $DF$ . Dunque  $AC$ , metà della linea  $ACF$ , è minore d' $AD$ , metà di  $ADF$ . Dunque 3.° le oblique, che sono più lontane dalla perpendicolare, son le più lunghe.

*Corollario I.* La perpendicolare misura la vera distanza d'un punto da una linea, poichè è la più corta d'ogni obliqua.

*Corollario II.* Da un medesimo punto non si possono condurre a una medesima linea tre rette uguali. Poichè, se ciò fosse, vi sarebbero da una medesima parte della perpendicolare due oblique uguali; il che è impossibile.

## PROPOSIZIONE XVII.

### TEOREMA

*Se dal punto C, mezzo della linea AB, si Fig. 32.  
alza su questa linea la perpendicolare EF;  
1.° ogni punto della perpendicolare sarà ugualmente distante dalle due estremità della linea AB; 2.° ogni punto fuori della perpen-*

*perpendicolare sarà disugualmente distante dalle medesime estremità A, e B.* ✕

Poichè 1.<sup>o</sup> siccome si suppone  $AC=CB$ , le due oblique  $AD$ ,  $DB$  s'allontanano ugualmente dalla perpendicolare; dunque sono uguali: lo stesso accade delle due oblique  $AE$ ,  $EB$ , delle due  $AF$ ,  $FB$  ec. Dunque 1.<sup>o</sup> ogni punto della perpendicolare è ugualmente distante dalle estremità  $A$ , e  $B$ .

2.<sup>o</sup> Sia  $I$  un punto fuori della perpendicolare; se si tirano  $IA$ ,  $IB$ , una di queste linee taglierà la perpendicolare in  $D$ , d'onde tirando  $DB$  si avrà  $DB=DA$ . Ma la linea retta  $IB$  è più corta che la linea spezzata  $ID+DB$ , e  $ID+DB=ID+DA=IA$ ; dunque  $IB<IA$ ; dunque 2.<sup>o</sup> ogni punto fuori della perpendicolare sarà disugualmente distante dalle estremità  $A$ , e  $B$ .

### PROPOSIZIONE XVIII.

#### TEOREMA

*Due triangoli rettangoli sono uguali quando hanno l'ipotenusa uguale, e un lato uguale.*

Fig. 33. Sia l'ipotenusa  $AC=DF$ , e il lato  $AB=DE$ ; dico che il triangolo rettangolo  $ABC$  sarà uguale al triangolo rettangolo  $DEF$ .

L'uguaglianza sarebbe manifesta se il terzo lato  $BC$  fosse uguale al terzo  $EF$ . Supponiamo, s'è possibile, che questi lati non siano uguali, e che  $BC$  sia il maggiore. Prendete  $BG=EF$ , e tirate  $AG$ . Il triangolo  $ABG$  è uguale al triangolo  $DEF$ , perchè l'angolo retto  $B$  è uguale all'angolo retto  $E$ , il lato



$AB=DE$ , e il lato  $BG=EF$ ; dunque questi due triangoli sono uguali \*, e si ha per \* Pr. 6. conseguenza  $AG=DF$ : ma, per supposizione,  $DF=AC$ ; dunque  $AG=AC$ . Oltracciò l'obliqua  $AC$  non può essere uguale ad  $AG$  \*, \* Pr. 16. giacchè è più lontana dalla perpendicolare  $AB$ ; dunque è impossibile che  $BC$  differisca da  $EF$ ; dunque il triangolo  $ABC$  è uguale al triangolo  $DEF$ .

## PROPOSIZIONE XIX.

## L E M M A

*La somma dei tre angoli d'un triangolo non può esser maggiore di due angoli retti.*

Sia, se è possibile,  $ABC$  un triangolo, nel Fig. 35. quale la somma dei tre angoli è più grande di quella di due angoli retti.

Sopra  $AC$  prolungata prendete  $CE=AC$ ; fate l'angolo  $ECD=CAB$ , e il lato  $CD=AB$ ; unite  $DE$ , e  $BD$ . Il triangolo  $CDE$  sarà eguale al triangolo  $BAC$ , poichè essi hanno un angolo eguale compreso tra lati rispettivamente eguali \*; dunque si avrà l'angolo \* Pr. 6.  $CED=ACB$ , l'angolo  $CDE=ABC$ , e il terzo lato  $ED$  eguale al terzo  $BC$ .

Poichè la linea  $ACE$  è retta, la somma degli angoli  $ACB$ ,  $BCD$ ,  $DCE$  è eguale a due angoli retti \*; ma si suppone la somma degli angoli del triangolo maggiore di due retti; si avrà dunque  $CAB+ABC+ACB > ACB+BCD+ECD$ ; togliendo da ambe le parti  $ACB$  comune, e  $CAB=ECD$ , resterà  $ABC > BCD$ ; e perchè i lati  $AB, BC$  del triangolo  $ABC$  sono eguali

\* Pr. 2.  
Cor. 3.

ai lati CD, CB del triangolo BCD, ne segue che il terzo lato AC è più grande che  
 \*Pr. 10. il terzo BD\*.

Immaginiamo adesso che si prolunghi indefinitamente la linea AC, come pure la serie dei triangoli ABC, CDE, EFG, GHI, ec.; se si uniscono i vertici più vicini con le rette BD, DF, FH, HK, ec. si formerà nel medesimo tempo una serie di triangoli intermedj BCD, DEF, FGH, ec. che saranno tutti eguali tra loro, perchè avranno un angolo eguale compreso tra lati eguali rispettivamente; dunque si avrà  $BD=DF=FH=HK$ , ec.

Ciò posto, poichè si ha  $AC > BD$ , sia la differenza  $AC-BD=D$ ; è chiaro che  $2D$  sarà la differenza tra la linea retta ACE eguale a  $2AC$ , e la linea retta o spezzata BDF eguale a  $2BD$ ; di maniera che si avrà  $AE-BF=2D$ . Si avrà parimente  $AG-BH=3D$ ,  $AI-BK=4D$ , e così di seguito. Ora, per quanto piccola sia la differenza  $D$ , è evidente che questa differenza, ripetuta un numero di volte sufficiente diverrà più grande di una lunghezza qualunque data. Si potrà dunque supporre la serie dei triangoli prolungata tanto lontano finchè si abbia  $AP-BQ > 2AB$ ; e così si avrebbe  $AP > BQ+2AB$ . Ma per il contrario la linea retta AP è più corta che la linea angolosa ABQP, che unisce le medesime estremità A e P, in modo che si avrà sempre  $AP < AB+BQ+QP$ , ovvero  $AP < BQ+2AB$ ; dunque l'ipotesi, da cui siamo partiti, è assurda;

dunque la somma de' tre angoli del triangolo ABC non può esser più grande di due angoli retti.

## PROPOSIZIONE XX.

## TEOREMA

*In qualunque triangolo la somma dei tre angoli è uguale a quella di due angoli retti.*

Avendo di già provato che la somma dei tre angoli d'un triangolo non può esser maggiore di due angoli retti, resta da dimostrare che questa somma non può esser più piccola di due angoli retti.

Sia ABC il triangolo proposto, o sia, se è Fig. 35.<sup>a</sup> possibile, la somma dei suoi angoli  $= 2P - Z$ , P indicando un angolo retto, e Z essendo la quantità angolare qualunque, di cui si suppone che la somma degli angoli sia più piccola di due angoli retti.

Sia A il più piccolo degli angoli del triangolo ABC; sopra il lato opposto BC fate l'angolo  $BCD = ABC$ , e l'angolo  $CBD = ACB$ ; i triangoli BCD, ABC saranno eguali, perchè hanno un lato eguale BC adiacente a due angoli rispettivamente eguali \*. Per il \* Pr. 7. punto D tirate una linea retta qualunque EF, che incontri in E, ed F i due lati dell'angolo A prolungati (1).

---

(1) Si suppone che l'angolo A è il più piccolo del triangolo ABC, e che in conseguenza è minore o non maggior che due terzi d'angolo retto affine di

Poichè la somma degli angoli di ciascun dei triangoli ABC, BCD è  $2P - Z$ , e quella di ciascun dei triangoli EBD, DCF non può eccedere  $2P$  \*, ne segue che la somma degli angoli dei quattro triangoli ABC, BCD, EBD, DCF non eccede  $4P - 2Z + 4P$ , ovvero  $8P - 2Z$ . Se da questa somma si toglie quella degli angoli in B, C, D, che è  $6P$ , poichè la somma degli angoli formati in ciascuno dei punti B, C, D, è  $2P$ , \* il resto sarà eguale alla somma degli angoli del triangolo AEF; dunque la somma degli angoli del triangolo AEF non eccede  $8P - 2Z - 6P$ , ovvero  $2P - 2Z$ .

\* Pr. 19.

\* Pr. 2.

Cor. 3.

Così, mentre che bisogna aggiungere  $Z$  alla somma degli angoli del triangolo ABC per farne due angoli retti, bisogna aggiungere almeno  $2Z$  alla somma degli angoli del triangolo AEF per farne egualmente due angoli retti.

Mediante il triangolo AEF si costruirà similmente un terzo triangolo, talmentechè bisognerà aggiungere almeno  $4Z$  alla somma dei suoi tre angoli perchè il tutto sia eguale a due angoli retti; e per mezzo del terzo se ne costruirà nella stessa maniera un quarto, dimodochè bisognerà aggiungere almeno  $8Z$  alla somma dei suoi angoli affinchè il tutto

---

render più sensibile la possibilità che una linea retta condotta per il punto D incontri ad un tempo i due lati AB, AC prolungati.

sia eguale a due angoli retti; e così di seguito.

Ora, per quanto piccolo sia  $Z$  per rapporto all'angolo retto  $P$ , la serie  $Z$ ,  $2Z$ ,  $4Z$ , ec., i di cui termini crescono in ragion dupla, condurrà ben presto ad un termine eguale a  $2P$ , o più grande di  $2P$ . Si perverrà dunque allora a un triangolo tale, che bisognerebbe aggiungere alla somma dei suoi angoli una quantità eguale o più grande di  $2P$ , acciocchè la somma totale fosse solamente  $2P$ . Questa conseguenza è visibilmente assurda; dunque l'ipotesi, da cui siamo partiti, non può sussistere; e vale a dire è impossibile che la somma degli angoli del triangolo  $ABC$  sia più piccola di due angoli retti: essa non può d'altra parte esser più grande in virtù della Proposizione precedente; dunque ella è eguale a due angoli retti.

*Corollario I.* Due angoli d'un triangolo essendo dati, o solamente la loro somma, si conoscerà il terzo togliendo la somma di questi angoli da due retti.

*II.* Se due angoli d'un triangolo sono eguali rispettivamente ai due angoli d'un altro triangolo, il terzo sarà eguale al terzo, e i triangoli saranno equiangoli tra di loro.

*III.* In un triangolo non può esservi che un solo angolo retto; poichè, se ve ne fossero due, il terzo angolo diverrebbe nullo. A più forte ragione in un triangolo non può esservi che un solo angolo ottuso.

*IV.* In un triangolo rettangolo la somma

dei due angoli acuti è eguale ad un retto.

V. In un triangolo equilatero ciascun angolo è uguale al terzo della somma di due angoli retti, o sìvvero ai due terzi d' un solo angolo retto; di maniera che l'angolo retto essendo espresso per 1, l'angolo del triangolo equilatero lo sarà per  $\frac{2}{3}$ .

Fig. 41. VI. In qualunque triangolo BAC, se si prolunghi il lato CA verso D, l'angolo esterno BAD sarà eguale alla somma dei due interni opposti B, e C; perchè, aggiungendo da una parte e dall'altra BAC, le due somme sono eguali ciascuna a due angoli retti.

### PROPOSIZIONE XXI.

#### TEOREMA

*La somma di tutti gli angoli interni d'un Poligono è uguale a tante volte due angoli retti quante unità vi sono nel numero dei suoi lati meno due.*

Fig. 42. Sia ABCDEF, ec., il Poligono proposto. Se dal vertice d'un medesimo angolo A si conducano a tutti i vertici degli angoli opposti le diagonali AC, AD, AE, ec., è facile di vedere che il Poligono resterà diviso in cinque triangoli, se ha sette lati, in sei triangoli, se avesse otto lati, e in generale in tanti triangoli quanti il Poligono ha lati meno due; perchè questi triangoli possono essere considerati come aventi per vertice comune il punto A, e per basi i differenti lati del Poligono, eccettuati i due che formano l'angolo A. Si vede nel medesimo tempo che la

somma degli angoli di tutti questi triangoli non differisce dalla somma degli angoli del Poligono. Dunque quest' ultima somma è eguale a tante volte due angoli retti quanti sono i triangoli, e vale a dire quante unità vi sono nel numero dei lati del Poligono meno due.

*Corollario I.* La somma degli angoli d' un quadrilatero è uguale a due angoli retti moltiplicati per  $4-2$ ; ciò che fa quattro angoli retti: dunque, se tutti gli angoli del quadrilatero sono eguali, ciascuno di loro sarà un angolo retto. Questo giustifica la definizione diciassettesima ove si è senza prova presupposto che i quattro angoli d' un quadrilatero son retti nel caso sì del rettangolo che del quadrato.

*II.* La somma degli angoli d' un pentagono è di due angoli retti moltiplicati per  $5-2$ ; il che fa 6 angoli retti. Dunque, allorchè un pentagono sia *equiangolo*, e vale a dire quando i suoi angoli sono eguali gli uni agli altri, ciascuno di essi è eguale al quinto di sei angoli retti, ovvero ai  $\frac{6}{5}$  d' un angolo retto.

*III.* La somma degli angoli d' un esagono è di  $2 \times (6-2)$ , ovvero 8 angoli retti. Dunque nell' esagono equiangolo ciascuno degli angoli è il sesto di 8 angoli retti, o sivero  $\frac{4}{3}$  d' un angolo retto. E così di seguito.

*Scolio.* Se si volesse applicare questa pro- Fig. 43.  
posizione a un poligono, che avesse uno, o più angoli *rientranti*, bisognerebbe conside-

rare ciascun angolo *rientrante* come essendo più grande di due angoli retti. Ma, a scanso d'ogni imbarazzo, non considereremo quì ed in appresso se non che i Poligoni, i quali abbiano soli angoli *salienti*, che si posson chiamare ancora *Poligoni convessi*. Ogni Poligono convesso è tale, che una linea retta, condotta come si vorrà, non può mai incontrare il contorno di questo Poligono se non se in due punti.

### PROPOSIZIONE XXII.

#### TEOREMA

Fig. 36. *Se due linee rette AC, ED son perpendicolari a una terza AE, queste due linee saranno parallele, e vale a dire non si potranno incontrare a qualunque distanza che si prolunghino.*

Perchè, se s'incontrassero in un punto O, si avrebbero due perpendicolari OA, OE abbassate da un medesimo punto O sopra una

\*Pr. 15. medesima linea AE; ciò ch'è impossibile. \*

### PROPOSIZIONE XXIII.

#### TEOREMA

Fig. 36. *Se due linee rette AC, BD fanno con una terza AB due angoli interni CAB, ABD, di cui la somma sia eguale a due angoli retti, le linee AC, BD saranno parallele.*

Se gli angoli CAB, ABD fossero eguali tra loro, sarebbero retti l'uno e l'altro, e si tornerebbe al caso della proposizion precedente. Supponiamo dunque che questi due



angoli sian ineguali; e per il punto A sia abbassata AE perpendicolare a BD. Nel triangolo rettangolo ABE la somma dei due angoli acuti ABE, BAE è uguale ad un angolo retto; \* questa somma essendo sottratta \* Pr. 20. da quella dei due angoli ABE, BAC, che, Cor. 4. per ipotesi, è uguale a due angoli retti, resterà l'angolo CAE eguale ad un angolo retto; dunque le due linee AC, BD son perpendicolari ad una medesima linea AE; dunque son parallele \*.

\* Pr. 22.

## PROPOSIZIONE XXIV.

## T E O R E M A

— 4 Se due linee rette AF, BD fanno con una Fig. 36. a terza AB due angoli interni FAB, ABD, la di cui somma sia minore, o maggiore di due angoli retti, dico che le due linee AF, BD, prolungate sufficientemente, s'incontreranno.

Conducete AC di maniera che la somma degli angoli CAB+ABD sia eguale a due angoli retti; potranno accadere due casi secondo che l'angolo BAF sarà più piccolo, o più grande di BAC, e vale a dire secondo che la somma data FAB+ABD sarà più piccola, o più grande di due angoli retti.

Sia 1.° l'angolo  $\text{BAF} < \text{BAC}$ ; conducete per il punto A un'obliqua qualunque AM, che incontri BD in M; l'angolo AMB sarà eguale a MAC, poichè aggiungendo da una parte e dall'altra una medesima grandezza angolare MAB+ABM, le due somme sono eguali ciascuna a due angoli retti. Prendete

adesso  $MN=AM$ , e tirate  $AN$ ; l'angolo  $AMB$ , esterno del triangolo  $MAN$ , è eguale alla somma dei due interni opposti  $MAN$ ,  
 \* Pr. 20.  $ANM$ ; \* ma questi sono eguali fra loro, poichè  $AM=MN$ ; dunque l'angolo  $AMB$ , o il suo eguale  $MAC$  è doppio di  $MAN$ ; dunque la linea  $AN$  divide in due parti eguali l'angolo  $CAM$ , ed incontra la linea  $BD$  in un punto  $N$  situato alla distanza  $MN=AM$ . Segue dalla medesima dimostrazione che, se sopra la linea  $BD$  prendasi parimente  $NP=AN$ , si avrà il punto  $P$ , ove dee terminare la linea retta, che divide in due parti eguali l'angolo  $CAN'$ . Si può dunque prender così successivamente la metà, il quarto, l'ottavo, il sedicesimo, ec. dell'angolo  $CAM$ , e le linee, che operan queste divisioni, incontreranno la linea  $BD$  in dei punti di più in più lontani, ma facili a determinare; imperocchè si avrà successivamente  $MN=AM$ ,  $NP=AN$ ,  $PZ=AP$ , ec. Si può parimente osservare che ciascuna distanza da un punto qualunque d'intersezione al punto  $A$  non è affatto doppia della distanza della intersezione prossima precedente; perchè  $AN$ , per esempio, è minore di  $AM+MN$ , o del doppio di  $AM$ . Si ha similmente  $AP < 2AN$ ,  $AZ < 2AP$ , e così di seguito. Ma, continuando a suddividere l'angolo  $CAM$  di metà in metà si arriverà ben presto ad un angolo  $CAZ$  più piccolo che l'angolo dato  $CAF$ , e sarà ancor vero che  $AZ$  prolungata incontri  $BD$  in un punto determinato; dunque, a più forte ragione, la linea

AF, situata dentro dell'angolo BAZ, incontrerà BD; dunque, se i due angoli BAF, ABD, fanno insieme una somma minore di due angoli retti, le linee AF, BD, prolungate sufficientemente, s'incontreranno.

Supponghiamo 2.<sup>o</sup> che i due angoli FAB, ABD facciano una somma più grande di due angoli retti: se si prolunga FA verso G, e DB verso E, la somma dei quattro angoli FAB, BAG, ABD, ABE sarà eguale a quattro angoli retti; \* e se quindi si toglie FAB + ABD più grande di due angoli retti, il resto BAG + ABE sarà più piccolo di due angoli retti; dunque, verificandosi il primo caso, le linee AG, BE, prolungate sufficientemente, debbono tra loro incontrarsi.

*Corollario.* Per un punto dato A non si può condurre che una sola retta parallela alla retta data BD; perchè non vi è che una retta linea sola AC, che renda la somma dei due angoli BAC + ABD eguale a due angoli retti, ed è la parallela dimandata: ogni altra linea retta AF renderebbe la somma dei due angoli BAF + ABD, più piccola, o più grande di due angoli retti; e perciò ella incontrerebbe la retta BD.

## PROPOSIZIONE XXV.

### TEOREMA

*Se due linee parallele AB, CD sono incontrate da una secante EF, la somma de' due angoli interni AGO, GOC sarà uguale a due angoli retti.*

Poichè, se fosse maggiore, o minore, le due linee AB, CD s'incontrerebbero da una parte, o dall'altra, \* e non sarebbero parallele.

\*Pr. 24.

*Corollario I.* Se l'angolo GOC è retto, l'angolo AGO dev'esserlo pure; dunque ogni linea perpendicolare a una delle parallele è perpendicolare anche all'altra.

*Corollario II.* Poichè  $AGO + GOC$  è uguale a due angoli retti, e che  $GOD + GOC$  è pure uguale a due angoli retti, togliendo da una parte e dall'altra GOC, si avrà l'angolo  $AGO = GOD$ . Per conseguenza i quattro angoli acuti EGB, AGO, GOD, COF sono uguali fra loro; accade lo stesso de' quattro angoli ottusi AGE, OGB, COG, DOF; e nel tempo medesimo, se si aggiunga uno de' quattro angoli acuti ad uno de' quattro ottusi, la somma farà sempre due angoli retti.

*Scolio.* Si danno ordinariamente de' nomi particolari a ciascuno di questi angoli paragonati due a due. Abbiamo già chiamato gli angoli AGO, GOC *interni da una medesima parte*; gli angoli BGO, GOD hanno il medesimo nome. Gli angoli AGO, GOD si chiamano *alterni-interni*, o semplicemente *alterni*; e così pure gli angoli BGO, GOC. Gli angoli EGB, GOD si chiamano *interni-esterni*; e finalmente gli angoli EGB, COF prendono il nome di *alterni-esterni*. Si possono dunque riguardare le seguenti proposizioni come già dimostrate.

Gli angoli interni da una medesima par-

te presi insieme equivalgono a due angoli retti.

Gli angoli alterni-interni sono uguali.

Gli angoli interni-esterni sono uguali.

Gli angoli alterni-esterni sono uguali.

Reciprocamente, se gli angoli così denominati sono uguali, si può conchiudere che le linee, alle quali si rapportano, sono parallele. Sia, per esempio, l'angolo  $AGO = GOD$ ; poichè  $GOC + GOD$  è uguale a due retti, si avrà pure  $AGO + GOC$  uguale a due retti; dunque \* le linee  $AG$ ,  $CO$  sono parallele. \* P. 23

### PROPOSIZIONE XXVI.

#### TEOREMA

— 2 Due linee  $AB$ ,  $CD$  parallele a una terza Fig. 38.  
 $EF$  sono parallele fra loro.

Conducete la secante  $PQR$  perpendicolare ad  $EF$ . Poichè  $AB$  è parallela ad  $EF$ ,  $PR$  sarà perpendicolare ad  $AB$  \*; parimente, \* Co. I.  
poichè  $CD$  è parallela ad  $EF$ , la secante  $PR$  Pr. 25.  
sarà perpendicolare a  $CD$ ; dunque  $AB$  e  $CD$  sono perpendicolari alla medesima linea  $PQ$ ; dunque son parallele \*. \* Pr. 22.

### PROPOSIZIONE XXVII.

#### TEOREMA

— 0 Due parallele sono per tutto ugualmente Fig. 39.  
distanti.

Fra le due parallele  $AC$ ,  $BD$  conducete, ovunque vorrete, le due perpendicolari  $AB$ ,  $CD$ ; dico che queste due perpendicolari sono uguali.

Le linee  $AB$ ,  $CD$ , perpendicolari ad una delle parallele, sono nel medesimo tempo  
 \* P. 25. perpendicolari all'altra \*; e se si conduce  $EF$  perpendicolare sul mezzo d'  $AC$ ,  $EF$  sarà pure perpendicolare a  $BD$ , talmentechè tutti gli angoli in  $A$ ,  $E$ ,  $C$ ,  $B$ ,  $F$ ,  $D$  saranno retti. Ciò posto, dico che il quadrilatero  $AEFB$  può essere situato esattamente sul quadrilatero  $CEFD$ ; poichè il lato  $EF$  è comune, l'angolo  $AEF$  è uguale a  $FEC$ , ed il lato  $EA$  è uguale ad  $EC$  per costruzione; dunque il punto  $A$  cadrà in  $C$ . Ma l'angolo  $EAB$  è uguale ad  $ECD$ ; dunque  $AB$  e  $CD$  saranno in una medesima direzione. D'altronde l'angolo  $EFB = EFD$ ; dunque  $FB$  e  $FD$  saranno pure nella medesima direzione; dunque i due quadrilateri coincideranno interamente uno coll'altro, e sarà per conseguenza  $AB = CD$ .

### PROPOSIZIONE XXVIII.

#### TEOREMA

Fig. 40. *Se due angoli  $BAC$ ,  $DEF$  hanno i lati rispettivamente paralleli, e diretti nel medesimo senso, questi due angoli saranno uguali.*

Prolungate, s'è necessario,  $DE$  finchè incontri  $AC$  in  $G$ ; l'angolo  $DEF$  è uguale a  
 \* P. 25.  $DGC$ , perchè  $EF$  è parallela a  $GC$  \*; l'angolo  $DGC$  è uguale a  $BAC$ , perchè  $DG$  è parallela ad  $AB$ ; dunque l'angolo  $DEF$  è uguale a  $BAC$ .

*Scolio.* Si pone in questa Proposizione la restrizione che  $EF$  sia diretta nel medesimo senso di  $AC$ , ed  $ED$  nel medesimo senso d'  $AB$ ;

perchè, se si prolunga FE verso H, l'angolo DEH avrà i suoi lati paralleli a quelli dell'angolo BAC, ma questi angoli non saranno uguali, perchè EH ed AC sono dirette in senso contrario: in questo caso d'angolo DEH e l'angolo BAC farebbero insieme due angoli retti.

## PROPOSIZIONE XXIX.

## T E O R E M A

*I lati opposti d'un parallelogrammo sono uguali; e così pure gli angoli opposti.*

Tirate la diagonale BD; i due triangoli Fig. 44.  
ADB, DBC hanno il lato comune BD; di  
più, a cagione delle parallele AD, BC, l'an-  
golo  $ADB = DBC$  \*, ed a cagione delle pa- \* Pr. 25.  
rallele AB, CD l'angolo  $ABD = BDC$ . Dun-  
que i due triangoli ABD, DBC sono ugua-  
li \*; dunque il lato AB opposto all'angolo \* Pr. 7.  
ADB è uguale al lato DC opposto all'an-  
golo uguale DBC, come pure  $AD = BC$ ;  
dunque i lati opposti d'un parallelogrammo  
sono uguali.

In secondo luogo dall'uguaglianza de' medesimi triangoli ne segue che l'angolo A è uguale all'angolo C, e similmente che l'angolo ADC, composto de' due angoli ADB, BDC, è uguale all'angolo ABC, composto de' due angoli DBC, ABD; dunque gli angoli opposti d'un parallelogrammo sono uguali.

*Corollario.* Dunque due parallele AB, CD comprese fra due altre parallele AD, BC sono uguali.

## PROPOSIZIONE XXX.

## TEOREMA

— Fig. 44. *Se in un quadrilatero ABCD i lati opposti sono uguali, talmente che sia  $AB=CD$ , e  $AD=BC$ , questi lati saranno ancora paralleli, e la figura sarà un parallelogrammo.*

Poichè, tirando la diagonale BD, i due triangoli ABD, BDC avranno i tre lati rispettivamente uguali; dunque saranno uguali; dunque l'angolo ADB opposto al lato AB è uguale all'angolo DBC opposto al lato CD;

\* P. 25. dunque \* il lato AD è parallelo a BC. Per una simil ragione AB è parallelo a CD; dunque il quadrilatero ABCD è un parallelogrammo.

## PROPOSIZIONE XXXI.

## TEOREMA

— *Se due lati opposti AB, CD d'un quadrilatero sono eguali e paralleli, gli altri due lati saranno parimente eguali e paralleli, e la figura ABCD sarà un parallelogrammo.*

Sia tirata la diagonale BD. Poichè AB è parallela a CD, gli angoli alterni ABD, BDC, sono eguali\*; d'altronde il lato  $AB=DC$ , il lato DB è comune; dunque il triangolo ABD è uguale al triangolo DBC\*; dunque il lato  $AD=BC$ , l'angolo  $ADB=DBC$ , e per conseguenza AD è parallela a BC; dunque la figura ABCD è un parallelogrammo.



## PROPOSIZIONE XXXII.

## TEOREMA

— *Le due diagonali AC, BD d'un paralellogrammo si tagliano scambievolmente in due parti eguali nel punto O del loro incontro comune.* Fig. 45.

Poichè, paragonando il triangolo ADO al triangolo COB, si trova il lato  $AD=CB$ , l'angolo  $ADO=COB$  \*, e l'angolo  $DAO=$  \* Pr. 25.  $OCB$ ; dunque questi due triangoli sono eguali \*; dunque AO, lato opposto all'angolo \* Pr. 7. ADO, è uguale ad OC, lato opposto all'angolo OCB; dunque ancora  $DO=OB$ .

*Scolio.* Nel caso del rombo i lati AB, BC essendo eguali, i triangoli AOB, OBC hanno i tre lati rispettivamente eguali, e sono per conseguenza eguali; d'onde segue che l'angolo  $AOB=BOC$ , e parimente che le due diagonali di un rombo si tagliano scambievolmente ad angoli retti.

## LIBRO SECONDO.

## IL CIRCOLO

## E LA MISURA DEGLI ANGOLI

## DEFINIZIONI

**Fig. 46.** 1. *La circonferenza del circolo è una linea curva, di cui tutti i punti sono ugualmente distanti da un punto interno, che si chiama centro.*

Il *circolo* è lo spazio compreso da questa linea curva.

*N. B.* Talora nel discorso si confonde il circolo colla circonferenza; ma sarà sempre facile di ristabilire l'esattezza delle espressioni ricordandosi che il circolo è una superficie, che ha lunghezza e larghezza, mentre la circonferenza non è che una linea.

2. Ogni linea retta CA, CE, CD ec. condotta dal centro alla circonferenza si chiama *raggio*, o *semi-diametro*. Ogni linea, come AB, che passa per il centro, e ch'è terminata da ambe le parti alla circonferenza, si chiama *diametro*.

In virtù della definizione del circolo tutti i raggi sono uguali; tutti i diametri sono pure uguali, e doppj ciascuno del raggio.

3. Si chiama *arco* una porzione di circonferenza, come FHG.

La *corda* o *sottesa* dell'arco è la linea retta FG, che unisce le sue due estremità.

4. *Segmento* è la superficie o porzione di cerchio compresa fra l'arco e la corda.

N. B. Alla medesima corda FG corrispondono insieme due archi FHG, FEG, e per conseguenza anche due segmenti; ma s'intende sempre di parlar del minore, salvo che non si esprima il contrario.

5. *Settore* è la parte del cerchio compresa fra un arco DE, e i due raggi CD, CE condotti alle estremità del medesimo arco.

6. Si chiama *linea iscritta nel cerchio* quella, le cui estremità sono alla circonferenza, come AB. Fig. 47.

*Angolo iscritto* un angolo, come BAC, il di cui vertice è alla circonferenza, e che è formato da due corde.

*Triangolo iscritto* un triangolo, come BAC, i cui tre angoli hanno i loro vertici alla circonferenza:

Ed in generale *figura iscritta* quella, di cui tutti gli angoli hanno i vertici loro alla circonferenza; nel tempo stesso si dice che il cerchio è *circoscritto* a una tal figura.

7. Si chiama *secante* una linea, che incontra la circonferenza in due punti; tale è AB. Fig. 48.

8. *Tangente* è una linea, che non ha che un sol punto comune colla circonferenza; tale è CD. Il punto comune M si chiama *punto di contatto*.

9. Parimente due circonferenze sono *tangenti* l'una dell'altra quando hanno un sol punto comune.

10. Un poligono è *circoscritto ad un circolo* quando tutti i suoi lati sono *tangenti* della circonferenza; nello stesso caso si dice che il circolo è *iscritto* nel poligono.

### PROPOSIZIONE I.

#### TEOREMA

Fig. 49. Ogni diametro AB divide il circolo, e la sua circonferenza in due parti uguali.

Poichè, se si applica la figura AEB sopra AFB, conservando la base comune AB, bisognerà che la linea curva AEB cada esattamente sulla linea curva AFB; altrimenti vi sarebbero nell'una o nell'altra dei punti disugualmente lontani dal centro; il che è contro la definizione del circolo.

### PROPOSIZIONE II.

#### TEOREMA

Ogni corda è minor del diametro.

Poichè, se alle estremità della corda AD si conducano i raggi AC, CD, si avrà la linea retta  $AD < AC + CD$ , o  $AD < AB$ .

*Corollario.* Dunque la maggior linea retta, che si possa iscrivere in un circolo, è uguale al di lui diametro.

## PROPOSIZIONE III.

## TEOREMA

*Una linea retta non può incontrare una circonferenza in più di due punti.*

Poichè, se l'incontrasse in tre, questi tre punti sarebbero ugualmente distanti dal centro; vi sarebbero dunque tre linee uguali condotte da uno stesso punto sopra una medesima linea retta; il che è impossibile \*.

\* P. 16.  
Lib. I.

## PROPOSIZIONE IV.

## TEOREMA

*In un medesimo circolo, o in circoli uguali, gli archi uguali sono sottesi da corde uguali, e reciprocamente le corde uguali sottendono archi uguali.*

Essendo il raggio  $AC$  uguale al raggio  $EO$ , Fig. 50. e l'arco  $AMD$  uguale all'arco  $ENG$ , dico che la corda  $AD$  sarà uguale alla corda  $EG$ .

Poichè, essendo il diametro  $AB$  uguale al diametro  $EF$ , il mezzo-circolo  $AMD$  potrà applicarsi esattamente sul mezzo-circolo  $ENGF$ , e la linea curva  $AMDB$  coinciderà interamente colla linea curva  $ENGF$ . Ma si suppone la parte  $AMD$  uguale alla parte  $ENG$ ; dunque il punto  $D$  cadrà sul punto  $G$ ; dunque la corda  $AD$  è uguale alla corda  $EG$ .

Reciprocamente, supponendo sempre il raggio  $AC=EO$ , se la corda  $AD=EG$ , dico che l'arco  $AMD$  sarà uguale all'arco  $ENG$ .

Poichè, tirando i raggi  $CD$ ,  $OG$ , i due

triangoli  $ACD$ ,  $EOG$  avranno i tre lati rispettivamente uguali, cioè  $AC=EO$ ,  $CD=OG$ , e  $AD=EG$ ; dunque questi triangoli sono uguali, \* e l'angolo  $ACD=EOG$ . Ma ponendo il mezzo-circolo  $ADB$  sul suo uguale  $EGF$ , poichè l'angolo  $ACD=EOG$ , è chiaro che il raggio  $CD$  cadrà sul raggio  $OG$ , e il punto  $D$  sul punto  $G$ ; dunque l'arco  $AMD$  è uguale all'arco  $ENG$ .

## PROPOSIZIONE V.

## TEOREMA

*Nel medesimo circolo, o in circoli uguali, un arco maggiore è sotteso da una corda maggiore, e reciprocamente; purchè gli archi, di cui si tratta, siano minori d'una mezza-circonferenza.*

Poichè, sia l'arco  $AH$  maggiore di  $AD$ , e siano condotte le corde  $AD$ ,  $AH$ , ed i raggi  $CD$ ,  $CH$ ; i due lati  $AC$ ,  $CH$  del triangolo  $ACH$  sono uguali ai due lati  $AC$ ,  $CD$  del triangolo  $ACD$ ; l'angolo  $ACH$  è maggiore di  $ACD$ ; dunque \* il terzo lato  $AH$  è maggiore del terzo  $AD$ ; dunque la corda che sottende l'arco maggiore, è la maggiore.

Reciprocamente, se la corda  $AH$  vien supposta maggiore d' $AD$ , si conchiuderà dagli stessi triangoli che l'angolo  $ACH$  è maggiore d' $ACD$ , e che perciò l'arco  $AH$  è maggiore di  $AD$ .

*Scolio.* Noi supponiamo che gli archi, di cui si tratta, siano minori della mezza-circonferenza. Accade il contrario quando sono

maggiori; allora, aumentando l'arco, diminuisce la corda; e reciprocamente. Così essendo l'arco  $AKBD$  maggiore di  $AKBH$ , la corda  $AD$  del primo è minore di  $AH$  del secondo.

## PROPOSIZIONE VI.

## TEOREMA

— *Il raggio  $GC$  perpendicolare ad una cor-* Fig. 51.  
*da  $AB$  divide questa corda, e l'arco sotteso*  
 *$AGB$ , l'uno e l'altra in due parti uguali.*

Conducete i raggi  $AC$ ,  $CB$ ; questi raggi sono, per rapporto alla perpendicolare  $CD$ , due oblique uguali; dunque si allontanano ugualmente dalla perpendicolare \*; dunque \* 16, 1.  $AD=DB$ .

In secondo luogo, poichè  $AD=DB$ ,  $CG$  è una perpendicolare inalzata sul mezzo d' $AB$ ; dunque \* ogni punto di questa perpendicolare dev'essere ugualmente distante dalle due estremità  $A$  e  $B$ . Il punto  $G$  è uno di questi punti; dunque la distanza  $AG=GB$ . Ma se la corda  $AG$  è uguale alla corda  $GB$ , l'arco  $AG$  sarà uguale all'arco  $GB$  \*; dunque il \* Pr. 4. raggio  $CG$  perpendicolare alla corda  $AB$  divide l'arco sotteso da questa corda in due parti uguali nel punto  $G$ .

*Scolio.* Il centro  $C$ , il mezzo  $D$  della corda  $AB$ , e il mezzo  $G$  dell'arco sotteso da questa corda sono tre punti situati sopra una medesima linea retta perpendicolare alla corda. Ora bastan due punti per determinare la posizione d'una linea retta; dunque ogni

linea, che passa per due dei punti mentovati, passerà necessariamente per il terzo, e sarà perpendicolare alla corda.

Ne segue pure che *la perpendicolare inalzata sul mezzo d'una corda passa per il centro, e per il mezzo dell'arco sotteso dalla stessa corda.*

Poichè questa perpendicolare si confonde con quella, che sarebbe abbassata dal centro sulla medesima corda, giacchè passano ambedue per il mezzo della corda suddetta.

### PROPOSIZIONE VII.

#### TEOREMA

Fig. 52. *Per tre punti dati A, B, C, non situati in linea retta, si può sempre far passare una circonferenza di circolo; ma non se ne può far passar che una sola.*

Tirate AB, BC, e dividete queste due linee in due parti uguali colle perpendicolari DE, FG; dico primieramente che queste perpendicolari s'incontreranno in un punto O.

Poichè le linee DE, FG si taglieranno necessariamente, se non son parallele. Or supponiamo che fossero parallele, la linea BD perpendicolare a DE sarebbe, perpendicolare a FG\*, e l'angolo in K sarebbe retto; ma BK, prolungamento di BD, è differente da BF, poichè i tre punti A, B, C non sono in linea retta; dunque vi sarebbero due perpendicolari BF, BK abbassate da uno stesso punto sulla medesima linea, il che è impossibile\*; dunque le perpendicolari DE, FG si taglieranno sempre in un punto O.



Adesso il punto  $O$ , come appartenente alla perpendicolare  $DE$ , è ad uguale distanza dai due punti  $A$  e  $B$  \*; il medesimo punto  $O$ , \* 17, 1. come appartenente alla perpendicolare  $FG$ , è ad ugual distanza da' due punti  $B$ ,  $C$ ; dunque le tre distanze  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$  sono uguali; dunque la circonferenza descritta col centro  $O$ , e col raggio  $OB$  passerà per i tre punti dati  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .

Resta così provato che si può sempre far passare una circonferenza per tre punti dati non in linea retta; dico di più che non si può farvene passar che una sola.

Poichè, se vi fosse una seconda circonferenza, che passasse per i tre punti dati  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , il suo centro non potrebbe esser fuori della linea  $DE$  \*, poichè allora sarebbe dis- \* 17, 1. ugualmente lontano da  $A$  e da  $B$ ; non potrebbe esser fuori della linea  $FG$  per una simil ragione; dunque sarebbe nel tempo stesso sulle due linee  $DE$ ,  $FG$ . Or due linee rette non possono tagliarsi in più d'un punto; dunque non v'è che una sola circonferenza, che possa passare per tre punti dati.

*Corollario.* Due circonferenze non possono incontrarsi in più di due punti; poichè, se avessero tre punti comuni, avrebbero il medesimo centro, e non farebbero che una sola e medesima circonferenza.

## PROPOSIZIONE VIII.

### TEOREMA

*Due corde uguali sono ugualmente lont.*

*ne dal centro, e di due corde disuguali la minore è la più distante dal centro.*

Fig. 53. 1.<sup>o</sup> Sia la corda  $AB=DE$ : dividete queste corde in due parti eguali colle perpendicolari  $CF$ ,  $CG$ , e tirate i raggi  $CA$ ,  $CD$ .

I triangoli rettangoli  $CAF$ ,  $CDG$  hanno le ipotenuse  $CA$ ,  $CD$  uguali; di più il lato  $AF$ , metà di  $AB$ , è uguale al lato  $DG$ , metà di  $DE$ ; dunque questi triangoli sono uguali \*, ed il terzo lato  $CF$  è perciò uguale al terzo  $CG$ ; dunque 1.<sup>o</sup> le due corde uguali  $AB$ ,  $DE$  sono ugualmente lontane dal centro.

2.<sup>o</sup> Sia la corda  $AH$  maggiore di  $DE$ , l'arco  $AKH$  sarà maggiore dell'arco  $DME$  \*; sull'arco  $AKH$  prendete la parte  $ANB=DME$ ; tirate la corda  $AB$ , ed abbassate  $CF$  perpendicolare su questa corda, e  $CI$  perpendicolare sopra  $AH$ ; è chiaro che  $CF$  è maggiore di  $CI$ , e  $CO$  maggiore di  $CI$  \*; dunque a più forte ragione  $CF > CI$ . Ma  $CF=CG$ , poichè le corde  $AB$ ,  $DE$  sono uguali; dunque si ha  $CG > CI$ ; dunque la minore di due corde disuguali è la più lontana dal centro.

### PROPOSIZIONE IX.

#### TEOREMA

Fig. 54. *La perpendicolare  $BD$  condotta all'estremità del raggio  $CA$  è una tangente della circonferenza.*

Poichè ogni obliqua  $CE$  è maggiore della perpendicolare  $CA$ ; \* dunque il punto  $E$  è fuori del circolo; dunque la linea  $BD$  ha il solo punto  $A$  comune colla circonferenza, e

Def. 8. per conseguenza  $BD$  è una sua tangente. \*

*Scolio.* Non si può condurre da un punto dato  $A$  se non che una sola tangente  $AD$  alla circonferenza; poichè, mentre se ne potesse condurre un'altra, questa non sarebbe più perpendicolare al raggio  $CA$ ; dunque, per rapporto a questa nuova tangente, il raggio  $CA$  sarebbe un'obliqua, e la perpendicolare abbassata dal centro su questa tangente sarebbe minore di  $CA$ ; dunque questa pretesa tangente entrerebbe dentro del circolo, e sarebbe perciò una secante.

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA.

*Due parallele  $AB$ ,  $DE$  intercettano sulla Fig. 55*  
*circonferenza archi uguali  $MN$ ,  $PQ$ .*

Possono accadere tre casi.

1.° Se le due parallele sono secanti, conducete il raggio  $CH$  perpendicolare alla corda  $MP$ , sarà nel medesimo tempo perpendicolare alla sua parallela  $NQ$  \*; dunque il punto  $H$  sarà ad un tempo stesso il mezzo dell'arco  $MHP$ , e quello dell'arco  $NHQ$  \*; si avrà dunque l'arco  $MH=HP$ , e \* 6.  
l'arco  $NH=HA$ ; e di qui resulta  $MH-NH=HP-HQ$ , cioè  $MN=PQ$ .

2.° Se di due parallele  $AB$ ,  $DE$  una è secante, l'altra tangente, conducete il raggio  $CH$  al punto del contatto  $H$ ; questo raggio sarà perpendicolare alla tangente  $DE$  \*, ed \* 9.  
alla sua parallela  $MP$ . Ma, poichè  $CH$  è perpendicolare alla corda  $MP$ , il punto  $H$  è il mezzo dell'arco  $MHP$ ; dunque gli ar-

chi  $MH$ ,  $HP$  compresi tra le parallele  $AB$ ,  $DE$  sono uguali.

3.° Finalmente, se le due parallele  $DE$ ,  $IL$  sono tangenti, una in  $H$ , l'altra in  $K$ , conducete la secante parallela  $AB$ , ed avrete, per quello che abbiain dimostrato,  $MH=HP$ ,  $MK=KP$ ; dunque l'arco intero  $HMK=HPK$ ; e si vede inoltre che ciascuno di questi archi è una mezza circonferenza.

### PROPOSIZIONE XI.

#### TEOREMA

*Se due circonferenze si tagliano in due punti, la linea retta, che passa per i lor centri, sarà perpendicolare alla corda, che unisce i punti d'intersezione, e la dividerà in due parti uguali.*

Fig. 57.  
e 58. Poichè la linea  $AB$ , che unisce i punti d'intersezione, è una corda comune ai due circoli. Or, se sul mezzo di questa corda si alza una perpendicolare, essa dee passare per ciascun de' due centri  $C$  e  $D$  \*. Ma per due punti dati non può passare che una sola linea retta; dunque la linea retta condotta per i centri sarà perpendicolare sul mezzo della corda comune.

### PROPOSIZIONE XII.

#### TEOREMA

*Se la distanza de' due centri è minore della somma de' raggi, e se nel tempo stesso il maggior raggio è minor del più piccolo aggiunto alla distanza dei centri, i due circoli si taglieranno.*

Poichè all'effetto che abbia luogo l'inter-<sup>Fig. 57.</sup>  
sezione, bisogna che il triangolo CAD sia  
possibile. Bisogna dunque non solamente che  
CD sia  $< AC+AD$ , ma che anche il mag-<sup>Fig. 57.</sup>  
gior raggio AD sia  $< AC+CD$ . Or, tutte <sup>Fig. 58.</sup>  
le volte che il triangolo CAD sarà possibile,  
è chiaro che le circonferenze descritte coi  
centri C e D si taglieranno in A e B.

## PROPOSIZIONE XIII.

## TEOREMA

*Se la distanza CD de' centri de' due cerchi* <sup>Fig. 59</sup>  
*è uguale alla somma dei loro raggi CA, AD,*  
*questi due cerchi si toccheranno esterna-*  
*mente.*

E chiaro che avranno il punto A comune;  
ma avranno questo sol punto; poichè, per  
aver due punti comuni, bisognerebbe che la  
distanza dei centri fosse minore della somma  
de' raggi.

## PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA

*Se la distanza CD dei centri di due cerchi* <sup>Fig. 60.</sup>  
*è uguale alla differenza dei loro raggi CA,*  
*AD, questi due cerchi si toccheranno inter-*  
*nalemente.*

In primo luogo è chiaro che hanno il pun-  
to A comune: non ne possono avere alcun' al-  
tro; poichè, all'effetto che ciò accadesse,  
bisognerebbe che il maggior raggio AD fosse  
minore dell'altro raggio AC unito alla di-  
stanza dei centri CD \*, il che non ha luogo. \* 12.

*Corollario.* Dunque, se due cerchi si toc-

cano, o internamente, o esternamente, i centri, ed il punto del contatto sono sulla medesima linea retta.

Fig. 59.  
e 60.

*Scolio.* Tutti i cerchi, che hanno il loro centro sulla retta  $CD$ , e che passano per il punto  $A$ , sono tangenti gli uni degli altri; cioè non hanno fra loro che il solo punto  $A$  di comune. E se per il punto  $A$  si conduca  $AE$  perpendicolare a  $CD$ , la retta  $AE$  sarà una tangente comune a tutti questi cerchi.

### PROPOSIZIONE XV.

#### TEOREMA

Fig. 61. *Nel medesimo circolo, o in cerchi uguali, gli angoli uguali  $ACB$ ,  $DCE$ , il cui vertice è al centro, intercettano sulla circonferenza archi uguali  $AB$ ,  $DE$ .*

*Reciprocamente, se gli archi  $AB$ ,  $DE$  sono uguali, gli angoli  $ACB$ ,  $DCE$  saranno pure uguali.*

Poichè 1.° se l'angolo  $ACB$  è uguale all'angolo  $DCE$ , questi due angoli potranno situarsi l'uno sull'altro; e siccome i loro lati sono uguali, è chiaro che il punto  $A$  cadrà in  $D$ , e il punto  $B$  in  $E$ . Ma allora l'arco  $AB$  dee pur cadere sull'arco  $DE$ ; poichè, se i due archi non fossero confusi in un solo, vi sarebbero nell'uno o nell'altro dei punti disugualmente lontani dal centro; il che è impossibile: dunque l'arco  $AB=DE$ .

2.° Se si suppone  $AB=DE$ , dico che l'angolo  $ACB$  sarà uguale all'angolo  $DCE$ . Poichè, se questi angoli non sono uguali, sia  $ACB$  il maggiore, e sia preso  $ACI=DCE$ ;

si avrà, per ciò che si è dimostrato,  $AI=DE$ :  
ma per supposizione l'arco  $AB=DE$ ; dun-  
que si avrebbe  $AI=AB$ , o la parte uguale  
al tutto; il che è impossibile; dunque l'an-  
golo  $ACB=DCE$ .

### PROPOSIZIONE XVI.

#### TEOREMA

— *Nel medesimo circolo, o in due circoli Fig. 6a.  
uguali, se due angoli al centro  $ACB, DCE$   
stanno fra loro come due numeri interi, gli  
archi intercetti  $AB, DE$  staranno fra loro  
come i medesimi numeri, e si avrà questa  
proporzione*

Angolo  $ACB$  : angolo  $DCE$  :: arco  $AB$  :  
arco  $DE$ .

Supponiamo, per esempio, che gli angoli  
 $ACB, DCE$  stiano fra loro come 7 stà a 4,  
o, il che torna lo stesso, supponiamo che  
l'angolo  $M$ , che servirà di misura comune,  
sia contenuto sette volte nell'angolo  $ACB$ , e  
quattro nell'angolo  $DCE$ . Gli angoli par-  
ziali  $ACm, mCn, nCp$ , ec.,  $DCx, xCy$ , ec.  
essendo uguali fra loro, gli archi parziali  
 $Am, mn, np$ , ec.  $Dx, xy$ , ec. saranno pure  
fra loro uguali; \* dunque l'arco intero  $AB$  \* 15.  
starà all'arco intero  $DE$  come 7 stà a 4.  
Ora è manifesto che lo stesso ragionamento  
avrebbe sempre luogo quando in vece di 7  
e 4 si avessero altri numeri qualunque; dun-  
que, se il rapporto degli angoli  $ACB, DCE$   
può essere espresso in numeri interi, gli ar-  
chi  $AB, DE$  staranno fra loro come gli an-  
goli  $ACB, DCE$ .

*Scolio.* Reciprocamente, se gli archi AB DE stessero fra loro come due numeri interi, gli angoli ACB, DCE starebbero fra loro come i medesimi numeri, e si avrebbe sempre  $ACB : DCE :: AB : DE$ ; perchè gli archi parziali  $Am, mn$ , ec.,  $Dx, xy$ , ec. essendo eguali, gli angoli parziali  $ACm, mCn$ , ec.,  $DCx, xCy$ , ec. son pure eguali.

## PROPOSIZIONE XVII.

## TEOREMA

Fig. 63. *Qualunque sia il rapporto de' due angoli ACB, ACD, questi due angoli staranno sempre fra loro come i due archi AB, AD intercetti fra i loro lati, e descritti dai loro vertici come centri con raggi uguali.*

Supponiamo l'angolo minore situato dentro il maggiore; se non è vera la proporzione enunziata, l'angolo ACB starà all'angolo ACD come l'arco AB stà a un arco maggiore, o minore di AD. Supponiamo quest'arco maggiore, e rappresentiamolo con AO; avremo perciò

$Ang. ACB : ang. ACD :: arc. AB : arc. AO.$

Imaginiamo adesso che l'arco AB sia diviso in parti uguali, di cui ciascuna sia minor di DO; vi sarà almeno un punto di divisione fra D e O; sia I questo punto, e tiriamo CI; gli archi AB, AI staranno fra loro come due numeri interi, e si avrà per il teorema precedente

$Ang. ACB : ang. ACI :: arc. AB : arc. AI.$



Confrontando queste due proporzioni una coll'altra, e osservando che gli antecedenti sono i medesimi, se ne conchiuderà che i conseguenti sono proporzionali, e che pereirà

Ang.  $ACD$  : ang.  $ACI$  :: arc.  $AO$  : arc.  $AI$ .

Ma l'arco  $AO$  è maggiore dell'arco  $AI$ ; bisognerebbe dunque, perchè sussistesse la proporzione, che l'angolo  $ACD$  fosse maggiore dell'angolo  $ACI$ : ora al contrario è minore; dunque è impossibile che l'angolo  $ACB$  stia all'angolo  $ACD$  come l'arco  $AB$  stà ad un arco maggiore di  $AD$ .

Si dimostrerebbe con un ragionamento affatto simile che il quarto termine della proporzione non può esser minore di  $AD$ ; dunque esso è esattamente  $AD$ , e si ha la proporzione

Ang.  $ACB$  : ang.  $ACD$  :: arc.  $AB$  : arc.  $AD$ .

*Corollario.* Poichè l'angolo al centro del circolo, e l'arco intercetto fra i suoi lati hanno un tal legame, che quando l'uno aumenta, o diminuisce in un rapporto qualunque, l'altro aumenta, o diminuisce nel medesimo rapporto, si può stabilire una di queste grandezze per misura dell'altra. Onde noi prenderemo da quì innanzi l'arco  $AB$  per misura dell'angolo  $ACB$ . Bisogna solamente osservare, nel paragonar gli angoli fra di loro, che gli archi, che servono lor di misura, deggiono esser descritti con raggi uguali; poichè ciò vien supposto in tutte le precedenti proposizioni.

*Scolio I.* Pare più naturale il misurar una quantità con una quantità della medesima specie; e dietro di questo principio converrebbe riportar tutti gli angoli all'angolo retto; così, essendo l'angolo retto l'unità di misura, un angolo acuto sarebbe espresso da un numero compreso fra 0 e 1, ed un angolo ottuso da un numero fra 1 e 2. Ma questa maniera d'esprimere gli angoli non sarebbe la più comoda per l'uso; è stato trovato molto più semplice il misurarli con archi di circolo, a motivo della facilità di fare degli archi uguali ad archi dati, e per molte altre ragioni. Del rimanente, se la misura degli angoli per mezzo degli archi di circolo è in qualche modo indiretta, è ugualmente facile l'ottenere col loro mezzo la misura diretta, e assoluta. Poichè, se paragonate l'arco, che serve di misura ad un angolo, colla quarta parte della circonferenza, avrete il rapporto dell'angolo dato all'angolo retto, che è la misura assoluta.

*Scolio II.* Tutto ciò, che è stato dimostrato nelle tre proposizioni precedenti per la comparazione degli angoli cogli archi, ha luogo ugualmente per la comparazione dei settori cogli archi; poichè i settori sono uguali quando lo sono gli angoli, e in generale sono proporzionali agli angoli; dunque due settori  $ACB$ ,  $ACD$  presi nel medesimo circolo, o in circoli uguali, stanno fra loro come gli archi  $AB$ ,  $AD$  basi di questi stessi settori.

Si vede da ciò che gli archi di circolo,

che servono di misura agli angoli, possono parimente servire di misura ai settori d' un medesimo circolo, o di circoli uguali.

PROPOSIZIONE XVIII.

TEOREMA

*L'angolo iscritto BAD ha per misura la metà dell'arco BD compreso fra i suoi lati.* Fig. 64. \* 65.

Supponiamo in primo luogo che il centro del circolo sia situato dentro l'angolo BAD; si condurranno il diametro AE, ed i raggi CB, CD. L'angolo BCE, esterno rispetto al triangolo ABC, è uguale alla somma dei due interni CAB, ABC \*: ma essendo il triangolo BAC isoscele, l'angolo CAB=ABC; dunque l'angolo BCE è doppio di BAC. L'angolo BCE, come angolo al centro, ha per misura l'arco BE; dunque l'angolo BAC avrà per misura la metà di BE. Per una simil ragione l'angolo CAD avrà per misura la metà di ED; dunque BAC+CAD, o BAD avrà per misura la metà di BE+ED, o la metà di BD.

Supponiamo in secondo luogo che il centro C sia situato fuori dell'angolo BAD; allora, conducendo il diametro AE, l'angolo BAE avrà per misura la metà di BE, l'angolo DAE la metà di DE; dunque la lor differenza BAD avrà per misura la metà di BE meno la metà di ED, o la metà di BD.

Dunque ogni angolo iscritto ha per misura la metà dell'arco compreso fra i suoi lati.

*Corollario I.* Tutti gli angoli BAC, BDC ec. iscritti nel medesimo segmento di Circolo Fig. 65. Fig. 66.

sono uguali, perchè hanno per misura la metà dell'istess' arco BOC.

- Fig. 67. *Corollario II.* Ogni angolo BAD iscritto nel mezzo-circolo è un angolo retto, poichè ha per misura la metà della mezza-circonferenza BOD, o la quarta parte della circonferenza.

Per dimostrare la stessa cosa in altra maniera, tirate il raggio AC; il triangolo BAC è isoscele, onde l'angolo  $BAC = ABC$ ; il triangolo CAD è parimente isoscele, e l'angolo  $CAD = ADC$ ; dunque  $BAC + CAD$ , o  $BAD = ABD + ADB$ : ma, se i due angoli B, e D del triangolo ABD equivalgono insieme al terzo BAD, i tre angoli del triangolo equivarranno a due volte l'angolo BAD; essi equivalgono d'altronde a due angoli retti; dunque l'angolo BAD è un angolo retto.

- Fig. 66. *Corollario III.* Ogni angolo BAC iscritto in un segmento maggiore del mezzo-circolo è un angolo acuto, poichè ha per misura la metà dell'arco BOC minore d'una mezza-circonferenza.

Ed ogni angolo BOC iscritto in un segmento minore del mezzo-circolo è un angolo ottuso, poichè ha per misura la metà dell'arco BAC maggiore d'una mezza-circonferenza.

- Fig. 68. *Corollario IV.* Gli angoli opposti A, e C d'un quadrilatero iscritto ABCD equivalgono insieme a due angoli retti; poichè l'angolo BAD ha per misura la metà dell'arco BCD, l'angolo BCD ha per misura la metà dell'arco BAD; dunque i due angoli BAD, BCD presi insieme hanno per misura la metà

della circonferenza ; il che equivale a due angoli retti.

## PROPOSIZIONE XIX.

## TEOREMA

*L'angolo BAC formato da una tangente, Fig. 69. e da una corda o secante ha per misura la metà dell'arco AMDC compreso fra i suoi lati.*

Al punto di contatto A conducete il diametro AD; l'angolo BAD è retto \*, ed ha \* 9. per misura la metà della mezza circonferenza AMD; l'angolo DAC ha per misura la metà di DC; dunque BAD+DAC, o BAC ha per misura la metà di AMD più la metà di DC, o la metà dell'arco intero AMDC.

Si dimostrerebbe medesimamente che l'angolo CAE ha per misura la metà dell'arco AC compreso fra i suoi lati.

## PROBLEMI RELATIVI AI DUE PRIMI LIBRI

## PROBLEMA I.

*Dividere la retta data AB in due parti Fig. 70. uguali.*

Da' punti A, e B, come centri, e con uno stesso raggio maggiore della metà d'AB, descrivete due archi, che si taglino in D: il punto D sarà ugualmente lontano dai punti A e B. Segnate nella stessa maniera al di sopra, o al di sotto della linea AB un secondo punto E ugualmente lontano dai punti A e B. Per i due punti D, E tirate la linea DE; dico che DE taglierà la linea AB in due parti uguali nel punto C.

Poichè, essendo ciascuno de' punti D, e E ugualmente distante dalle estremità A, e B, essi debbono trovarsi ambedue nella perpendicolare inalzata sul mezzo d'AB. Ma per due punti dati non può passare se non che una sola linea retta; dunque la linea DE sarà quella stessa perpendicolare, che taglia la linea AB in due parti uguali al punto C.

## PROBLEMA II.

Fig. 71. *Da un punto A dato sulla linea BC alzare una perpendicolare a questa linea.*

Prendete i punti B, e C ad ugual distanza da A; indi dai punti B, e C, come centri, e con uno stesso raggio maggior di BA, descrivete due archi, che si taglino in D; tirate AD, che sarà la perpendicolare richiesta.

Poichè, essendo il punto D ugualmente lontano da B, e da C, esso appartiene alla perpendicolare alzata sul mezzo di BC; dunque AD è questa perpendicolare.

*Scolio.* La medesima costruzione serve a fare un angolo retto BAD in un punto dato A sopra una linea data BC.

## PROBLEMA III.

Fig. 72. *Da un punto A dato fuori della retta BD abbassare una perpendicolare sopra questa retta.*

Dal punto A, come centro, e con un raggio abbastanza grande, descrivete un arco, che tagli la linea BD nei due punti B, e D. Segnate quindi un punto E ugualmente distante dai punti B, e D, e tirate AE, che sarà la perpendicolare cercata.

Poichè ciascuno dei due punti A, ed E è ugualmente distante dai punti B, e D; dunque la linea AE è perpendicolare sul mezzo di BD.

PROBLEMA IV.

*Al punto A della linea AB fare un angolo Fig. 73. uguale all'angolo dato K.*

Dal vertice K, come centro, e con un raggio ad arbitrio, descrivete l'arco IL terminato a' due lati dell'angolo. Dal punto A, come centro, e con un raggio AB uguale a KI, descrivete l'arco indefinito BO. Prendete poi un raggio uguale alla corda LI; dal punto B, come centro, e con questo raggio descrivete un arco, che tagli in D l'arco indefinito BO; tirate AD; e l'angolo DAB sarà uguale all'angolo dato K.

Poichè i due archi BD, LI hanno raggi uguali, e corde uguali; dunque sono uguali\*; \* 4. 2. dunque l'angolo BAD=IKL.

PROBLEMA V.

*Dividere un angolo, o un arco dato in due Fig. 74. parti uguali.*

1.º Se bisogna dividere l'arco AB in due parti uguali, dai punti A, e B, come centri, e con uno stesso raggio descrivete due archi, che si taglino in D. Per il punto D, e per il centro C tirate CD, che taglierà l'arco AB in due parti uguali nel punto E.

Poichè ciascuno dei punti C, e D è ugualmente distante dalle estremità A, e B della corda AB; dunque la linea CD è perpendi-

colare sul mezzo di questa corda; dunque divide l'arco AB in due parti uguali nel pun-

\* 6, 2. to E \*.

2.<sup>o</sup> Se bisogna dividere in due parti uguali l'angolo ACB, si comincerà da descrivere dal vertice C, come centro, l'arco AB, e si procederà nel resto come quì sopra. È chiaro che la linea CD dividerà in due parti uguali l'angolo ACB.

*Scolio.* Si può colla medesima costruzione dividere ciascuna delle metà AE, EB in due parti uguali; così con delle suddivisioni successive si dividerà un angolo, o un arco dato in quattro parti uguali, in otto, in sedici, ec.

#### PROBLEMA VI.

Fig. 75. *Per un punto dato A condurre una parallela alla linea retta data BC.*

Dal punto A, come centro, e con un raggio abbastanza grande, descrivete l'arco indefinito EO; dal punto E, come centro, e col medesimo raggio descrivete l'arco AF; prendete  $ED=AF$ , e tirate AD, che sarà la parallela richiesta.

Poichè, conducendo AE, si vede che gli angoli alterni AEF, EAD sono uguali; dunque le linee AD, EF son parallele \*.

#### PROBLEMA VII.

*Essendo dati due angoli A, e B d'un triangolo trovare il terzo.*

Fig. 76. Tirate la linea indefinita DEF; fate al punto E l'angolo  $DEG=A$ , e l'angolo  $GEH=B$ ; l'angolo restante HEF sarà il terzo angolo



richiesto; poichè questi tre angoli presi insieme equivalgono a due angoli retti.

## PROBLEMA VIII.

*Essendo dati due lati B, e C d' un trian- Fig. 77.  
golo, e l'angolo A, che essi comprendono,  
descrivere il triangolo.*

Avendo tirata la linea indefinita DE, fate al punto D l'angolo EDF uguale all'angolo dato A; prendete quindi  $DG=B$ ,  $DH=C$ , e tirate GH; DGH sarà il triangolo cercato.

## PROBLEMA IX.

*Essendo dati un lato, e due angoli d' un  
triangolo descrivere il triangolo.*

I due angoli dati saranno o tutti due adiacenti al lato dato, o uno adjacente, e l'altro opposto. In questo ultimo caso cercate il terzo \*, ed avrete coè i due angoli adjacenti. \* Pr. 7. Posto ciò, tirate la retta DE uguale al lato Fig. 78.  
dato; fate al punto D l'angolo EDF uguale ad uno degli angoli adjacenti, e al punto E l'angolo DEG uguale all'altro; le due linee DF, EG si taglieranno in H; e DEH sarà il triangolo richiesto.

## PROBLEMA X.

*Essendo dati i tre lati A, B, C d' un trian- Fig. 79.  
golo descrivere il triangolo.*

Tirate DE uguale al lato A; dal punto E, come centro, e con un raggio uguale al secondo lato B descrivete un arco; dal punto D, come centro, e con un raggio uguale al terzo lato C descrivete un altr' arco, che

tagli il primo in F; tirate DF, EF, e DEF sarà il triangolo cercato.

*Scolio.* Se uno dei lati fosse maggiore della somma degli altri due, gli archi non si taglierebbero; ma la soluzione sarà sempre possibile se la somma dei due lati, presi come si vorrà, sia più grande del terzo.

PROBLEMA XI.

**Fig. 80.** *Essendo dati due lati A, e B d'un triangolo, coll'angolo C opposto al lato B, descrivere il triangolo.*

Vi sono due casi: 1.° se l'angolo C è retto, od ottuso, fate l'angolo EDF uguale all'angolo C; prendete  $DE=A$ ; dal punto E, come centro, e con un raggio uguale al lato dato B descrivete un arco, che tagli in F la linea DF; tirate EF; e DEF sarà il triangolo richiesto.

Bisogna in questo primo caso che il lato B sia maggiore di A; poichè, l'angolo C essendo retto, od ottuso, è il maggiore degli angoli del triangolo; dunque il lato opposto dev'esser pure il maggiore.

**Fig. 81.** 2.° Se l'angolo C è acuto, e B maggiore di A, ha sempre luogo la medesima costruzione, e DEF è il triangolo cercato.

**Fig. 82.** Ma se, essendo acuto l'angolo C, il lato B è minore di A, allora l'arco descritto col centro in E, e col raggio  $EF=B$  taglierà il lato DF in due punti F e G situati dalla medesima parte per rapporto a D; dunque vi saranno due triangoli DEF, DEG, che soddisfaranno ugualmente al problema.

*Scolio.* Il problema sarebbe impossibile in tutti i casi se il lato B fosse minore della perpendicolare abbassata da E sulla linea DF.

PROBLEMA XII.

*Essendo dati i lati adjacenti A, e B d' un Fig. 83.*  
*parallelogrammo coll' angolo C da essi com-*  
*preso, descrivere il parallelogrammo.\**

Tirate la linea  $DE=A$ ; fate al punto D l'angolo  $FDE=C$ ; prendete  $DF=B$ ; descrivete due archi, uno dal punto F, come centro, e con un raggio  $FG=DE$ , l'altro dal punto E, come centro, e con un raggio  $EG=DF$ ; al punto G, ove questi due archi si tagliano, tirate FG, EG; e DEFG sarà il parallelogrammo richiesto.

Poichè, per costruzione, i lati opposti sono uguali; dunque la figura descritta è un parallelogrammo\*; e questo parallelogrammo è formato coi lati dati, e l'angolo dato. \* 29, 1.

*Corollario.* Se l'angolo dato è retto, la figura sarà un rettangolo; se inoltre i lati sono uguali, sarà un quadrato.

PROBLEMA XIII.

*Trovare il centro d' un circolo, o d' un suo arco dato.*

Prendete a piacere nella circonferenza, o nell'arco tre punti A, B, C; tirate, o immaginate che si tirino le rette AB, e BC; dividete queste due linee in due parti uguali per mezzo delle perpendicolari DE, FG; il punto O, ove queste perpendicolari s'incontrano, sarà il centro cercato. Fig. 84.

*Scolio.* La medesima costruzione serve per far passare una circonferenza di circolo per i tre punti dati A, B, C, e parimente a far sì che il triangolo dato ABC sia iscritto in un circolo.

## PROBLEMA XIV.

*Per un punto dato condurre una tangente ad un circolo dato.*

Fig. 35. Se il punto dato A è sulla circonferenza, tirate il raggio CA, e conducete AD perpendicolare a CA; AD sarà la tangente richiesta.\*

\* 9, c.  
Fig. 34. Se il punto A è fuori del circolo, unite il punto A, ed il centro colla linea retta CA; dividete CA in due parti uguali nel punto O; dal punto O, come centro, e col raggio OC descrivete una circonferenza, che taglierà la circonferenza data nel punto B; tirate AB; ed AB sarà la tangente cercata.

Poichè, tirando CB, l'angolo CBA iscritto nel mezzo-circolo è un angolo retto\*; dunque AB è perpendicolare all'estremità del raggio CB; dunque è tangente.

\* 18, 2.  
*Scolio.* Essendo il punto A fuori del circolo, si vede che vi son sempre due tangenti uguali AB, AD, che passano per il punto A; esse sono uguali, perchè i triangoli rettangoli CBA, CDA hanno l'ipotenusa CA comune, ed il lato CB=CD\*; dunque AD=AB, e nel tempo stesso l'angolo CAD=CAB.

\* 18, 1.

## PROBLEMA XV.

*Iscrivere un circolo in un triangolo dato Fig. 87.*  
ABC.

Dividete gli angoli A, e B in due parti uguali colle rette AO, e BO, che s'incontreranno in O; dal punto O abbassate le perpendicolari OD, OE, OF sui tre lati del triangolo: dico che queste perpendicolari saranno uguali fra loro; poichè, per costruzione, l'angolo DAO=OAF, l'angolo retto ADO=AFO; dunque il terzo angolo AOD è uguale al terzo AOF. D'altronde il lato AO è comune ai due triangoli AOD, AOF, e gli angoli adiacenti al lato uguale sono uguali; dunque questi due triangoli sono uguali; dunque DO=OF. Si proverà parimente che i due triangoli BOD, BOE sono uguali; dunque OD=OE; dunque le tre perpendicolari OD, OE, OF sono uguali fra loro.

Adesso, se dal punto O, come centro, e col raggio OD si descriva una circonferenza, è chiaro che questa sarà iscritta nel triangolo ABC; poichè il lato AB, perpendicolare all'estremità del raggio OD, è una tangente; ed è lo stesso dei lati BC, AC.

*Scolio.* Le tre linee rette, che dividono in due parti eguali i tre angoli d'un triangolo, concorrono in un medesimo punto.

## PROBLEMA XVI.

*Sopra una linea retta AB descrivere un* Fig. 88  
5 8.9

*segmento capace dell'angolo dato C, cioè un segmento tale che tutti gli angoli, che vi posson essere iscritti, siano uguali all'angolo dato C.*

Prolungate AB verso D; fate al punto B l'angolo  $\angle DBE = C$ ; tirate BO perpendicolare a BE, e GO perpendicolare sul mezzo d'AB; dal punto d'incontro O, come centro, e col raggio OB descrivete un circolo; il segmento richiesto sarà AMB.

Poichè, siccome BF è perpendicolare all'estremità del raggio OB, dessa è una tangente, e l'angolo ABF ha per misura la metà dell'arco AKB\*; d'altronde l'angolo AMB, come angolo iscritto, ha pur per misura la metà dell'arco AKB; dunque l'angolo  $\angle AMB = \angle ABF = \angle EBD = C$ ; dunque tutti gli angoli iscritti nel segmento AMB sono uguali all'angolo dato C.

*Scolio.* Se l'angolo dato fosse retto, il segmento cercato sarebbe il mezzo-circolo descritto sul diametro AB.

#### PROBLEMA XVII.

*Fig. 90. Trovare il rapporto numerico di due linee rette date AB, CD, seppure queste due linee hanno fra loro una misura comune.*

Portate la minore CD sulla maggiore AB quante volte può esservi contenuta, per esempio, due volte, e col resto BE.

Portate il resto BE sulla linea CD quante volte può esservi contenuto, una volta, per esempio, e col resto DF.

Portate il secondo resto DF sul primo BE quante volte può esservi contenuto, una volta, per esempio, e col resto BG.

Portate il terzo resto BG sul secondo DF quante volte può esservi contenuto.

Continuate così finchè abbiate un resto, che sia contenuto un numero esatto di volte nel suo precedente.

Allora quest'ultimo resto sarà la comune misura delle linee proposte, e riguardandolo come l'unità, si troveranno facilmente i valori dei resti precedenti, e finalmente i valori delle due linee proposte, donde si conchiuderà il loro rapporto in numeri.

Per esempio, se si trova che GB è contenuto due volte appunto in FD, BG sarà la comun misura delle due linee proposte. Sia  $BG=1$ , si avrà  $FD=2$ ; ma EB contiene una volta FD più GB; dunque  $EB=3$ ; CD contiene una volta EB più FD; dunque  $CD=5$ ; finalmente AB contiene due volte CD più EB; dunque  $AB=13$ ; dunque il rapporto delle due linee AB, CD è quello di 13 a 5. Se la linea CD fosse presa per unità, la linea AB sarebbe  $\frac{13}{5}$ ; e se la linea AB fosse presa per unità, la linea CD sarebbe  $\frac{5}{13}$ .

*Scolio.* Il metodo, che si è spiegato, è quel medesimo, che prescrive l'Aritmetica per trovare il comun divisore di due numeri; laonde non ha bisogno d'altra dimostrazione.

Può accadere che, per quanto si continui

8  
9/

lungamente l'operazione, non si trovi mai un resto, che sia contenuto un numero preciso di volte nel suo precedente. Allora le due linee non hanno misura comune, e si chiamano *incommensurabili*: se ne vedrà in seguito un esempio nel rapporto, che vi è fra la diagonale, ed il lato d'un quadrato. Non si può dunque allora trovare il rapporto esatto in numeri; ma, trascurando l'ultimo resto, si troverà un rapporto prossimo, e tanto più prossimo quanto più lungi sarà stata portata l'operazione.

## PROBLEMA XVIII.

Fig. 91. *Essendo dati due angoli A, e B, trovare la loro misura comune, se l'abbiano, e quindi il loro rapporto in numeri.*

Descrivete con raggi uguali gli archi CD, EF, che servono di misura a questi angoli; procedete, in seguito, per la comparazione degli archi CD, EF, come nel problema precedente, poichè, un arco può portarsi sopra un arco dello stesso raggio, come una linea retta sopra una linea retta. Giungerete così alla misura comune degli archi CD, EF, se l'abbiano, ed al loro rapporto in numeri. Questo rapporto sarà lo stesso di quello degli angoli dati \*; e se DO è la misura comune degli archi, DAO sarà quella degli angoli.

*Scolio.* Si può così trovare il valore assoluto d'un angolo paragonando l'arco, che gli serve di misura, a tutta la circonferenza.



za: per esempio, se l'arco CD stà alla circonferenza come 3 a 25, l'angolo A sarà  $\frac{3}{25}$  di quattro angoli retti, o  $\frac{12}{25}$  d'un angolo retto.

Potrà pure accadere che gli archi paragonati non abbiano alcuna misura comune; allora non si avranno per gli angoli se non che dei rapporti in numeri più, o meno prossimi, secondo che l'operazione sarà stata spinta più, o meno lungi.

---

## LE PROPORZIONI DELLE FIGURE

## DEFINIZIONI

1. Chiamerò *figure equivalenti* quelle, le di cui superficie sono uguali.

Due figure possono essere equivalenti, quantunque siano affatto dissimili; per esempio, un circolo può essere equivalente a un quadrato, un triangolo ad un rettangolo, ec.

La denominazione di *figure uguali* sarà conservata a quelle, che essendo applicate l'una sull'altra coincidono in tutti i lor punti. Tali sono due circoli, di cui i raggi siano uguali, due triangoli, di cui i tre lati siano rispettivamente uguali, ec.

2. Due figure son *simili* quando hanno gli angoli rispettivamente uguali, ed i lati *omologhi* proporzionali. Per lati omologhi s'intendono quelli, che hanno la medesima posizione nelle due figure, o che sono adiacenti ad angoli uguali. Questi angoli stessi si chiamano angoli *omologhi*.

Due figure uguali son sempre simili, ma due figure simili possono essere molto disuguali.

3. In due circoli differenti si chiamano *ar*

*chi simili, settori simili, segmenti simili* quelli, che corrispondono ad angoli al centro uguali.

Così, essendo l'angolo A uguale all'angolo O, l'arco BC è simile all'arco DE, il settore ABC al settore ODE, ec. Fig. 92.

4. L'*altezza* d'un parallelogrammo è la perpendicolare EF condotta fra i due lati, o *basi* opposte AB, CD. Fig. 93.

5. L'*altezza* d'un triangolo è la perpendicolare AD abbassata da un angolo A sul lato opposto BC, che si chiama la *base*. Fig. 94.

6. L'*altezza* del trapezio è la perpendicolare EF condotta fra le sue due *basi* parallele AB, CD. Fig. 95.

7. *Area e superficie* d'una figura sono termini presso a poco sinonimi. L'*area* indica più particolarmente la quantità superficiale della figura in quanto che essa è misurata mediante il paragone ad altre superficie.

*N. B.* Per l'intelligenza di questo Libro, e dei seguenti bisogna aver presente la teoria delle proporzioni, per la quale rimandiamo ai Trattati ordinarj di Aritmetica, e d'Algebra. Faremo solamente un'osservazione, che è importantissima per fissare il vero senso delle proporzioni, e dissipare ogni oscurità sì nell'enunciato, che nelle dimostrazioni.

Se si abbia la proporzione  $A : B :: C : D$ , si sa che il prodotto degli estremi  $A \times D$  è uguale al prodotto de' medj  $B \times C$ .

Questa verità è incontrastabile in numeri;

lo è pure in grandezze di qualunque sorte, purchè si esprimano, o s'imaginino espresse in numeri; il che si può sempre supporre: per esempio, se  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  sono linee, si può imaginare che una di queste quattro linee, o sivero una quinta, serva di misura comune a tutte, e sia presa per unità; allora  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  rappresentano ciascuna un certo numero d'unità intero, o fratto, commensurabile, o incommensurabile, e la proporzione fra le linee  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  diventa una proporzione di numeri. Il prodotto delle linee  $A$ , e  $D$ , che si chiama ancora il loro *rettangolo*, non è dunque altro che il numero d'unità lineari contenute in  $A$  moltiplicato per il numero delle unità lineari contenute in  $D$ ; e si concepisce facilmente che questo prodotto può, e dev'essere uguale a quello, che resulta similmente dalle linee  $B$ , e  $C$ .

Le grandezze  $A$ , e  $B$  posson essere d'una specie, per esempio, linee, e le grandezze  $C$  e  $D$  d'un'altra specie, per esempio, superficie: allora bisogna riguardar sempre queste grandezze come numeri;  $A$ , e  $B$  si esprimeranno in unità lineari,  $C$ , e  $D$  in unità superficiali, ed il prodotto  $A \times D$  sarà un numero, come il prodotto  $B \times C$ .

Generalmente in tutte le operazioni, che si faranno sulle proporzioni, bisogna sempre riguardare i termini di queste proporzioni come tanti numeri, ciascuno della specie che gli conviene, e non si durerà alcuna fatica a concepir queste operazioni, e le conseguenze che ne derivano.

Dobbiamo pure avvertire che parecchie delle nostre dimostrazioni sono fondate sopra alcune delle regole più semplici dell'Algebra, le quali sono fondate esse stesse sugli assiomi cognitivi: così, se si ha  $A=B+C$ , e si moltiplichino ogni membro per una stessa quantità  $M$ , se ne conchiude  $A \times M = B \times M + C \times M$ . Parimente, se si ha  $A=B+C$ , e  $D=E-C$ , e si aggiungano le quantità uguali, scancellando  $+C$ , e  $-C$ , che si distruggono, se ne conchiuderà  $A+D=B+E$ ; e così d'altri casi. Tutto ciò è assai chiaro di per sé; ma in caso di difficoltà sarà bene consultare i Libri d'Algebra, e di frammischiarne lo studio delle due Scienze.

### PROPOSIZIONE I.

#### TEOREMA

— *I parallelogrammi, che hanno basi uguali, ed altezze uguali, sono equivalenti.*

Sia  $AB$  la base comune de' due parallelogrammi  $ABCD$ ,  $ABEF$ : poichè si suppongono della medesima altezza, le basi superiori  $DC$ ,  $FE$  saranno situate sopra una medesima linea retta parallela ad  $AB$ . Ora, per la natura dei parallelogrammi, si ha  $AD=BC$ , e  $AF=BE$ ; per la medesima ragione, si ha  $DC=AB$ , e  $FE=AB$ ; dunque  $DC=FE$ ; dunque togliendo  $DC$ , e  $FE$  dalla medesima linea  $DE$ , i resti  $CE$ , e  $DF$  saranno uguali. Da ciò segue che i triangoli  $DAF$ ,  $CBE$  sono equilateri fra di loro, e per conseguenza uguali.

Fig. 96.

Ma, se dal quadrilatero ABED si toglie il triangolo ADF, resta il parallelogrammo ABEF; e se dallo stesso quadrilatero ABED si toglie il triangolo GBE, resta il parallelogrammo ABCD. Dunque i due parallelogrammi ABCD, ABEF, che hanno la medesima base, e la medesima altezza, sono equivalenti.

Fig. 97. *Corollario.* Dunque ogni parallelogrammo ABCD è equivalente al rettangolo ABEF sulla medesima base, e della medesima altezza.

## PROPOSIZIONE II.

### TEOREMA

Fig. 98. *Ogni triangolo ABC è la metà del parallelogrammo ABCD, che ha la medesima base, e la medesima altezza.*

\* 31, 1. Perchè i triangoli ABC, ACD sono uguali \*.

*Corollario 1.* Dunque un triangolo ABC è la metà del rettangolo BCEF, che ha la medesima base BC, e la medesima altezza AO; poichè il rettangolo BCEF è equivalente al parallelogrammo ABCD.

*Corollario 2.* Tutti i triangoli, che hanno basi uguali, ed altezze uguali, sono equivalenti.

## PROPOSIZIONE III.

### TEOREMA

Fig. 99. *Due rettangoli della medesima altezza stanno fra loro come le rispettive basi.*

Siano ABCD, AEFD due rettangoli, che

hanno per altezza comune AD; dico che stanno fra loro come le loro basi AB, AE.

Supponiamo primieramente che le basi AB, AE siano commensurabili fra di loro, e che stiano, per esempio, come i numeri 7 e 4: se si divide AB in sette parti uguali, AE conterrà 4 di queste parti; alzate ad ogni punto di divisione una perpendicolare alla base, formerete così sette rettangoli parziali, che saranno fra loro uguali, perchè avranno la medesima base, e la medesima altezza. Il rettangolo ABCD conterrà sette rettangoli parziali, mentre AEFD ne conterrà quattro. Dunque il rettangolo ABCD stà al rettangolo AEFD come 7 a 4, o come AB stà ad AE. Il medesimo ragionamento può essere applicato ad ogni altro rapporto diverso da quello di 7 a 4; dunque, qualunque sia questo rapporto, purchè commensurabile, si avrà

$$ABCD : AEFD :: AB : AE.$$

Supponiamo in secondo luogo che le basi Fig. 100. AB, AE siano incommensurabili fra di loro; dico che sarà parimente

$$ABCD : AEFD :: AB : AE.$$

Poichè, se questa proporzion non è vera, restando gli stessi i tre primi termini, il quarto sarà maggiore, o minore di AE. Supponiamo che sia maggiore, e che si abbia

$$ABCD : AEFD :: AB : AO.$$

Dividete la linea AB in parti uguali minori di EO, vi sarà almeno un punto di divisione I situato fra E, ed O; per questo

punto alzate la perpendicolare IK; le basi AB, AI saranno commensurabili fra di loro; e così si avrà, secondo ciò che si è ora dimostrato,

$$ABCD : AIKD :: AB : AI.$$

Ma si ha per supposizione

$$ABCD : AEFD :: AB : AO.$$

In queste due proporzioni gli antecedenti sono uguali; dunque i conseguenti sono proporzionali, e ne risulta

$$AIKD : AEFD :: AI : AO.$$

Ora AO è maggiore d'AI; dunque, affinchè sussistesse la proporzione, bisognerebbe che il rettangolo AEFD fosse maggiore di AIKD; ma al contrario è minore; dunque la proporzione è impossibile; dunque ABCD non può stare ad AEFD come AB stà ad una linea maggiore di AE.

Con un ragionamento affatto simile si proverebbe che il quarto termine della proporzione non può esser minore di AE; dunque esso è esattamente uguale ad AE.

Laonde, qualunque sia il rapporto delle basi, due rettangoli della medesima altezza ABCD, AEFD stanno fra loro come le loro basi AB, AE.

#### PROPOSIZIONE IV.

##### TEOREMA

Fig. 101. *Due rettangoli qualunque ABCD, AEGF stanno fra loro come i prodotti delle basi moltiplicate per l'altezze; talmente che si ha*  $ABCD : AEGF :: AB \times AD : AE \times AF.$



Avendo disposto i due rettangoli in modo che gli angoli in A sieno opposti al vertice, prolungate i lati GE, CD finchè s'incontrino in H: i due rettangoli ABCD, AEHD hanno la medesima altezza AD; stanno dunque fra loro come le basi AB, AE: parimente i due rettangoli AEHD, AEGF hanno la medesima altezza AE; stanno dunque come le loro basi AD, AF; laonde si avranno le due proporzioni

$$\begin{aligned} ABCD : AEHD &:: AB : AE, \\ AEHD : AEGF &:: AD : AF. \end{aligned}$$

Moltiplicando per ordine queste due proporzioni, e osservando che il medio termine AEHD può essere omissso, come moltiplicatore comune all'antecedente ed al conseguente, si avrà

$$ABCD : AEGF :: AB \times AD : AE \times AF.$$

*Scolio.* Dunque si può prendere per misura d'un rettangolo il prodotto della sua base per la sua altezza, purchè s'intenda per questo prodotto quello di due numeri, cioè, il numero d'unità lineari contenute nella base, ed il numero d'unità lineari contenute nell'altezza.

Questa misura d'altronde non è assoluta, ma soltanto relativa; suppone che si valuti similmente un altro rettangolo misurando i suoi lati colla stessa unità lineare; si ottiene così un secondo prodotto; ed il rapporto dei due prodotti è uguale a quello de' rettangoli, conforme alla proposizione ora dimostrata.

Per esempio, se la base del rettangolo A

è di tre unità, e la sua altezza di dieci, il rettangolo sarà rappresentato dal numero  $3 \times 10$ , ossia 30, numero che così isolato non significa niente; ma se si ha un secondo rettangolo B, la di cui base sia di dodici unità, e l'altezza di sette, il secondo rettangolo sarà rappresentato dal numero  $7 \times 12$ , cioè 84: di qui si conchiuderà che i due rettangoli A, e B stanno fra loro come 30 sta a 84; dunque, se si convenisse di prendere il rettangolo A per unità di misura nelle superficie, il rettangolo B avrebbe allora per misura assoluta  $\frac{84}{30}$ , cioè sarebbe uguale a  $\frac{14}{5}$  unità superficiali.

È più comune, e più semplice il prendere il quadrato per l'unità di superficie, e si sceglie il quadrato, il cui lato sia l'unità di lunghezza; allora la misura, che abbiám riguardato semplicemente come relativa, diventa assoluta: per esempio, il numero 30, col quale abbiám misurato il rettangolo A, rappresenta 30 unità superficiali, o 30 di quei quadrati, il cui lato è uguale all'unità. Ciò è reso sensibile dalla figura 102.

Si confonde assai spesso in Geometria il prodotto di due linee col loro *rettangolo*, e quest'espressione è anche passata nell'Aritmetica, ove il prodotto di due numeri ineguali si chiama il loro rettangolo, come si chiama *quadrato* il prodotto d'un numero moltiplicato per se medesimo.

I quadrati de' numeri 1, 2, 3, ec. sono 1, 4, 9, ec. Così si vede che il quadrato

fatto sopra una linea doppia è quadruplo, sopra una linea tripla è nove volte più grande, e così di seguito.

Fig. 103.

## PROPOSIZIONE V.

## TEOREMA

*L'area d'un parallelogrammo qualunque è uguale al prodotto della sua base per la sua altezza.*

Poichè il parallelogrammo ABCD è equi- Fig. 99.  
valente al rettangolo ABEF, che ha la medesima base AB, e la medesima altezza BE\*; \* 1.  
or questo ha, per misura  $AB \times BE$ \*; dunque \* 4.  
 $AB \times BE$  è eguale all'area del parallelogrammo ABCD.

*Corollario.* Dunque i parallelogrammi della medesima base stanno fra loro come le loro altezze, ed i parallelogrammi della medesima altezza stanno fra loro come le basi; poichè, A, B, C essendo tre grandezze qualunque, si ha generalmente  $A \times C : B \times C :: A : B$ .

## PROPOSIZIONE VI.

## TEOREMA

*L'area d'un triangolo è uguale al prodotto della sua base per la metà della sua altezza.*

Poichè il triangolo ABC è la metà del pa- Fig. 104.  
rallelogrammo ABCE, che ha la medesima base BC, e la medesima altezza AD\*: ora la \* 2.  
superficie del parallelogrammo  $= BC \times AD$ \*; \* 5.  
dunque quella del triangolo  $= \frac{1}{2}(BC \times AD)$ ,  
e  $BC \times \frac{1}{2}AD$ .

*Corollario.* Dunque due triangoli della medesima altezza stanno fra loro come le basi, e due triangoli della medesima base stanno fra loro come le altezze.

## PROPOSIZIONE VII.

## TEOREMA

Fig. 105. *L'area del trapezio ABCD è uguale alla sua altezza EF moltiplicata per la mezza-somma delle due basi parallele AB, CD.*

Per il punto I, mezzo del lato CB, conducete KL parallela al lato opposto AD, e prolungate DC finchè incontri KL.

Nei triangoli IBL, ICK si ha il lato  $IB=IC$ , per costruzione, l'angolo  $LIB=ICK$ , e l'angolo  $IBL=ICK$ , poichè CK, e BL son parallele \*; dunque questi triangoli sono uguali \*\*;  
 \* 25, 1.  
 \*\* 7, 1. dunque il trapezio ABCD è equivalente al parallelogrammo ADKL, ed ha per misura  $EF \times AL$ .

Ma si ha  $AL=DK$ ; e poichè il triangolo IBL è uguale al triangolo KCI, anco il lato  $BL=CK$ : dunque  $AB+CD=AL+DK=2AL$ , ovvero AL è la mezza-somma delle basi AB, CD: dunque finalmente l'area del trapezio ABCD è uguale all'altezza EF moltiplicata per la mezza-somma delle basi AB, CD, il che si esprime così:  $ABCD=EF \times \frac{AB+CD}{2}$ .

*Scolio.* Se per il punto I, mezzo di BC, si conduce IH parallela alla base AB, il punto H sarà pure il mezzo di AD, perchè la figura AHIL è un parallelogrammo, come anche

DH $\perp$ K; si ha dunque AH=IL, e DH=IK: ora IL=IK, poichè i triangoli BIL, CIK sono uguali; dunque AH=DH.

Si può osservare che la linea HI=AL= $\frac{AB+CD}{2}$ ; dunque l'area del trapezio può esprimersi così EF $\times$ HI. Essa è uguale all'altezza del trapezio moltiplicata per la linea, che unisce i mezzi dei lati non paralleli.

## PROPOSIZIONE VIII.

## TEOREMA

— Se una linea AC è divisa in due parti AB, BC, il quadrato fatto sull'intera linea AC conterrà il quadrato fatto sopra AB, più il quadrato fatto sopra BC, più due volte il rettangolo compreso sotto le due parti AB, e BC, il che si esprime così:  $AC^2$  o  $(AB+BC)^2 = AB^2 + BC^2 + 2AB \times BC$ .

Costruite il quadrato ACDE; prendete AF=AB; conducete FG parallela ad AC, e BH parallela ad AE.

Il quadrato ACDE è diviso in quattro parti: la prima ABIF è il quadrato fatto sopra AB, poichè si è preso AF=AB; la seconda IGDH è il quadrato fatto sopra BC, poichè, siccome si ha AC=AE, e AB=AF, la differenza AC—AB è uguale alla differenza AE—AF, cioè BC=EF. Ma, a cagion delle parallele, IG=BC, e DG=EF; dunque HIGD è uguale al quadrato fatto sopra BC. Essendo tolte queste due parti dal quadrato

totale, restano i due rettangoli BCGI, EF\H, che hanno ciascun per misura  $AB \times BC$ . Dunque il quadrato fatto sopra AC, ec.

*Scolio.* Questa proposizione si accorda con quella, che si dimostra in Algebra per la formazione del quadrato d'un binomio, e ch'è così espressa  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ .

### PROPOSIZIONE IX.

#### TEOREMA

Fig. 107. *Se la linea AC è la differenza di due linee rette AB, BC, il quadrato fatto sopra AC conterrà il quadrato AB, più il quadrato di BC, meno due volte il rettangolo fatto sopra AB, e BC; cioè si avrà  $\overline{AC}^2$ , o  $(AB - BC)^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2AB \times BC$ .*

Costruite il quadrato ABIF; prendete AE = AC; conducete CG parallela a BI, HK parallela ad AB; e terminate il quadrato EPLK.

I due rettangoli CBIG, GLKD hanno ciascun per misura  $AB \times BC$ : se si tolgano entrambi dalla figura intera ABILKEA, che ha per valore  $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$ , è chiaro che resterà il quadrato ACDE; dunque, ec.

*Scolio.* Questa proposizione combina colla formula d'Algebra  $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ .

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA

*Il rettangolo fatto sulla somma, e la differenza di due rette è uguale alla differenza dei quadrati di queste linee: così si ha (AB+BC)* Fig. 108.

$$\times (AB-BC) = \overline{AB}^2 - \overline{BC}^2.$$

Costruite sopra AB, ed AC i quadrati ABIF, ACDE; prolungate AB d'una quantità BK=BC; e terminate il rettangolo AKLE.

La base AK del rettangolo è la somma delle due rette AB, BC; la sua altezza AB è la differenza di queste medesime linee. Dunque il rettangolo AKLE=(AB+BC)×(AB-BC). Ma questo medesimo rettangolo è composto delle due parti ABHE+BHLK, e la parte BHLK è uguale al rettangolo EDGF, perchè BH=ED, e BK=EF; dunque AKLE=ABHE+EDGF. Or queste due parti formano il quadrato ABIF, meno il quadrato fatto sopra BC: dunque finalmente

$$(AB+BC) \times (AB-BC) = \overline{AB}^2 - \overline{BC}^2.$$

*Scolio.* Questa proposizione combina colla formula d'Algebra  $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ .

## PROPOSIZIONE XI.

## TEOREMA

*Il quadrato fatto sull'ipotenusa d'un triangolo rettangolo è uguale alla somma dei quadrati fatti sopra gli altri due lati.*

Fig. 109. Sia ABC un triangolo rettangolo in A; avendo formato de' quadrati sopra i tre lati, abbassate dall'angolo retto sopra l'ipotenusa la perpendicolare AD, che prolungherete fino in E; tirate quindi le diagonali AF, CH.

L'angolo ABF è composto dell'angolo ABC più l'angolo retto CBF; l'angolo CBH è composto del medesimo angolo ABC più l'angolo retto ABH; dunque l'angolo  $ABF = HBC$ . Ma  $AB = BH$ , come lati d'un medesimo quadrato, e  $BF = BC$  per la medesima ragione; dunque i triangoli ABF, HBC hanno un angolo uguale compreso fra lati uguali; dunque

\* 6, 1. sono uguali \*.

Il triangolo ABF è la metà del rettangolo BDEF (o, per più brevità, del rettangolo BE), che ha la medesima base BF, e la

\* Pr. 2. medesima altezza BD \*. Il triangolo HBC è parimente la metà del quadrato AH, perchè essendo retto l'angolo BAC, come pure BAL, AC, ed AL non fanno che una sola linea retta parallela ad HB; dunque il triangolo HBC, ed il quadrato AH, che hanno la base comune BH, hanno pure l'altezza comune AB; dunque il triangolo è la metà del quadrato.

Si è provato che il triangolo ABF è ugua-



le al triangolo HBC; dunque il rettangolo BDEF, doppio del triangolo ABF, è equivalente al quadrato AH, doppio del triangolo HBC. Si dimostrerà parimente che il rettangolo CDEG è equivalente al quadrato AI; ma i due rettangoli BDEF, CDEG presi insieme fanno il quadrato BCGF; dunque il quadrato BCGF fatto sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati ABHL, ACIK fatti sugli altri due lati, o in altri termini,

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2.$$

*Corollario I.* Dunque il quadrato d'uno dei due lati dell'angolo retto è uguale al quadrato dell'ipotenusa meno il quadrato dell'altro lato; il che si esprime così  $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 - \overline{AC}^2$ .

*Corollario II.* Sia ABCD un quadrato, AC Fig. 103. la sua diagonale; il triangolo ABC è rettangolo ed isoscele, onde si avrà  $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = 2\overline{AB}^2$ . Dunque il quadrato fatto sulla diagonale AC è doppio del quadrato fatto sul lato AB.

Si può render sensibile questa proprietà conducendo per i punti A, e C delle parallele a BD, e per i punti B, e D delle parallele ad AC: si formerà così il quadrato EFGH, ch'è il quadrato di AC. Or si vede che EFGH contiene otto triangoli uguali, e ABCD quattro; dunque il quadrato EFGH è doppio d'ABCD.

Poichè  $\overline{AC}^2 : \overline{AB}^2 :: 2 : 1$ , si ha, estraendo

la radice quadrata,  $AC : AB :: \sqrt{2} : 1$ .  
 Dunque la diagonal d'un quadrato è incom-  
 mensurabile col suo lato.

Ciò si spiegherà di più in un'altra occa-  
 sione.

Fig. 109. *Corollario III.* Si è dimostrato che il qua-  
 drato  $AH$  è equivalente al rettangolo  $BDEF$ ;  
 ora, a cagione dell'altezza comune  $BF$ , il  
 quadrato  $BCGF$  stà al rettangolo  $BDEF$  co-  
 me la base  $BC$  alla base  $BD$ ; dunque

$$\overline{BC}^2 : \overline{AB}^2 :: BC : BD$$

Dunque il quadrato dell'ipotenusa stà al  
 quadrato d'uno dei lati dell'angolo retto co-  
 me l'ipotenusa stà al segmento adjacente a  
 questo lato. Il segmento, di cui si tratta, è  
 la parte dell'ipotenusa determinata dalla per-  
 pendicolare abbassata dall'angolo retto; così  
 $BD$  è il segmento adjacente al lato  $AB$ , e  
 $DC$  è il segmento adjacente al lato  $AC$ . Si  
 avrebbe similmente

$$\overline{BC}^2 : \overline{AC}^2 :: BC : CD.$$

*Corollario IV.* I rettangoli  $BDEF$ ,  $DCGE$ ,  
 avendo pure la medesima altezza, stanno fra  
 loro come le loro basi  $BD$ ,  $DC$ . Or que-  
 sti rettangoli sono equivalenti ai quadrati  
 $\overline{AB}^2$ ,  $\overline{BC}^2$ ; dunque

$$\overline{AB}^2 : \overline{AC}^2 :: BD : DC.$$

Dunque i quadrati dei due lati dell'an-  
 golo retto stanno fra loro come i segmenti  
 dell'ipotenusa adjacenti a questi lati.

## PROPOSIZIONE XII.

## TEOREMA

In un triangolo ABC, se l'angolo C è obtuso, Fig. 110.  
 to, il quadrato del lato opposto sarà minore della somma dei quadrati dei lati, che comprendono l'angolo C; ed abbassando la perpendicolare AD sopra BC, la differenza sarà uguale al doppio del rettangolo BC × CD; talmente che si avrà

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 - 2BC \times CD.$$

Vi sono due casi. 1.° Se la perpendicolare cade dentro del triangolo ABC, si avrà

$$\overline{BD} = \overline{BC} - \overline{CD}, \text{ e per conseguenza } * \overline{BD}^2 = * \text{Pr. 9} \\ \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 - 2BC \times CD. \text{ Aggiungendo da ambe}$$

le parti  $\overline{AD}^2$ , e osservando che i triangoli rettangoli ABD, ABC danno  $\overline{AD}^2 + \overline{BD}^2 = \overline{AB}^2$ ,  
 e  $\overline{AD}^2 + \overline{DC}^2 = \overline{AC}^2$ , si avrà  $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2BC \times CD$ .

2.° Se la perpendicolare AD cade fuori del triangolo ABC, si avrà  $\overline{BD} = \overline{CD} - \overline{BC}$ , e per conseguenza \*  $\overline{BD}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{BC}^2 - 2CD \times BC$ . \* 9.

Aggiungendo da ambe le parti  $\overline{AD}^2$ , se ne conchiuderà medesimamente

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 - 2BC \times CD.$$



## PROPOSIZIONE XIII.

## TEOREMA

Fig. III. In un triangolo ABC, se l'angolo C è ottuso, il quadrato del lato opposto AB sarà maggiore della somma dei quadrati dei lati, che comprendono l'angolo C, ed abbassando AD perpendicolare sopra BC, la differenza sarà uguale al doppio del rettangolo BC×CD; talmente che si avrà

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 + 2BC \times CD.$$

La perpendicolare non può cadere dentro del triangolo perchè, se cadesse, per esempio, in E, il triangolo ACE avrebbe ad un tempo stesso l'angolo retto E, e l'angolo ottuso C, \* 20, 1. il che è impossibile \*: dunque cade al di fuori \* Pr. 8. ri, e si ha  $\overline{BD} = \overline{BC} + \overline{CD}$ . Di quì risulta \*

$$\overline{BD}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + 2BC \times CD. \text{ Aggiungendo da}$$

ambe le parti  $\overline{AD}^2$ , e facendo le riduzioni, come nel teorema precedente, se ne conchiuderà  $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 + 2BC \times CD$ .

Scolio. Non v'è che il triangolo rettangolo, in cui la somma dei quadrati di due lati sia uguale al quadrato del terzo; poichè, se l'angolo compreso da questi lati è acuto, la somma de' loro quadrati sarà maggiore del quadrato del lato opposto; se è ottuso, sarà minore.

## PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA

In un triangolo qualunque ABC, se si conduce dal vertice al mezzo della base la linea retta AE, dico che si avrà  $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AE}^2 + 2\overline{BE}^2$ . Fig. 112.

Abbassate la perpendicolare AD sulla base BC; il triangolo AEC darà per il teorema XII.

$$\overline{AC}^2 = \overline{AE}^2 + \overline{EC}^2 - 2\overline{EC} \times \overline{ED}.$$

Il triangolo ABE darà per il teorema XIII.

$$\overline{AB}^2 = \overline{AE}^2 + \overline{EB}^2 + 2\overline{EB} \times \overline{ED}.$$

Dunque, sommando, ed osservando che  $\overline{EB} = \overline{EC}$ , si avrà

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AE}^2 + 2\overline{EB}^2.$$

*Corollario.* In ogni parallelogrammo la somma de' quadrati de' lati è uguale alla somma de' quadrati delle due diagonali.

Poichè le diagonali AC, BD si tagliano scambievolmente in due parti uguali al punto E \*, il triangolo ABC dà

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = 2\overline{AE}^2 + 2\overline{BE}^2.$$

Il triangolo ADC dà parimente

$$\overline{AD}^2 + \overline{DC}^2 = 2\overline{AE}^2 + 2\overline{DE}^2.$$

Sommando membro con membro, e osservando che  $\overline{BE} = \overline{DE}$ , si avrà

$$\overline{AB}^2 + \overline{AD}^2 + \overline{DC}^2 + \overline{BC}^2 = 4\overline{AE}^2 + 4\overline{DE}^2.$$

Ma  $4\overline{AE}^2$  è il quadrato di  $2\overline{AE}$ , o di AC;

\* 32, 1.

$4\overline{DE}^2$  è il quadrato di BD; dunque la somma de' quadrati de' lati è eguale alla somma dei quadrati delle due diagonali.

## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA

Fig. 114. La linea DE, condotta parallelamente alla base d'un triangolo ABC, divide i lati AB, AC proporzionalmente; talmente che si ha  $AD : DB :: AE : EC$ .

Tirate BE, e DC; i due triangoli BDE, DEC hanno la medesima base DE; lianno pure la medesima altezza, poichè i vertici B, e C sono situati sopra una parallela alla base; dunque questi triangoli sono

\* Pr. 2. equivalenti \*.

I triangoli ADE, BDE, di cui il vertice comune è E, hanno la medesima altezza, e stanno perciò fra loro come le basi AD,

\* Pr. 6. BD \*, onde si ha

$$ADE : BDE :: AD : BD.$$

I triangoli ADE, DEC, di cui il vertice comune è D, hanno pure la medesima altezza, e stanno fra loro come le basi AE, EC; dunque

$$ADE : DEC :: AE : EC.$$

Ma il triangolo BDE = DEC; dunque, a motivo del rapporto comune in queste due proporzioni, se ne conchiuderà

$$AD : DB :: AE : EC.$$

Corollario I. Di qui risulta componendo  $AD + DB : AD :: AE + EC : AE$ , o  $AB :$

AD :: AC : AE, e così pure AB : BD :: AC : CE.

*Corollario II. Se fra due rette AB, CD si conducono quante si vogliano parallele AC, EF, GH, BD, ec., queste rette saranno tagliate proporzionalmente, e sarà AE : CF :: EG : FH :: GB : HD.* Fig. 115.

Perchè, sia O il punto di concorso delle rette AB, CD: nel triangolo OEF, ove la linea AC è condotta parallela alla base, si avrà OE : AE :: OF : CF, o OE : OF :: AE : CF. Nel triangolo OGH si avrà similmente OE : EG :: OF : FH, od OE : OF :: EG : FH. Dunque, a cagione del rapporto comune OE : OF, queste due proporzioni danno AE : CF :: EG : FH. Si dimostrerà nello stesso modo che si ha EG : FH :: GB : HD, e così in seguito. Dunque le linee AB, CD sono tagliate proporzionalmente dalle parallele EF, GH, ec.

# PROPOSIZIONE XVI.

## TEOREMA

*Viceversa, se i lati AB, AC sono tagliati proporzionalmente dalla retta DE, talmente che sia AD : DB :: AE : EC, dico che la linea DE sarà parallela alla base BC.* Fig. 116.

Poichè, se DE non è parallela a BC, supponiamo che la sia DO; allora, secondo il teorema precedente, si avrà AD : BD :: AO : OC. Ma, per ipotesi, AD : DB :: AE : EC; dunque si avrebbe AO : OC :: AE : EC; proporzione impossibile, poichè da una

parte l'antecedente AE è maggiore dell'antecedente AO, e dall'altra il conseguente EC è minore di OC. Dunque la parallela a BC condotta dal punto D non può differir da DE; dunque DE è la vera parallela.

*Scolio.* La medesima conclusione avrebbe luogo se si supponesse la proporzione  $AB : AD :: AC : AE$ . Poichè questa proporzione darebbe  $AB \cdot AD : AD :: AC \cdot AE : AE$ , ovvero  $BD : AD :: CE : AE$ .

### PROPOSIZIONE XVII.

#### TEOREMA

**Fig. 147.** *La linea retta AD, che divide in due parti uguali l'angolo BAC d'un triangolo, dividerà la base BC in due segmenti BD, DC proporzionali ai lati adjacenti AB, AC; talmente che si avrà  $BD : DC :: AB : AC$ .*

Per il punto C conducete CE parallela ad AD fintanto che incontri il lato BA prolungato.

Nel triangolo BCE la linea AD è parallela alla base CE, onde si ha la proporzione \*

$$BD : DC :: AB : AE.$$

Ma il triangolo ACE è isoscele, perchè, a cagione delle parallele AD, CE, l'angolo

\* 25, 1.  $\angle ACE = \angle DAC$ , e l'angolo  $\angle AEC = \angle BAD$  \*; ora, per supposizione,  $\angle DAC = \angle BAD$ ; dunque l'angolo  $\angle ACE = \angle AEC$ ; dunque il lato

\* 13, 1.  $AE = AC$  \*; e sostituendo AC in vece di AE nella proporzion precedente, si avrà

$$BD : DC :: AB : AC.$$



## PROPOSIZIONE XVIII.

## TEOREMA

Due triangoli equiangoli hanno i lati omologhi proporzionati, e son simili.

Siano ABC, CDE due triangoli, che han- Fig. 119.  
no gli angoli rispettivamente uguali, cioè  $BAC = CDE$ ,  $ABC = DCE$ , e  $ACB = DEC$ ; dico che i lati omologhi, o adjacenti agli angoli uguali, saranno proporzionali; talmente che si avrà  $BC : CE :: AB : CD :: AC : DE$ .

Situate i lati omologhi BC, CE nella medesima direzione, e prolungate i lati BA, ED finchè s'incontrino in F. Poichè BCE è una linea retta, e che l'angolo  $BCA = CED$ , ne segue che AC è parallela a DE \*. Parimente, poichè l'angolo  $ABC = DCE$ , la linea AB è parallela a DC. Dunque la figura ACDF è un parallelogrammo. \* 15, 1.

Nel triangolo BFE la linea AC è parallela alla base FE, onde si ha  $BC : CE :: BA : AF$  \*. In vece di AF si può mettere la sua uguale CD, e si avrà

$$BC : CE :: BA : CD.$$

Nel medesimo triangolo BFE, se si riguardi BF come la base, CD è una parallela a questa base, e si ha la proporzione  $BC : CE :: FD : DE$ . In vece di FD mettendo la sua uguale AC, si avrà

$$BC : CE :: AC : DE.$$

Finalmente da queste due proporzioni,

ov. 12. mag. 12. 12.

che contengono il medesimo rapporto  $BC : CE$ , si può concludere ancora

$$AC : DE :: BA : CD.$$

Dunque i triangoli equiangoli  $BAC, CDE$  hanno i lati omologhi proporzionali: ma seguendo la definizione II.<sup>a</sup>, due figure son simili quando hanno ad un tempo stesso gli angoli rispettivamente uguali, ed i lati omologhi proporzionali; dunque i triangoli equiangoli  $BAC, CDE$  son due figure simili.

*Corollario.* Affinchè due triangoli siano simili basta che abbiano due angoli rispettivamente uguali, perchè allora il terzo sarà uguale in ambedue i triangoli, ed essi saranno rispettivamente equiangoli.

*Scolio.* Osservate che nei triangoli simili i lati omologhi son opposti ad angoli uguali; così, essendo l'angolo  $ACB$  uguale a  $DEC$ , il lato  $AB$  è omologo a  $DC$ ; medesimamente  $AC$ , e  $DE$  sono omologhi, perchè son opposti ad angoli eguali: essendo riconosciuti i lati omologhi, si formano facilmente le proporzioni

$$AB : DC :: AC : DE :: BC : CE.$$

### PROPOSIZIONE XIX.

#### TEOREMA

*Due triangoli, che hanno tutti i lati omologhi proporzionali, sono equiangoli, e perciò simili.*

Fig. 120

Supponiamo che si abbia  $BC : EF :: AB : DE :: AC : DF$ , dico che i triangoli  $ABC,$

DEF avranno gli angoli uguali, cioè  $A=D$ ,  $B=E$ ,  $C=F$ .

Fate al punto E l'angolo  $FEG=B$ , ed al punto F l'angolo  $EFG=C$ ; il terzo G sarà uguale al terzo A; e i due triangoli ABC, EFG saranno equiangoli. Dunque si avrà per il teorema precedente  $BC : EF :: AB : EG$ ; ma, per supposizione,  $BC : EF :: AB : DE$ ; dunque  $EG=DE$ . Si avrà ancora per il teorema medesimo  $BC : EF :: AC : FG$ . Ora si ha per supposizione  $BC : EF :: AC : DF$ ; dunque  $FG=DF$ . Dunque i triangoli EGF, DEF hanno i tre lati rispettivamente uguali; dunque sono uguali \*. Ma, per costruzione, il triangolo EGF è equiangolo al triangolo ABC; dunque anche i triangoli DEF, ABC sono equiangoli, e simili. \* 11, 1.

*Scolio I.* Si vede da queste due ultime proposizioni che nei triangoli l'eguaglianza degli angoli è una conseguenza della proporzionalità dei lati, e reciprocamente; in modo che una di queste condizioni serve per assicurar la similitudine dei triangoli. Non è lo stesso nelle figure di più di tre lati, perchè, cominciando fino da' quadrilateri, si può, senza cambiar gli angoli, alterare la proporzione de' lati, o senza alterare i lati cangiare la grandezza degli angoli: così la proporzionalità dei lati non può essere una conseguenza dell'uguaglianza degli angoli, nè *viceversa*. Si vede, per esempio, che, conducendo EF parallela a BC, gli angoli del quadrilatero AEFD sono uguali a quelli del quadrilatero ABCD; Fig. 121.

ma la proporzione de' lati è differente; del pari, senza cangiar di lunghezza i quattro lati  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $AD$ , si può avvicinare, o allontanare il punto  $B$  dal punto  $D$ , il che altererà gli angoli.

*Scolio II.* Le due proposizioni precedenti, che propriamente ne fanno una sola, unite a quella del quadrato dell'ipotenusa, sono le proposizioni più importanti, e più feconde della Geometria; bastano quasi esse sole a tutte le applicazioni, ed alla risoluzione di tutti i problemi: la ragione si è che tutte le figure posson dividersi in triangoli, ed un triangolo qualunque in due triangoli rettangoli. Perciò le proprietà generali dei triangoli racchiudono implicitamente quelle di tutte le rettilinee figure.

### PROPOSIZIONE XX.

#### TEOREMA

*Due triangoli, che hanno un angolo eguale compreso fra lati proporzionali, son simili.*

*Fig. 122.* Sia l'angolo  $A=D$ , e supponiamo che si abbia  $AB : DE :: AC : DF$ ; dico che il triangolo  $ABC$  è simile a  $DEF$ .

Prendete  $AG=DE$ , e conducete  $GH$  parallela a  $BC$ : l'angolo  $AGH$  sarà uguale all'angolo  $ABC$  \*, ed il triangolo  $AGH$  sarà equiangolo al triangolo  $ABC$ ; si avrà dunque  $AB : AG :: AC : AH$ . Ma, per supposizione,  $AB : DE :: AC : DF$ , e, per costruzione,  $AG=DE$ ; dunque  $AH=DF$ . I due triangoli  $AGH$ ,  $DEF$  hanno perciò

un angolo uguale compreso fra lati uguali, e per conseguenza sono uguali. Ora il triangolo AGH è simile ad ABC; dunque DEF è pure simile ad ABC.

PROPOSIZIONE XXI.

TEOREMA

*Due triangoli, che hanno i lati omologhi parallelli, o che gli hanno rispettivamente perpendicolari, son simili.*

Perchè 1.° se il lato AB è parallelo a DE, Fig. 123. e BC ad EF, l'angolo ABC sarà uguale a DEF \*; se di più AC è parallela a DF, \* 28, 1. l'angolo ACB sarà uguale a DFE, e così BAC ad EDF; dunque i triangoli ABC, DEF sono equiangoli; dunque son simili.

2.° Sia il lato DE perpendicolare ad AB, e il lato DF ad AC; nel quadrilatero AIDH Fig. 124. i due angoli I, e H saranno retti; i quattro angoli equivalgono insieme a quattro angoli retti\*; dunque i due rimanenti IAH, IDH \* 21, 1. equivalgono a due angoli retti. Ma i due angoli EDF, IDH equivalgono pure a due angoli retti: dunque l'angolo EDF è eguale a IAH, o BAC. Parimente, se il terzo lato EF è perpendicolare al terzo BC, si dimostrerà che l'angolo DFE=C, e DEF=B. Dunque i due triangoli ABC, DEF, che hanno i lati rispettivamente perpendicolari, sono equiangoli, e simili.

*Scolio.* Nel caso dei lati parallelli i lati omologhi sono i lati parallelli; ed in quello de' lati perpendicolari lo sono i lati perpen-

dicolari. Così, in quest'ultimo caso, DE è omologo ad AB, DF ad AC, ed EF a BC.

Il caso dei lati perpendicolari potrebbe offrire una situazione relativa di due triangoli differente da quella, che è supposta nella fig. 124; ma l'eguaglianza degli angoli rispettivi si dimostrerebbe sempre o con dei quadrilateri, come AIDH, di cui due angoli son retti, o col paragone di due triangoli, i quali con degli angoli opposti al vertice avrebbero ciascuno un angolo retto: d'altronde si potrebbe sempre supporre che si fosse costruito dentro del triangolo ABC un triangolo DEF, i di cui lati fossero paralleli a quelli del triangolo paragonato ad ABC, ed allora la dimostrazione rientrerebbe nel caso della figura 124.

### PROPOSIZIONE XXII.

#### TEOREMA

**Fig. 125.** *Le rette AF, AG, ec. condotte a piacere dal vertice di un triangolo dividono proporzionalmente la base BC, e la sua parallela DE; talmente che si ha  $DI : BF :: IK : FG :: KL : GH$  ec.*

Poichè, siccome DI è parallela a BF, il triangolo ADI è equiangolo ad ABF, e si ha la proporzione  $DI : BF :: AI : AF$ . Parimente, essendo IK parallela a FG, si ha  $AI : AF :: IK : FG$ . Dunque, a cagione del rapporto comune  $AI : AF$ , si avrà  $DI : BF :: IK : FG$ . Si troverà similmente  $IK : FG :: KL : GH$  ec. Dunque la linea DE

è divisa nei punti I, K, L, come lo è la base BC nei punti F, G, H.

*Corollario.* Dunque, se BC è divisa in parti uguali nei punti F, G, H, la parallela DE sarà divisa parimente in parti uguali nei punti I, K, L.

## PROPOSIZIONE XXIII.

## TEOREMA

*Se dall'angolo retto A d'un triangolo rettangolo si abbassa la perpendicolare AD sull'ipotenusa* Fig. 126.

1.<sup>o</sup> I due triangoli parziali ABD, ADC saranno simili fra di loro, ed al triangolo totale ABC.

2.<sup>o</sup> Ogni lato AB, o AC sarà medio proporzionale fra l'ipotenusa BC, ed il segmento adjacente BD, o DC.

3.<sup>o</sup> La perpendicolare AD sarà media proporzionale fra i due segmenti BD, DC.

Poichè 1.<sup>o</sup> il triangolo BAD, ed il triangolo BAC hanno l'angolo comune B; di più l'angolo retto BDA è uguale all'angolo retto BAC; dunque il terzo angolo BAD dell'uno è uguale al terzo C dell'altro. Dunque questi due triangoli sono equiangoli, e perciò simili. Si dimostrerà parimente che il triangolo DAC è simile al triangolo BAC; dunque i tre triangoli sono simili fra di loro.

2.<sup>o</sup> Poichè il triangolo BAD è simile al triangolo BAC, i loro lati omologhi sono proporzionali. Ora il lato BD nel triangolo piccolo è omologo a BA nel grande, perchè

sono opposti ad angoli uguali  $BAD$ ,  $BCA$ ; l'ipotenusa  $BA$  del piccolo è omologa all'ipotenusa  $BC$  del grande; dunque si verifica la proporzione  $BD : BA :: BA : BC$ . Si avrebbe nella stessa maniera  $DC : AC :: AC : BC$ . Dunque 2.<sup>o</sup> ognuno dei lati  $AB$ ,  $AC$  è medio proporzionale fra l'ipotenusa, e il segmento adjacente ad esso lato.

3.<sup>o</sup> Finalmente la similitudine dei triangoli  $ABD$ ,  $ADC$  dà, paragonando i lati omologhi,  $BD : AD :: AD : DC$ . Dunque 3.<sup>o</sup> la perpendicolare  $AD$  è media proporzionale tra i segmenti  $BD$ ,  $DC$  dell'ipotenusa.

*Scolio.* La proporzione  $BD : AB :: AB : BC$  dà, uguagliando il prodotto degli estremi a quello de' medj,  $\overline{AB}^2 = BD \times BC$ ; si ha medesimamente  $\overline{AC}^2 = DC \times BC$ ; dunque  $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = BD \times BC + DC \times BC$ : il secondo membro è la medesima cosa che  $(BD + DC) \times BC$ , e si riduce a  $BC \times BC$  o  $\overline{BC}^2$ ; dunque  $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$ ; dunque il quadrato fatto sopra l'ipotenusa  $BC$  è uguale alla somma dei quadrati fatti sopra gli altri due lati  $AB$ ,  $AC$ . Ritorniamo così alla proposizione del quadrato dell'ipotenusa per una strada differentissima da quella, che avevamo seguitata; d'onde si vede che, a parlar propriamente, la proposizione del quadrato dell'ipotenusa è una conseguenza della proporzio-



nalità dei lati nei triangoli equiangoli: laonde le proposizioni fondamentali della Geometria si riducono, per così dire, a questa sola, cioè, che i triangoli equiangoli hanno i loro lati omologhi proporzionali.

Accade spesso, come ne abbiám veduto adesso un esempio, che tirando delle conseguenze da una, o più proposizioni, si ricade su delle proposizioni già dimostrate. In generale ciò, che caratterizza particolarmente i teoremi di Geometria, ed è una prova invincibile della loro certezza, si è che combinandoli insieme in una maniera qualunque, purchè si ragioni giustamente, si cade sempre sopra resultati esatti. Non avverrebbe così se qualche proposizione fosse falsa, o non fosse vera che press'a poco; accaderebbe spesso che, per mezzo della combinazione delle proposizioni fra loro, l'errore si accrescerebbe, e diventerebbe sensibile. Si vedono esempj di ciò in tutte le dimostrazioni, dove ci serviamo della *riduzione all'assurdo*. Tali dimostrazioni, in cui si ha la mira di provare che due quantità sono uguali, consistono a far vedere che, se si ammettesse fra esse la minima disuguaglianza, ne risulterebbe per mezzo della serie dei ragionamenti un'assurdità manifesta, e palpabile; d'onde si rimane costretti a conchiudere che quelle due quantità sono uguali.

*Corollario.* Se da un punto A della circonferenza si conducano le due corde AB, AC all'estremità del diametro BC, il trian-

Fig. 127.

\* 18,2. golo ABC sarà rettangolo in A \*. Dunque  
 1.º la perpendicolare AD è media proporzionale fra i due segmenti del diametro BD, DC, o, il che torna lo stesso, il quadrato  $\overline{AD}^2$  è uguale al rettangolo  $BD \times DC$ .

2.º La corda AB è media proporzionale fra il diametro BC, ed il segmento adiacente BD, o, il che torna lo stesso,  $AB^2 = BD \times BC$ . Si ha parimente  $\overline{AC}^2 = CD \times BC$ ; dunque  $\overline{AB}^2 : \overline{AC}^2 :: BD : DC$ ; e se si paragona  $\overline{AB}^2$  a  $\overline{BC}^2$ , si avrà  $\overline{AB}^2 : \overline{BC}^2 :: BD : BC$ ; si avrebbe pure  $\overline{AC}^2 : \overline{BC}^2 :: DC : BC$ . Questi rapporti dei quadrati dei lati si fra loro, che col quadrato dell'ipotenusa, sono già stati dati nei corollarj 3, e 4 della proposizione XI.

## PROPOSIZIONE XXIV.

### TEOREMA

Fig. 128. Due triangoli, che hanno un angolo uguale, stanno fra loro come i rettangoli dei lati, che comprendono l'angolo uguale. Così il triangolo ABC stà al triangolo ADE come il rettangolo  $AB \times AC$  stà al rettangolo  $AD \times AE$ .

Tirate BE; i due triangoli ABE, ADE, il di cui vertice comune è in E, hanno la medesima altezza, e stanno fra di loro come le basi AB, AD \*; dunque  
 $ABE : ADE :: AB : AD$ .

Si ha pure

$$ABC : ABE :: AC : AE.$$

Moltiplicando queste due proporzioni per ordine, ed omettendo il termine comune ABE, si avrà

$$ABC : ADE :: AB \times AC : AD \times AE.$$

*Corollario.* Dunque i due triangoli sarebbero equivalenti se il rettangolo  $AB \times AC$  fosse uguale al rettangolo  $AD \times AE$ , o se si avesse  $AB : AD :: AE : AC$ ; e questo avrebbe luogo se la linea DC fosse parallela a BE.

## PROPOSIZIONE XXV.

### TEOREMA

*Due triangoli simili stanno fra loro come i quadrati dei lati omologhi.*

Sia l'angolo  $A=D$ , e l'angolo  $B=E$ ; Fig. 122. primieramente, a cagione degli angoli uguali A, e D, si avrà per la proposizion precedente

$$ABC : DEF :: AB \times AC : DE \times EF.$$

D'altronde abbiamo, a causa della similitudine dei triangoli,

$$AB : DE :: AC : DF.$$

E, se si moltiplica questa proporzione termine a termine per la proporzione identica

$$AC : DF :: AC : DF,$$

ne risulterà

$$AB \times AC : DE \times DF :: \overline{AC}^2 : \overline{DF}^2.$$

$$\text{Dunque } ABC : DEF :: \overline{AC}^2 : \overline{DF}^2.$$

Dunque due triangoli simili ABC, DEF

stanno fra loro come i quadrati dei lati omologhi AC, DF, o come i quadrati di due altri lati omologhi qualunque siano.

### PROPOSIZIONE XXVI.

#### TEOREMA

— Due poligoni simili sono composti d'un medesimo numero di triangoli simili rispettivamente, e similmente disposti.

Fig. 129. Nel poligono ABCDE conducete da uno stesso angolo A le diagonali AC, AD agli altri angoli. Nell'altro poligono FGHK, conducete similmente dall'angolo F eguale ed omologo ad A, le diagonali FH, FI agli altri angoli.

Poichè i poligoni sono simili, l'angolo ABC \* Def. 2. è uguale al suo omologo FGH \*, e di più i lati AB, BC sono proporzionali ai lati FG, GH; talmentè che si ha  $AB : FG :: BC : GH$ . Da ciò segue che i triangoli ABC, FGH hanno un angolo eguale compreso tra

\* 20. lati proporzionali; dunque essi son simili \*; dunque l'angolo BCA è uguale a GHF. Essendo tolti questi angoli uguali dagli angoli uguali BCD, GHI, i resti ACD, FHI saranno uguali. Ma, poichè i triangoli ABC, FGH sono simili, si ha  $AC : FH :: BC : GH$ . D'altronde, a cagione della si-

\* Def. 2. militudine de' poligoni, \*  $BC : GH :: CD : HI$ ; dunque  $AC : FH :: CD : HI$ . Ma si è già veduto che l'angolo  $ACD = FHI$ ; dunque i triangoli ACD, FHI hanno un angolo uguale compreso fra lati proporzionali; dunque son simili. Si può continuare medesimamente a

dimostrare la similitudine dei triangoli seguenti, qualunque sia il numero dei lati dei poligoni proposti; dunque due poligoni simili sono composti d'un medesimo numero di triangoli simili, e similmente disposti.

*Scolio.* La proposizione inversa è ugualmente vera: *se due poligoni sono composti d'un medesimo numero di triangoli simili, e similmente disposti, i due poligoni saranno simili.*

Poichè la similitudine dei triangoli rispettivi darà l'angolo  $ABC = FGH$ ,  $BCA = GHF$ ,  $ACD = FHI$ ; dunque  $BCD = GHI$ ; così pure  $CDE = HIK$ , ec. Di più si avrà  $AB : FG :: BC : GH :: AC : FH :: CD : HI$ , ec. Dunque i due poligoni hanno gli angoli uguali, ed i lati proporzionali; dunque son simili.

## PROPOSIZIONE XXVII.

### TEOREMA

*I contorni, o perimetri de' poligoni simili stanno come i lati omologhi, e le loro superficie come i quadrati dei lati omologhi stessi.*

Poichè 1.<sup>o</sup> avendosi, per la natura delle figure simili,  $AB : FG :: BC : GH :: CD : HI$  ec., si può conchiudere da questa serie di rapporti uguali che la somma degli antecedenti  $AB + BC + CD$  ec., contorno della prima figura, stà alla somma de' conseguenti  $FG + GH + HI$  ec., contorno della seconda figura, come un' antecedente stà al

Fig. 129.

suo conseguente, ovvero come un solo lato AB stà al suo omologo FG.

2.<sup>o</sup> Poichè i triangoli ABC, FGH sono si-

\* P. 25. mili, si ha \*  $ABC : FGH :: \overline{AC}^2 : \overline{FH}^2$ ; parimente, essendo simili i triangoli ACD, FHI, si ha  $ACD : FHI :: \overline{AC}^2 : \overline{FH}^2$ ; dunque, a motivo del rapporto comune  $\overline{AC}^2 : \overline{FH}^2$ , si ha

$$ABC : FGH :: ACD : FHI.$$

Con un ragionamento simile si troverebbe  $ACD : FHI :: ADE : FIK.$

E così in seguito, se vi fosse un maggior numero di triangoli. Da questa serie di rapporti uguali si conchiuderà che la somma degli antecedenti  $ABC + ACD + ADE$ , o l'area del poligono ABCDE, stà alla somma dei conseguenti  $FGH + FHI + FIK$ , o all'area del poligono FGHIK, come un antecedente ABC stà al suo conseguente FG, o come  $\overline{AB}^2$  sta a  $\overline{FG}^2$ ; dunque le superficie dei poligoni simili stanno fra loro come i quadrati dei lati omologhi.

*Corollario.* Se si costruiscono tre figure simili, i di cui lati omologhi siano uguali ai tre lati d'un triangolo rettangolo, l'area della figura fatta sul maggior lato sarà uguale alla somma delle aree delle altre due. Poichè queste tre figure sono proporzionali ai quadrati dei loro lati omologhi; ora il quadrato dell'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati; dunque ec.

## PROPOSIZIONE XXVIII.

## TEOREMA

*Le parti di due corde AB, CD, che si Fig. 13a.  
tagliano dentro un circolo sono reciprocamente  
proporzionali; cioè si ha*

$$AO : DO :: CO : OB.$$

Tirate AC e BD: nei triangoli ACO, BOD  
gli angoli in O sono uguali, come opposti al  
vertice; l'angolo A è uguale all'angolo D,  
perchè sono iscritti nel medesimo segmento  
del circolo \*; per la medesima ragione l'an- \* 18, 2.  
golo C=B; dunque questi triangoli sono si-  
mili, ed i lati omologhi danno la proporzione.

$$AO : DO :: CO : OB.$$

*Corollario.* Dunque  $AO \times OB = DO \times CO$ ;  
dunque il rettangolo delle due parti d'una  
delle corde è uguale al rettangolo delle due  
parti dell'altra.

## PROPOSIZIONE XXIX.

## TEOREMA

*Se da uno stesso punto O preso fuori del Fig. 131.  
cerchio si conducono le secanti OB, OC, ter-  
minate all'arco concavo BC, le secanti in-  
tere saranno reciprocamente proporzionali alle  
loro parti esterne, cioè si avrà*

$$OB : OC :: OD : OA.$$

Poichè, tirando AC e BD, i triangoli  
OAC, OBD hanno l'angolo O comune; di  
più l'angolo B=C \*; dunque questi trian- \* 18, 2.  
goli sono simili, e i lati omologhi danno la  
proporzione

$$OB : OC :: OD : OA.$$



**Corollario.** Dunque il rettangolo  $OA \times OB$  è uguale al rettangolo  $OC \times OD$ .

**Scolio.** Si può osservare che questa proporzione ha molta analogia colla precedente, e che ne differisce soltanto perchè le due corde  $AB$ ,  $CD$ , in vece di tagliarsi dentro del cerchio, si tagliano al di fuori. La proposizione seguente può ancora esser riguardata come un caso particolare di questa.

### PROPOSIZIONE XXX.

#### TEOREMA

Fig. 132. *Se da uno stesso punto O preso fuori del circolo si conduce la tangente OA, e la secante OC, la tangente sarà media proporzionale fra la secante, e la sua parte esterna; talmente che si avrà  $OC : OA :: OA : OD$ ; o, il che torna lo stesso,  $\overline{OA}^2 = OC \times OD$ .*

Poichè, tirando  $AD$ , ed  $AC$ , i triangoli  $OAD$ ,  $OAC$  hanno l'angolo  $O$  comune; di più l'angolo  $OAD$  formato da una tangente e da una corda \* ha per misura la metà dell'arco  $AD$ , e l'angolo  $C$  ha la medesima misura; dunque l'angolo  $OAD = C$ ; dunque i due triangoli sono simili, e si ha la proporzione  $OC : OA :: OA : OD$ , che dà  $\overline{OA}^2 = OC \times OD$ .

### PROPOSIZIONE XXXI.

#### TEOREMA

Fig. 133. *In un triangolo  $ABC$ , se si divide l'angolo  $A$  in due parti uguali colla retta  $AD$ ,*



*il rettangolo dei lati AB, AC sarà uguale al rettangolo dei segmenti BD, DC, più il quadrato della secante AD.*

Fate passare una circonferenza per i tre punti A, B, C; prolungate AD fino alla stessa circonferenza, e tirate CE.

Il triangolo BAD è simile al triangolo EAC; poichè, per supposizione, l'angolo BAD = EAC; di più l'angolo B = E, avendo ambedue per misura la metà dell'arco AC; dunque questi triangoli sono simili, ed i lati omologhi danno la proporzione BA : AE :: AD : AC. Quindi risulta  $BA \times AC = AE \times AD$ ; ma  $AE = AD + DE$ , e, moltiplicando da ambe le parti per AD, si ha  $AE \times AD = \overline{AD}^2 + AD \times DE$ ; d'altronde  $AD \times DE = BD \times DC$ \*; dunque finalmente

$$BA \times AC = \overline{AD}^2 + BD \times DC.$$

## PROPOSIZIONE XXXII.

## TEOREMA

*In un triangolo ABC il rettangolo dei due lati AB, AC è uguale al rettangolo compreso dal diametro CE del circolo circoscritto, e dalla perpendicolare AD abbassata sul terzo lato BC.* Fig. 134.

Poichè, tirando AE, i triangoli ABD, AEC sono rettangoli, l'uno in D, l'altro in A; di più l'angolo B = E; dunque questi triangoli sono simili, e danno la proporzione AB : CE :: AD : AC; donde risulta  $AB \times AC = CE \times AD$ .

*Corollario.* Se si moltiplicano queste quan-

tità uguali per la medesima quantità  $BC$ , si avrà  $AB \times AC \times BC = CE \times AD \times BC$ . Ora  $AD \times BC$  è il doppio della superficie del

- \* Pr. 4. triangolo \*; dunque il prodotto dei tre lati d'un triangolo è uguale alla sua superficie moltiplicata per il doppio del diametro del circolo circoscritto.

Il prodotto di tre linee si chiama talora un *solido*, per una ragione che si vedrà in seguito. Il suo valore facilmente si concepisce immaginando che le linee siano ridotte in numeri, e moltiplicando i numeri, di cui si tratta.

*Scolio.* Si può dimostrar pure che la superficie d'un triangolo è uguale al suo perimetro moltiplicato per la metà del raggio del circolo iscritto.

- Fig. 87. Poichè i triangoli  $AOB$ ,  $BOC$ ,  $AOC$ , che hanno il loro vertice comune in  $O$ , han per altezza comune il raggio del circolo iscritto; dunque la somma di questi triangoli sarà uguale alla somma delle basi  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$  moltiplicata per la metà del raggio  $OD$ ; dunque il triangolo  $ABC$  è uguale al suo perimetro moltiplicato per la metà del raggio del circolo iscritto.

### PROPOSIZIONE XXXIII.

#### TEOREMA

- Fig. 135. In ogni quadrilatero iscritto nel circolo, come  $ABCD$ , il rettangolo delle due diagonali  $AC$ ,  $BD$  è uguale alla somma dei rettangoli dei lati opposti; talmente che si ha
- $$AC \times BD = AB \times CD + AD \times BC.$$

Prendete l'arco  $CO=AD$ , e tirate  $BO$ , che incontri la diagonale  $AC$  in  $I$ .

L'angolo  $ABD=CBI$ , poichè l'uno ha per misura la metà di  $AD$ , e l'altro la metà di  $CO$  uguale ad  $AD$ . L'angolo  $ADB=BCI$ , perchè sono iscritti nel medesimo circolare segmento  $AOB$ ; dunque il triangolo  $ABD$  è simile al triangolo  $IBC$ , e si ha la proporzione  $AD : CI :: BD : BC$ ; donde resulta  $AD \times BC = CI \times BD$ . Dico adesso che il triangolo  $ABI$  è simile al triangolo  $BDC$ , perchè essendo l'arco  $AD$  uguale a  $CO$ , se si aggiunge da ambe le parti  $OD$ , si avrà l'arco  $AO=DC$ ; dunque l'angolo  $ABI=DBC$ : di più l'angolo  $BAI=BDC$ , essendo iscritti nel segmento medesimo; dunque i triangoli  $ABI$ ,  $DBC$  sono simili, ed i lati omologhi danno la proporzione  $AB : BD :: AI : CD$ ; donde resulta  $AB \times CD = AI \times BD$ .

Aggiungendo i due risultati trovati, e osservando che  $AI \times BD + CI \times BD = (AI + CI) BD = AC \times BD$ , si avrà  $AD \times BC + AB \times CD = AC \times BD$ .

*Scolio*. Si può dimostrare nella stessa maniera un altro teorema sul quadrilatero iscritto. Il triangolo  $ABD$  simile a  $BIC$  dà pure la proporzione  $BD : BC :: AB : BI$ , donde resulta  $BI \times BD = BC \times AB$ . Se si tira  $CO$ , il triangolo  $ICO$  simile ad  $ABI$  sarà simile a  $BDC$ , e darà la proporzione  $BD : CO :: DC : OI$ , donde resulta  $OI \times BD = CO \times DC$ , o, a cagione di  $CO=AD$ ,  $OI \times BD = AD \times DC$ ; aggiungendo i due risultati, e osser-

vando che  $BI \times BD + OI \times BD$  si riduce a  $BO \times BD$ , si avrà

$$BO \times BD = AB \times BC + AD \times DC.$$

Se si fosse preso  $BP = AD$ , e si fosse tirata  $CKP$ , si avrebbe trovato con dei ragionamenti simili

$$CP \times CA = AB \times AD + BC \times CD.$$

Ma essendo l'arco  $BP$  uguale a  $CO$ , se si aggiunge  $BC$  ad ambedue, si avrà l'arco  $CBP = BCO$ ; dunque la corda  $CP$  è uguale alla corda  $BO$ , e per conseguenza i rettangoli  $BO \times BD$ , e  $CP \times CA$  stanno fra loro come  $BD$  stà a  $CA$ ; dunque

$$BD : CA :: AB \times BC + AD \times DC : AD \times AB + BC \times CD.$$

*Dunque le due diagonali d'un quadrilatero iscritto stanno fra loro come la somma dei rettangoli dei lati adjacenti alle loro estremità.*

Questi due teoremi posson servire per trovare le diagonali quando si conoscono i lati.

### PROPOSIZIONE XXXIV.

#### TEOREMA

**Fig. 136.** *Sia P un punto dato dentro il circolo sul raggio AC, e sia preso un punto Q al di fuori sul prolungamento dello stesso raggio, talmente che si abbia  $CP : CA :: CA : CQ$ ; se da un punto qualunque M della circonferenza si conducano ai due punti P, e Q le rette MP, MQ, dico che queste rette staranno per tutto nel medesimo rapporto, e che si avrà sempre  $MP : MQ :: AP : AQ$ .*

Poichè si ha per supposizione  $CP : CA :: CA : CQ$ , mettendo  $CM$  in vece di  $CA$ , si avrà  $CP : CM :: CM : CQ$ ; dunque i triangoli  $CPM$ ,  $CQM$  hanno un angolo uguale  $C$  compreso fra lati proporzionali \*; dunque son \* 20, 3. simili; dunque il terzo lato  $MP$  stà al terzo  $MQ$  come  $CP$  stà a  $CM$ , o  $CA$ . Ma la proporzione  $CP : CA :: CA : CQ$  dà, *dividendo*,  $CP : CA : CA - CP : CQ - CA$ , o  $CP : CA :: AP : AQ$ ; dunque  $MP : MQ :: AP : AQ$ .

PROBLEMI ANNESSI AL LIBRO TERZO.

PROBLEMA I.

*Dividere una linea retta data in quante parti uguali si voglia, o in parti proporzionali a delle linee date.*

1.° Sia proposto di dividere la linea  $AB$  Fig. 137. in cinque parti uguali; per l'estremità  $A$  si condurrà l'indefinita  $AG$ , e, prendendo  $AC$  d'una grandezza qualunque, si porterà  $AC$  cinque volte sopra  $AG$ . Si unirà l'ultimo punto di divisione  $G$ , e l'estremità  $B$  colla linea retta  $GB$ ; poi si condurrà  $CI$  parallela a  $GB$ ; dico che  $AI$  sarà la quinta parte della linea  $AB$ , e che, portando  $AI$  cinque volte sopra  $AB$ , la linea  $AB$  sarà divisa in cinque parti uguali.

Poichè, siccome  $CI$  è parallela a  $GB$ , i lati  $AG$ ,  $AB$  sono tagliati proporzionalmente in  $C$ , ed  $I$ . Ma  $AC$  è la quinta parte di  $AG$ ; dunque  $AI$  è la quinta parte di  $AB$ .

2.° Sia proposto di dividere la linea  $AB$  Fig. 138.

in parti proporzionali alle linee rette date  $P, Q, R$ . Dall'estremità  $A$  si tirerà l'indefinita  $AG$ ; si prenderanno  $AC=P, CD=Q, DE=R$ ; si uniranno l'estremità  $E$ , e  $B$ , e per i punti  $C$ , e  $D$  si condurranno  $CI, DK$  parallele ad  $EB$ ; dico che la linea  $AB$  sarà divisa in parti  $AI, IK, KB$  proporzionali alle linee date  $P, Q, R$ .

Poichè, a motivo delle parallele  $CI, DK, EB$ , le parti  $AI, IK, KB$  son proporzionali

\* Pr. 15, alle parti  $AC, CD, DE$ \*; e, per costruzione, queste ultime sono uguali alle linee date  $P, Q, R$ .

#### PROBLEMA II.

*Trovare una quarta proporzionale a tre rette date  $A, B, C$ .*

Fig. 139. Tirate le due rette indefinite  $DE, DF$  sotto un angolo qualunque. Sopra  $DE$  prendete  $DA=A$ , e  $DB=B$ ; sopra  $DF$  prendete  $DC=C$ ; tirate  $AC$ ; e per il punto  $B$  condurate  $BX$  parallela ad  $AC$ ; dico che  $DX$  sarà la quarta proporzionale cercata. Poichè, siccome  $BX$  è parallela ad  $AC$ , si ha la proporzione  $DA:DB::DC:DX$ ; ora i tre primi termini di questa proporzione sono uguali alle tre linee date; dunque  $DX$  è la quarta proporzionale richiesta.

*Corollario.* Si troverà similmente una terza proporzionale alle due linee date  $A, B$ ; poichè essa sarà la stessa che la quarta proporzionale alle tre linee  $A, B, B$ .

PROBLEMA III.

*Trovare una media proporzionale fra due rette date A e B.* Fig. 140.

Sopra una retta indefinita DF prendete  $DE=A$ , ed  $EF=B$ ; sopra la linea totale DF, come diametro, descrivete la mezza-circonferenza DGF; al punto E alzate sul diametro la perpendicolare EG, che incontri la circonferenza in G; dico che EG sarà la media proporzionale richiesta.

Poichè la perpendicolare GE abbassata da un punto della circonferenza sul diametro è media proporzionale fra i due segmenti del diametro DE, EF\*: or questi segmenti \* Pr. 23. sono uguali alle linee date A, e B.

PROBLEMA IV.

*Dividere la linea data AB in due parti di maniera che la maggiore sia media proporzionale tra la linea intera, e l'altra parte che resta.* Fig. 141.

All'estremità B della linea AB alzate la perpendicolare BC uguale alla metà di AB; dal punto C, come centro, e col raggio CB descrivete una circonferenza; tirate AC, che taglierà la circonferenza in D, e prendete  $AF=AD$ ; dico che la linea AB sarà divisa nel punto F della maniera richiesta, cioè, in guisa tale che starà  $AB:AF::AF:FB$ .

Poichè, essendo AB perpendicolare all'estremità del raggio CB, dessa è una tangente; e se si prolunga AC finchè incontri di

\* Pr. 30. nuovo la circonferenza in E, si avrà \*  $AE : AB :: AB : AD$ ; dunque, *dividendo*,  $AE - AB : AB :: AB - AD : AD$ . Ma poichè il raggio BC è la metà di AB, il diametro DE è uguale ad AB, e per conseguenza  $AE - AD = AD = AF$ ; si ha pure a motivo di  $AF = AD$ ,  $AB - AD = FB$ ; dunque  $AF : AB :: FB : AD$ , o  $AF$ ; dunque, *invertendo*,  $AB : AF :: AF : FB$ .

**AB**

*Scolio.* Questo modo di divisione della retta AB si chiama divisione in *estrema, e media ragione*. Se ne vedranno degli usi. Si può frattanto osservare che la secante AE è divisa in *estrema, e media ragione* nel punto A; poichè  $AE : DE :: DE : AD$ .

#### PROBLEMA V.

Fig. 142. Per un punto A dato dentro dell'angolo dato BCD tirare la linea retta BD in maniera che le parti AB, AD comprese tra il punto A, ed i due lati dell'angolo, siano uguali.

Per il punto A conducete AE parallela a CD; prendete  $BE = CE$ ; e per i punti B, ed A tirate BAD, che sarà la linea cercata.

Poichè, essendo AE parallela a CD, si ha  $BE : EC :: BA : AD$ . Ora  $BE = EC$ ; dunque  $BA = AD$ .

#### PROBLEMA VI.

Fare un quadrato equivalente ad un parallelogrammo, o a un triangolo dato.

Fig. 143. 1.° Sia ABCD il parallelogrammo dato,



AB la sua base, DE la sua altezza. Fra AB, e DE cercate una media proporzionale XY\*; \* Pr. dico che il quadrato fatto sopra XY sarà equivalente al parallelogrammo ABCD. Poichè, per costruzione,  $AB:XY::XY:DE$ ; dunque  $\overline{XY}^2 = AB \times DE$ . Ora  $AB \times DE$  è la misura del parallelogrammo, e  $\overline{XY}^2$  quella del quadrato; dunque sono equivalenti.

2.º Sia ABC il triangolo dato, BC la sua base, AD la sua altezza. Prendete una media proporzionale fra BC, e la metà di AD, e sia XY questa media: dico che il quadrato fatto sopra XY sarà equivalente al triangolo ABC. Fig. 144.

Poichè, siccome si ha  $BC:XY::XY:\frac{1}{2}AD$ , ne risulta  $\overline{XY}^2 = BC \times \frac{1}{2}AD$ ; dunque il quadrato fatto sopra XY è equivalente al triangolo ABC.

## PROBLEMA VII.

*Fare sulla linea data AD un rettangolo ADEX equivalente al rettangolo dato ABFC.* Fig. 145.

Cercate una quarta proporzionale alle tre linee AD, AB, AC, e sia AX questa quarta proporzionale; dico che il rettangolo fatto sopra AD, e AX sarà equivalente al rettangolo ABFC.

Poichè, siccome si ha  $AD:AB::AC:AX$ , ne risulta  $AD \times AX = AB \times AC$ ; dunque il rettangolo ADEX è equivalente al rettangolo ABFC.

## PROBLEMA VIII.

Fig. 148. *Trovare in linee il rapporto del rettangolo delle due linee date A e B al rettangolo delle due linee date C e D.*

Sia X una quarta proporzionale alle tre linee B, C, D; dico che il rapporto delle due linee A, e X sarà uguale a quello dei due rettangoli  $A \times B$ ,  $C \times D$ .

Poichè, siccome si ha  $B : C :: D : X$ , ne risulta  $C \times D = B \times X$ ; dunque  $A \times B : C \times D :: A \times B : B \times X :: A : X$ .

*Corollario.* Dunque, per avere il rapporto dei quadrati fatti sopra le linee date A, e C, cercate una terza proporzionale X alle linee A e C, talmente che si abbia  $A : C :: C : X$ ; e voi avrete  $A^2 : C^2 :: A : X$ .

## PROBLEMA IX.

Fig. 149. *Trovare in linee il rapporto del prodotto delle tre linee date A, B, C al prodotto delle tre linee date P, Q, R.*

Alle tre linee date P, A, B, cercate una quarta proporzionale X; alle tre linee date C, Q, R cercate parimente una quarta proporzionale Y. Le due linee X, Y staranno fra loro come i prodotti  $A \times B \times C$ ,  $P \times Q \times R$ .

Poichè, siccome  $P : A :: B : X$ , si ha  $A \times P = B \times X$ ; e moltiplicando da ambe le parti per C,  $A \times B \times C = C \times P \times X$ . Similmente, siccome  $C : Q :: R : Y$ , ne risulta  $Q \times R = C \times Y$ ; e moltiplicando da ambe le parti per P, si ha  $P \times Q \times R = P \times C \times Y$ . Dunque il pro-

dotto  $A \times B \times C$  stà al prodotto  $P \times Q \times R$  come  $C \times P \times X$  stà a  $P \times C \times Y$ , o come  $X$  stà a  $Y$ .

## PROBLEMA X.

*Cangiare un poligono dato in un triangolo equivalente.*

Sia  $ABCDE$  il poligono dato. Tirate pri- Fig. 146.  
mieramente la diagonale  $CE$ , che taglia dal poligono il triangolo  $CDE$ ; per il punto  $D$  conducete  $DF$  parallela a  $CE$  finchè incontri  $AE$  prolungata; tirate  $CF$ ; ed il poligono  $ABCDE$  sarà equivalente al poligono  $ABCF$ , che ha un lato di meno.

Poichè i triangoli  $CDE$ ,  $CFE$  hanno la base comune  $CE$ ; essi hanno pure la medesima altezza perchè i loro vertici  $D$ ,  $F$  sono sopra una linea  $DF$  parallela alla base; dunque questi triangoli sono equivalenti. Aggiungiamo ad ambedue la figura  $ABCE$ , si avrà da una parte il poligono  $ABCDE$ , e dall'altra il poligono  $ABCF$ , che saranno perciò equivalenti.

Si può far l'istesso dalla parte dell'angolo  $B$  sostituendo al triangolo  $ABC$  il triangolo equivalente  $AGC$ ; e così il pentagono  $ABCDE$  sarà cangiato in un triangolo equivalente  $GCF$ .

Lo stesso metodo si applicherà ad ogni altra rettilinea figura; poichè, diminuendo ad uno per volta il numero dei lati, si terminerà col trovare il triangolo equivalente.

*Corollario.* E perchè ogni triangolo può esser cangiato in un quadrato equivalente,

1562  
1561

ne segue che si troverà sempre un quadrato equivalente ad una figura rettilinea data. Ciò si chiama *quadrare* la figura rettilinea, o trovarne la *quadratura*.

Il problema della *quadratura del circolo* consiste a trovare un quadrato equivalente ad un circolo, di cui sia dato il diametro.

PROBLEMA XI.

*Fare un quadrato, che sia uguale alla somma, o alla differenza di due quadrati dati.*

Fig. 147. Siano A, e B i lati dei quadrati dati.

1.<sup>o</sup> Se bisogna trovare un quadrato uguale alla somma di quei quadrati, tirate le due linee rette indefinite ED, EF poste ad angolo retto; prendete  $ED=A$ , ed  $EG=B$ ; conducete DG; e DG sarà il lato del quadrato cercato.

Poichè, essendo il triangolo DEG rettangolo, il quadrato fatto sopra DG è uguale alla somma dei quadrati fatti sopra ED, ed EG.

2.<sup>o</sup> Se bisogna trovare un quadrato uguale alla differenza di quei quadrati, formate parimente l'angolo retto FEH; prendete GE uguale al minore dei lati A, e B; dal punto G, come centro, e con un raggio GH uguale all'altro lato, descrivete un arco, che tagli EH in H: dico che il quadrato fatto sopra EH sarà uguale alla differenza dei quadrati fatti sopra le rette A, e B.

Poichè il triangolo GEH è rettangolo,

l'ipotenusa  $GH=A$ , ed il lato  $GE=B$ ; dunque il quadrato fatto sopra  $EH$  ee.

*Scolio.* Si può trovare ancora un quadrato uguale alla somma di quanti quadrati si vorrà; poichè, siccome se ne riducono due ad un solo, se ne ridurranno tre a due, e questi due ad uno, e così degli altri. Sarebbe lo stesso se alcuno dei quadrati dovesse esser sottratto dalla somma degli altri.

PROBLEMA XII.

*Costruire un quadrato, che stia al quadrato dato ABCD come la linea M stà alla linea N.* Fig. 156.

Sopra la linea retta indefinita  $EG$  prendete  $EF=M$ , e  $FG=N$ ; sopra  $EG$ , come diametro, descrivete una mezza circonferenza, ed al punto  $F$  alzate sul diametro la perpendicolare  $FH$ . Dal punto  $H$  conducete le corde  $HG$ ,  $HE$ , che prolungherete indefinitamente; sulla prima prendete  $HK$  uguale al lato  $AB$  del quadrato dato, e per il punto  $K$  conducete  $KI$  parallela ad  $EG$ ; dico che  $HI$  sarà il lato del quadrato richiesto.

Poichè, a motivo delle parallele  $KI$ ,  $GE$ , si ha  $HI :: HK :: HE : HG$ ; o  $\overline{HI}^2 : \overline{HK}^2 :: \overline{HE}^2 : \overline{HG}^2$ ; ma nel triangolo rettangolo  $EHG$  \* \* 23. il quadrato di  $HE$  stà al quadrato di  $HG$  come il segmento  $EF$  stà al segmento  $FG$ , o come  $M$  stà ad  $N$ ; dunque  $\overline{HI}^2 : \overline{HK}^2 :: M : N$ . Ma  $HK=AB$ ; dunque il quadrato fatto so-

pra HI stà al quadrato fatto sopra AB come M stà a N.

## PROBLEMA XIII.

Fig. 129. *Sul lato FG omologo ad AB descrivere un poligono simile al poligono ABCDE.*

Nel poligono dato tirate le diagonali AC, AD. Al punto F fate l'angolo  $\angle GFH = \angle BAC$ , ed al punto G l'angolo  $\angle FGH = \angle ABC$ ; le linee rette FH, GH si taglieranno in H, e FGH sarà un triangolo simile ad ABC: parimente, sopra FH, omologo ad AC, descrivete il triangolo FHI simile ad ADC, e sopra FI, omologo ad AD, descrivete il triangolo FIK simile ad ADE. Il poligono FGHIK sarà il poligono richiesto, cioè simile ad ABCDE.

Poichè questi due poligoni son composti d'un medesimo numero di triangoli simili, e  
 \* 26, similmente posti \*.

## PROBLEMA XIV.

*Essendo date due figure simili, costruire una figura simile uguale alla loro somma, o alla lor differenza.*

Siano A, e B due lati omologhi delle figure date; cercate un quadrato uguale alla somma, o alla differenza dei quadrati fatti sopra A, e B; sia X il lato di questo quadrato; X sarà nella figura cercata il lato omologo ad A, e B rispettivamente nelle date figure. Si costruirà in seguito questa figura per il precedente teorema,

Poichè le figure simili stanno come i quadrati dei lati omologhi; ora il quadrato del lato  $X$  è uguale alla somma, o alla differenza dei quadrati fatti sui lati omologhi  $A$ , e  $B$ ; dunque la figura fatta sul lato  $X$  è uguale alla somma, o alla differenza delle figure simili fatte sui lati  $A$ , e  $B$ .

## PROBLEMA XV.

*Costruire una figura simile ad una figura data, e che stia a questa figura nel rapporto dato di  $M$  a  $N$ .*

Sia  $A$  un lato della figura data,  $X$  il lato omologo nella figura cercata; bisognerà che il quadrato di  $X$  stia al quadrato di  $A$  come  $M$  stà a  $N$ . Si troverà dunque  $X$  per il problema XII. conoscendo  $X$ ; e si compirà il resto per il problema XIII.

## PROBLEMA XVI.

*Costruire una figura simile alla figura  $P$ , Fig. 151. ed equivalente alla figura  $Q$ .*

Cercate il lato  $M$  del quadrato equivalente alla figura  $P$ , ed il lato  $N$  del quadrato equivalente alla figura  $Q$ . Sia quindi  $X$  una quarta proporzionale alle tre linee rette date  $M$ ,  $N$ ,  $AB$ ; sul lato  $X$ , omologo ad  $AB$ , descrivete una figura simile alla figura  $P$ ; dico che sarà ancora equivalente alla figura  $Q$ .

Poichè, chiamando  $Y$  la figura fatta sul lato  $X$ , si avrà,  $P : Y :: \overline{AB}^2 : X^2$ ; ma, per

costruzione,  $AB : X :: M : N$ , o  $\overline{AB}^2 : X^2 :: M^2 : N^2$ ; dunque  $P : Y :: M^2 : N^2$ . Oltracciò si ha pure, per costruzione,  $M = P$ , e  $N = Q$ ; dunque  $P : Y :: P : Q$ ; dunque  $Y = Q$ ; dunque la figura  $Y$  è simile alla figura  $P$ , ed equivalente alla figura  $Q$ .

## PROBLEMA XVII.

Fig. 152. *Costruire un rettangolo equivalente a un quadrato dato  $C$ , e i di cui lati adjacenti facciano una somma data  $AB$ .*

Sopra  $AB$ , come diametro, descrivete una mezza-circonferenza; conducete parallelamente al diametro la retta  $DE$  ad una distanza  $AD$  uguale al lato del quadrato dato  $C$ .

Dal punto  $E$ , ove la parallela taglia la circonferenza, abbassate sul diametro la perpendicolare  $EF$ ; dico che  $AF$ , e  $FB$  saranno i lati del cercato rettangolo.

Poichè la loro somma è uguale ad  $AB$ , ed il loro rettangolo  $AF \times FB$  è uguale al quadrato di  $EF$  \*, o al quadrato di  $AD$ ; dunque questo rettangolo è equivalente al quadrato dato  $C$ .

*Scolio.* Bisogna, affinchè il problema sia possibile, che la distanza  $AD$  non superi il raggio, o che il lato del quadrato  $C$  non superi la metà della linea  $AB$ .

\* 23.



PROBLEMA XVIII.

*Costruire un rettangolo equivalente a un quadrato C; e i cui lati adjacenti abbiano fra di loro la differenza data AB.* Fig. 153.

Sulla linea retta data AB, come diametro, descrivete una circonferenza; all'estremità del diametro conducete la tangente AD uguale al lato del quadrato C. Per il punto D, ed il centro O tirate la secante DE; dico che DE, e DF saranno i lati adjacenti del richiesto rettangolo.

Poichè 1.º la differenza di questi lati è uguale al diametro EF, o AB; 2.º il rettangolo  $DE \times DF$  è uguale ad  $\overline{AD}^2$ ; dunque il rettangolo sarà equivalente al quadrato dato C. \* 30.

PROBLEMA XIX.

*Trovare la misura comune, se ve n'è alcuna, tra la diagonale, ed il lato del quadrato*

Sia ABCG un quadrato qualunque, AC la sua diagonale. Fig. 154.

Bisogna primieramente portare CB sopra CA quante volte può esservi contenuto, \* o Pr. 17., perciò sia descritto col centro C, e col raggio CB il mezzo-circolo DBE; si vede che CB è contenuto una volta in AC col resto AD; il risultato della prima operazione è dunque il quoziente 1 col resto AD, che bisogna paragonar con CB, o col suo uguale AB. lib. 2.

Si può prendere  $AF=AD$ , e portare di fatto  $AF$  sopra  $AB$ ; si troverebbe che vi è contenuto due volte con un resto; ma siccome questo resto, ed i seguenti vanno diminuendo, e ben presto ci sfuggirebbero per la lor piccolezza, questo non sarebbe che un mezzo meccanico imperfetto, donde non si potrebbe conchiuder niente per decidere se le linee rette  $AC$ ,  $CB$  hanno fra loro, o non hanno una misura comune. Ora v'è un mezzo semplicissimo di scansare le linee decrescenti, e di operare soltanto sopra linee, che siano sempre della medesima grandezza.

In fatti, essendo l'angolo  $ABC$  retto,  $AB$  è una tangente, ed  $AE$  una secante condotta dal medesimo punto; talmente che si ha \*  $AD : AB :: AB : AE$ . Onde nella seconda operazione, che consiste a paragonare  $AD$  con  $AB$ , si può, in vece del rapporto di  $AD$  ad  $AB$ , sostituir quello di  $AB$  ad  $AE$ : ora  $AB$ , o la sua uguale  $CD$  è contenuta due volte in  $AE$  col resto  $AD$ ; dunque il risultato della seconda operazione è il quoziente 2 col resto  $AD$ , che bisogna paragonare ad  $AB$ .

La terza operazione, che consiste a paragonare  $AD$  con  $AB$ , si ridurrà parimente a paragonare  $AB$ , o la sua eguale  $CD$  con  $AE$ ; e si avrà del pari 2 per quoziente, ed  $AD$  per resto.

Di quì risulta che l'operazione non avrà fine, e che perciò non v'è alcuna misura comune fra la diagonale, ed il lato del qua-

drato; verità, ch'era già cognita per mezzo dell' Aritmetica (giacchè queste due linee stanno fra loro come  $\sqrt{2} : 1$ ) \*, ma che \* 11. acquista un maggior grado di chiarezza colla risoluzione geometrica.

*Scolio.* Non è dunque possibile di trovare il rapporto esatto in numeri della diagonale al lato del quadrato; ma vi si può accostare quanto si vorrà col mezzo della frazione *continua*, che è uguale a questo rapporto. La prima operazione ha dato per quoziente 1; la seconda, e tutte le altre all'infinito danno 2; onde la frazione, di cui si tratta, è  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ , ec. all'infinito.

Per esempio, se si calcola questa frazione fino al quarto termine inclusivamente, si trova che il suo valore è  $1 \frac{1}{2} \frac{2}{9}$ , o  $\frac{4}{2} \frac{1}{9}$ ; talmente che il rapporto prossimo della diagonale al lato del quadrato è come 41 : 29. Si troverebbe un rapporto più prossimo calcolando un maggior numero di termini.

---

## LIBRO QUARTO

I POLIGONI REGOLARI E LA MISURA  
DEL CIRCOLO

## DEFINIZIONE

Un poligono, che è nel tempo stesso equiangolo, ed equilatero, si chiama *poligono regolare*.

Vi son dei poligoni regolari di qualunque numero di lati. Il triangolo equilatero è il poligono regolare di tre lati, ed il quadrato quello di quattro.

## PROPOSIZIONE I.

## TEOREMA

*Due poligoni regolari d'un medesimo numero di lati sono due figure simili.*

Fig. 155.

Sian per esempio i due esagoni regolari  $ABCDEF$ ,  $abcdef$ ; la somma degli angoli è la stessa nell'una, e nell'altra figura; essa è uguale ad otto angoli retti \*. L'angolo  $A$  è la sesta parte di questa somma, ugualmente che l'angolo  $a$ ; dunque i due angoli  $A$ , ed  $a$  sono uguali; ed è lo stesso per conseguenza degli angoli  $B$ , e  $b$ ,  $C$ , e  $c$ , ec.

\* 21, I.

Di più, poichè per la natura di questi poligoni i lati  $AB, BC, CD$ , ec. sono uguali, come pure  $ab, bc, cd$ , ec., è chiaro che si hanno le proporzioni  $AB : ab, :: BC : bc :: CD : cd$ , ec.; dunque le due figure, di cui si tratta, hanno gli angoli uguali, ed i lati omologhi proporzionali; dunque son simili \*. \* Def. 2. L. III.

*Corollario.* Dunque i perimetri di due poligoni regolari d'un medesimo numero di lati stanno fra loro come i lati omologhi, e le loro superficie come i quadrati di questi lati \*.

*Scolio.* L'angolo d'un poligono regolare si determina per mezzo del numero dei suoi lati, come quello d'un poligono equiangolo. Vedete la Prop. XXI. del Lib. I.

## PROPOSIZIONE II.

### TEOREMA

Ogni poligono regolare può essere iscritto, e circoscritto al circolo.

Sia  $ABCDE$  ec. il poligono, di cui si tratta; immaginate che si faccia passare (come si può sempre) \* una circonferenza per i tre punti  $A, B, C$ ; sia  $O$  il di lei centro, ed  $OP$  la perpendicolare abbassata sul mezzo del lato  $BC$ ; tirate  $AO$ , e  $OD$ . *Fig. 156.* \* 7,2.

Il quadrilatero  $OPCD$ , ed il quadrilatero  $OPBA$  possono essere sovrapposti, e combaciano: infatti il lato  $OP$  è comune, l'angolo  $OPC=OPB$ , poichè sono retti; dunque il lato  $PC$  si applicherà sul suo uguale  $PB$ , ed il punto  $C$  cadrà in  $B$ . Di più, per la

*A*

natura del poligono, l'angolo  $PCD = PBA$ ; dunque  $CD$  prenderà la direzione  $BA$ ; e poichè  $CD = AB$ , il punto  $D$  cadrà in  $A$ , e i due quadrilateri coincideranno intieramente l'uno coll'altro. La distanza  $OD$  è dunque uguale ad  $AO$ , e per conseguenza la circonferenza, che passa per i tre punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , passerà anche per il punto  $D$ ; ma, con un ragionamento simile, si proverà che la circonferenza, che passa per i tre vertici  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , passerà ancora per il vertice dell'angolo susseguente  $E$ ; e così di seguito: dunque la medesima circonferenza, che passa per i punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , passa per tutti i vertici degli angoli del poligono, ed il poligono resterà iscritto in questa circonferenza.

In seconda luogo, per rapporto a questa circonferenza, tutti i lati  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$  ec. son corde uguali; esse son dunque ugualmente distanti dal centro  $^*$ ; dunque, se dal punto  $O$ , come centro, e col raggio  $OP$  si descriva una circonferenza, questa circonferenza toccherà il lato  $BC$ , e tutti gli altri lati del poligono nel loro punto di mezzo, e la circonferenza sarà iscritta nel poligono, e il poligono circoscritto alla circonferenza medesima.

*Scolio I.* Il punto  $O$ , centro comune del circolo iscritto, e del circolo circoscritto, può essere riguardato pure come il centro del poligono; e per questa ragione si chiama *angolo al centro* l'angolo  $AOB$  formato dai due raggi condotti alle estremità d'un me-

desimo lato AB. Poichè tutte le corde AB, BC, ec. sono uguali, è chiaro che tutti gli angoli al centro son parimente uguali, e che perciò il valor di ciascuno si trova dividendo quattro angoli retti per il numero dei lati del poligono.

*Scolio II.* Per iscrivere un poligono regolare d'un certo numero di lati in una circonferenza data si tratta soltanto di dividere la circonferenza in tante parti uguali, quanti lati dee avere il poligono; poichè, essendo uguali gli archi, le corde AB, BC, CD, ec. Fig. 158. saranno uguali; i triangoli ABO, BOC, COD, ec. saranno pure uguali, perchè sono equilateri fra di loro; dunque tutti gli angoli ABC, BCD, CDE, ec. saranno uguali; dunque la figura ABCDE ec. è un poligono regolare.

### PROPOSIZIONE III.

#### PROBLEMA

*Iscrivere un quadrato in una circonferenza data.*

Tirate due diametri AC, BD, che si taglino ad angoli retti; unite le estremità A, B, C, D; e la figura ABCD sarà il quadrato iscritto: poichè, essendo uguali gli angoli AOB, BOC, ec., le corde AB, BC, ec. sono uguali. Fig. 157.

*Scolio.* Essendo il triangolo BOC rettangolo, ed isoscele, si ha  $\ast BC : BO :: \sqrt{2} : 1$ ;  $\ast 11,3$ , dunque il lato del quadrato iscritto stà al

raggio come la radice quadrata di 2 stà all' unità.

### PROPOSIZIONE IV.

#### PROBLEMA

*Iscrivere un esagono regolare, ed un triangolo equilatero in una data circonferenza.*

Fig. 158. Supponiamo risoluto il problema, e sia AB un lato dell' esagono iscritto; se si conducono i raggi AO, OB, dico che il triangolo AOB sarà equilatero; perchè l'angolo AOB è la sesta parte di quattro angoli retti; e così, prendendo l'angolo retto per unità, si avrà  $AOB = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ ; i due altri angoli ABO, BAO del medesimo triangolo vagliono insieme  $2 - \frac{2}{3}$ , ovvero  $\frac{4}{3}$ ; e siccome sono uguali, ciascuno di essi  $= \frac{2}{3}$ ; dunque il triangolo ABO è equilatero; dunque il lato dell' esagono iscritto è uguale al raggio.

Quindi risulta che s'iscriverà un esagono regolare in una circonferenza data portando il raggio sei volte sulla circonferenza, talchè si ritornerà sul punto stesso, donde si sarà cominciato.

Essendo iscritto l'esagono ABCDEF, se si uniscono i vertici degli angoli alternativamente con linee rette, si formerà il triangolo equilatero ACE.

\* 143. *Scolio.* La figura ABCO è un parallelogrammo, ed anche un rombo, poichè  $AB = BC = CO = AO$ ; dunque \* la somma dei quadrati delle diagonali  $\overline{AC}^2 + \overline{BO}^2$  è uguale alla



somma dei quadrati de' lati, la quale è  $4\overline{AB}^2$ , o  $4\overline{BO}^2$ ; togliendo da ambe le parti  $\overline{BO}^2$ , resterà  $\overline{AC}^2 = 3\overline{BO}^2$ ; dunque  $\overline{AC}^2 : \overline{BO}^2 :: 3 : 1$ , ovvero  $\overline{AC} : \overline{BO} :: \sqrt{3} : 1$ ; dunque il lato del triangolo equilatero iscritto stà al raggio come la radice quadra di 3 stà all' unità.

### PROPOSIZIONE V.

#### PROBLEMA

*Iscrivere in un circolo dato un decagono regolare, quindi un pentagono, ed un pentadecagono.*

Dividete il raggio AO in estrema, e media ragione nel punto M<sup>\*</sup>; prendete la corda AB uguale al segmento maggiore OM; ed AB sarà il lato del decagono regolare, che bisognerà trasportar dieci volte sulla circonferenza.

Poichè, tirando MB, si ha, per costruzione,  $AO : OM :: OM : AM$ , o sivero, a motivo di  $AB = OM$ ,  $AO : AB :: AB : AM$ ; dunque i triangoli ABO, AMB hanno un angolo comune A compreso fra lati proporzionali; dunque son simili \*. Il triangolo OAB \* 20, 3. è isoscele; dunque il triangolo AMB lo è pure; e si ha  $AB = BM$ ; d'altronde  $AB = OM$ ; dunque anche  $MB = OM$ ; dunque il triangolo BMO è isoscele.

L'angolo AMB esterno, per rapporto al triangolo isoscele BMO, è doppio dell'interno O<sup>\*</sup>; ora l'angolo  $AMB = MAB$ ; dunque \* 20, 1. il triangolo OAB è tale che ciascuno degli

Fig. 158.  
\* Pr. 4.  
lib. 3.

angoli alla base OAB, ossia OBA è doppio dell'angolo al vertice O; dunque i tre angoli insieme del triangolo equivalgono a cinque volte l'angolo O; e quindi l'angolo O è la quinta parte di due angoli retti, o la decima di quattro; dunque l'arco AB è la decima parte della circonferenza, e la corda AB è il lato del decagono regolare.

*Corollario I.* Se si uniscano di due in due i vertici degli angoli del decagono regolare, si formerà il pentagono regolare ACEGI.

*Corollario II.* Essendo sempre AB il lato del decagono, sia AL il lato dell'esagono; allora l'arco BL sarà per rapporto alla circonferenza  $\frac{1}{6} - \frac{1}{10}$ , ovvero  $\frac{1}{15}$ ; dunque la corda BL sarà il lato del pentadecagono, o poligono regolare di 15 lati. Si vede nel tempo stesso che l'arco CL è la terza parte di CB.

*Scolio.* Essendo iscritto un poligono regolare, se si dividano gli archi sottesi dai suoi lati in due parti uguali, e si tirino le corde dei mezzi-archi, quelle formeranno un nuovo poligono regolare d'un doppio numero di lati. Così si vede che il quadrato può servire ad iscrivere successivamente dei poligoni regolari di 8, 16, 32, ec. lati. Del pari l'esagono servirà ad iscrivere dei poligoni regolari di 12, 24, 48, ec. lati; il decagono dei poligoni di 20, 40, 80, ec. lati; il pentadecagono dei poligoni di 30, 60, 120, ec. lati (1).

---

(1) Fino al presente si è creduto che questi poligoni fossero i soli, che potessero essere iscritti

PROPOSIZIONE VI.

TEOREMA

*Essendo dato il poligono regolare iscritto Fig. 160 ABCD ec., circoscrivere alla stessa circonferenza un poligono simile.*

Al mezzo T dell'arco AB conducete la tangente GH, che sarà paralella ad AB \*; \* 10, 2.<sup>a</sup> fate la stessa cosa in mezzo agli altri archi BC, CD, ec; queste tangenti formeranno colle loro intersezioni il poligono regolare circoscritto GHK, ec. simile al poligono iscritto.

E facile di vedere primieramente che i tre punti O, B, H sono in linea retta, perchè i triangoli rettangoli OTH, OHN hanno l'ipotenusa comune OH, ed il lato  $OT=ON$ ; dunque sono uguali \*; dunque l'angolo  $\angle TOH=$  \* 18, 1.  $\angle HON$ ; e per conseguenza la linea OH passa per il punto B mezzo dell'arco TN. Per la medesima ragione il punto I è sul prolungamento di OC, il punto K sul prolungamento di OD, ec. Ma, poichè GH è paralella ad

per mezzo della Geometria elementare, o pure (ciò che è lo stesso) per mezzo della risoluzione dell'Equazioni del primo, e secondo grado. Ma un Geometra di Brunswick, nominato Carlo Fed. Gauss, ha provato in un'Opera intitolata *Disquisitiones arithmeticae*, Lipsiae, 1801. che si può iscrivere con dei simili mezzi il poligono regolare di diciassette lati, ed in generale quello di  $2+1$  lati, purchè  $2+1$  sia un numero primo.

\* 28, 1.  $AB$ , e  $HI$  a  $BC$ , l'angolo  $GHI = ABC$  \*; parimente  $HIK = BCD$ , ec.; dunque gli angoli del poligono circoscritto sono uguali agli angoli del poligono iscritto. Di più, a cagione delle medesime parallele, si ha  $GH : AB :: OH : OB$ , e  $HI : BC :: OH : OB$ ; dunque  $GH : AB :: HI : BC$ . Ma  $AB = BC$ ; dunque  $GH = HI$ . Per la medesima ragione  $HI = IK$ , ec.; dunque i lati del poligono circoscritto sono uguali fra loro; dunque questo poligono è regolare, e simile al poligono iscritto.

*Corollario I.* Reciprocamente, se fosse dato il poligono circoscritto  $GHIK$ , ec., e che bisognasse costruir col suo mezzo il poligono iscritto  $ABC$ , ec., si vede chiaro che basterebbe condurre ai vertici  $G$ ,  $H$ ,  $I$ , ec. del poligono dato le linee  $OG$ ,  $OH$ , ec., che incontrerebbero la circonferenza nei punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , ec.; si unirebbero in seguito questi punti colle corde  $AB$ ,  $BC$ , ec., che formerebbero il poligono iscritto. Si potrebbe pure, nel medesimo caso, unire semplicemente i punti di contatto  $T$ ,  $N$ ,  $P$ , ec. colle corde  $TN$ ,  $NP$ , ec.; il che formerebbe ugualmente un poligono iscritto simile al circoscritto.

*Corollario II* Dunque si può circoscrivere ad un circolo dato tutti i poligoni regolari, che vi si sanno iscrivere, e viceversa.

## PROPOSIZIONE VII.

## TEOREMA

*La superficie d' un poligono regolare è uguale al suo perimetro moltiplicato per la metà del raggio del circò o iscritto.*

Sia , per esempio , il poligono regolare Fig. 16a. GHIK. ec. : il triangolo GOH ha per misura  $GH \times \frac{1}{2}OT$  ; il triangolo OHI ha per misura  $HI \times \frac{1}{2}ON$  : ma  $ON = OT$  ; dunque i due triangoli riuniti hanno per misura  $(GH + HI) \times \frac{1}{2}OT$ . Continuando del pari per gli altri triangoli , si vedrà che la somma di tutti i triangoli , o il poligono intero , ha per misura la somma delle basi GH, HI, IK, ec. , o il perimetro del poligono moltiplicato per  $\frac{1}{2}OT$  , metà del raggio del circolo iscritto.

*Scolio.* Il raggio del circolo iscritto OT non è altro che la perpendicolare abbassata dal centro sopra uno dei lati ; si chiama allora l'apotèma del poligono.

## PROPOSIZIONE VIII.

## TEOREMA

*I perimetri de' poligoni regolari d' un medesimo numero di lati stanno come i raggi dei circoli circoscritti , ed anche come i raggi dei circoli iscritti ; le loro superficie poi stanno come i quadrati di questi medesimi raggi.*

Sia AB un lato d' uno de' poligoni , di cui Fig. 16a. si tratta , O il suo centro , e per conseguenza OA il raggio del circolo circoscritto , ed OD perpendicolare sopra AB il raggio del cir-

U

colo iscritto; sia parimente  $ab$  il lato d' un altro poligono simile, ovvero o il suo centro,  $oa$ , e  $od$  i raggi dei circoli circoscritto, ed iscritto. I perimetri dei due poligoni stanno fra loro come i lati  $AB$ , e  $ab$ . Ma gli angoli  $A$ , ed  $a$  sono uguali, essendo ciascuno la metà dell'angolo del poligono; è lo stesso degli angoli  $B$ , e  $b$ : dunque i triangoli  $ABO$ ,  $abo$  sono simili, come pure i triangoli rettangoli  $ADO$ ,  $ado$ ; dunque  $AB : ab :: AO : ao :: DO : do$ ; dunque i perimetri dei poligoni stanno fra loro come i raggi  $AO$ ,  $ao$  de' circoli circoscritti, e parimente come i raggi,  $DO$ ,  $do$  de' circoli iscritti.

Le superficie di questi medesimi poligoni stanno fra loro come i quadrati dei lati omologhi  $AB$ ,  $ab$ ; e per conseguenza stanno ancora come i quadrati dei raggi dei circoli circoscritti  $AO$ ,  $ao$ , o come i quadrati dei raggi dei circoli iscritti  $OD$ ,  $od$ .

### PROPOSIZIONE IX.

#### LEMMA

Fig. 162. Ogni linea curva, o poligona, che circonda da un' estremità all' altra la linea convessa  $AMB$ , è maggiore della linea circondata  $AMB$ .

Abbiamo già detto che per linea convessa intendiamo una linea curva, o poligona, o in parte curva, ed in parte poligona, tale che una linea retta non possa tagliarla in più di due punti. Se la linea  $AMB$  avesse delle parti rientranti, o delle sinuosità, ces-

sarebbe d'esser convessa, perchè è facil vedere che una linea retta potrebbe tagliarla in più di due punti. Gli archi di circolo sono essenzialmente convessi; ma la proposizione, di cui trattasi adesso, s'estende ad una linea qualunque, che soddisfaccia alla condizione predetta.

Posto ciò, se la linea  $AMB$  non è minore di tutte quelle, che la circondano, esisterà fra queste una linea più corta di tutte le altre, la quale sarà minore di  $AMB$ , o al più uguale ad  $AMB$ . Sia  $ACDEB$  questa linea circondante; fra le due linee conduttele, ove vorrete, la retta  $PQ$ , che non incontri la linea  $AMB$ , o che la tocchi soltanto. La retta  $PQ$  è minore di  $PCDEQ$ ; dunque, se alla parte  $PCDEQ$  si sostituisce la linea retta  $PQ$ , si avrà la linea circondata  $APQB$  minore di  $APDQB$ . Ma, per supposizione, questa doveva esser la più corta di tutte; dunque questa supposizione non può sussistere; dunque tutte le linee circondanti sono più lunghe di  $AMB$ .

*Scolio.* Si dimostrerà assolutamente nella stessa maniera che una linea convessa, e rientrante in se stessa  $AMB$  è più corta d'ogni linea, che la circondasse da ogni parte; e ciò tanto se la linea circondante  $FHG$  tocca  $AMB$  in uno, o più punti, quanto se la circonda senza toccarla.

Fig. 163.

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA

*Essendo date due circonferenze concentriche, si può sempre iscrivere nella maggiore un poligono regolare, i di cui lati non incontrino la minore, e si può pure circoscrivere alla minore un poligono regolare, i di cui lati non incontrino la maggiore. Così in ambedue i casi i lati del poligono descritto saranno racchiusi fra le due circonferenze.*

Fig. 164.

Siano  $CA, CB$  i raggi delle due circonferenze date. Per il punto  $A$  conducete la tangente  $DE$  terminata alla circonferenza maggiore in  $D$ , ed  $E$ . Iscrivete nella circonferenza maggiore uno dei poligoni regolari, che si possono iscrivere per i teoremi precedenti; dividete quindi gli archi sottesi dai lati in due parti uguali; e conducete le corde dei mezzi-archi: nascerà un poligono regolare d'un doppio numero di lati. Continuate la bisezione degli archi finchè giungiate ad un arco minore di  $DBE$ . Sia  $MBN$  quest'arco, il cui punto di mezzo è supposto  $B$ ; è chiaro che la corda  $MN$  sarà più lontana dal centro di  $DE$ , e che perciò il poligono regolare, di cui  $MN$  è lato, non può incontrare la circonferenza, di cui  $CA$  è il raggio.

Poste le medesime cose, tirate  $CM$ , e  $CN$ , che tagliano la tangente  $DE$  in  $P$ , e  $Q$ ;  $PQ$  sarà il lato d'un poligono circoscritto alla circonferenza minore, simile al poligono iscritto nella maggiore, il cui lato è  $MN$ . Ora è



manifesto che il poligono circoscritto, che ha per lato PQ, non può arrivare alla circonferenza maggiore, poichè CP è minor di CM.

Dunque, colla medesima costruzione, si può descrivere un poligono regolare iscritto nella circonferenza maggiore, ed un poligono simile circoscritto alla minore, i di cui lati saranno compresi fra le due circonferenze.

*Scolio.* Se si hanno due settori concentrici FCG, ICH, si potrà similmente iscrivere nel maggiore una *porzione di poligono regolare*, o circoscrivere al minore una porzione di poligono simile, talmente che i contorni dei due poligoni siano compresi fra le due circonferenze: basterà dividere l'arco FBG successivamente in 2, 4, 8, 16, ec. parti uguali, finchè si arrivi a una parte minore di DBE.

Chiamiamo quì *porzione di poligono regolare* la figura, che risulta da una serie di corde uguali iscritte nell'arco FG da un'estremità all'altra. Questa porzione ha le proprietà principali dei poligoni regolari; ha gli angoli uguali; è ad un tempo iscrivibile, e circoscrivibile al circolo; ma per altro ella non farebbe parte di un poligono regolare propriamente detto, se l'arco sotteso da un dei suoi lati non fosse una parte aliquota della intera circonferenza.

## PROPOSIZIONE XI.

## TEOREMA

*Le circonferenze de' circoli sono come i raggi, e le loro superficie come i quadrati dei medesimi raggi.*

Fig. 163. Per abbreviare, indichiamo con *circ. CA* la circonferenza, che ha per raggio *CA*; dico che si avrà *circ. CA : circ. OB :: CA : OB*.

Poichè, se questa proporzione non ha luogo, *CA* starà ad *OB* come *circ. CA* stà ad una circonferenza maggiore, o minore di *circ. OB*. Supponiamo che sia minore; e sia, s'è possibile, *CA : OB :: circ. CA : circ. OD*.

Iscrivete nella circonferenza, di cui *OB* è il raggio, un poligono regolare *EFGKLE*, i cui lati non incontrino la circonferenza, della quale *OD* è il raggio \*; iscrivete un poligono simile *MNPSTM* nella circonferenza, di cui *CA* è il raggio.

Posto ciò, poichè questi poligoni sono simili, i loro perimetri *MNPSM*, *EFGKE* stanno fra loro come i raggi *CA*, *OB* de' circoli circoscritti\*, e si avrà *MNPSM : EFGKE :: CA : OB*; ma, per supposizione, *CA : OB :: circ. CA : circ. OD*; dunque *MNPSM : EFGKE :: circ. CA : circ. OD*. Or questa proporzione è impossibile, perchè il contorno *MNPSM* è minore di *circ. CA* \*, e il contorno *EFGKE* è maggiore di *circ. OD*; dunque è impossibile che *CA* stia ad *OB* come *circ. CA* stà ad una circonferenza minore di *circ. OB*, o in termini più generali è impos-

sibile che un raggio stia ad un raggio come la circonferenza del primo raggio stà ad una circonferenza minore della circonferenza del secondo raggio.

Da ciò conchiudo che non si può dare neppure che CA stia ad OB come *circ. CA* ad una circonferenza maggiore di *circ. OB*; poichè, se ciò fosse, si avrebbe, rovesciando i rapporti, OB a CA come una circonferenza maggiore di *circ. OB* a *circ. CA*, o, il che è lo stesso, come *circ. OB* ad una circonferenza minore di *circ. CA*; dunque un raggio starebbe ad un raggio come la circonferenza del primo raggio stà ad una circonferenza minore della circonferenza del secondo raggio; il che è stato dimostrato impossibile.

Ma se il quarto termine della proporzione CA : OB :: *circ. CA* : X non può essere nè maggiore, nè minore di *circ. OB*, bisogna che sia uguale a *circ. OB*; dunque le circonferenze de' circoli stanno fra loro come i raggi.

Un ragionamento, ed una costruzione interamente simili serviranno a dimostrare che le superficie dei circoli stanno come i quadrati de' loro raggi. Non entreremo in altri particolari su questa proposizione, che d'altronde è un corollario della seguente.

*Corollario.* Gli archi simili AB, DE stanno come i raggi AC, DO; ed i settori simili ACB, DOE come i quadrati di questi medesimi raggi. Fig. 166.

Poichè, siccome gli archi son simili, l'an-

\* Def. 3. golo C è uguale all'angolo O \*: ora l'angolo  
 lib. 3. C stà a quattro angoli retti come l'arco AB  
 stà alla circonferenza intera descritta col rag-  
 \* 17, 2. gio AC \*: e l'angolo O stà a quattro angoli  
 retti come l'arco DE stà alla circonferenza  
 descritta col raggio OD; dunque gli archi  
 AB, DE stanno fra loro come le circonfe-  
 renze, di cui fanno parte; queste circonfe-  
 renze stanno come i raggi AC, DO; dunque  
 $AB : DE :: AC : DO$ .

Per la medesima ragione, i settori ACB,  
 DOE stanno come i cerchi interi; questi  
 stanno come i quadrati de' raggi; dunque  
 $ACB : DOE :: \overline{AC}^2 : \overline{DO}^2$ .

## PROPOSIZIONE XII.

### TEOREMA

*La superficie del circolo ha per misura il prodotto della sua circonferenza per la metà del raggio.*

Fig. 157. Indichiamo con *sup.* CA la superficie del  
 circolo, il di cui raggio è CA; dico che  
 sarà *sup.*  $CA = \frac{1}{2} CA \times \text{circ. } CA$ .

Poichè se  $\frac{1}{2} CA \times \text{circ. } CA$  non è la misura  
 del circolo, il cui raggio è CA, questa quan-  
 tità sarà la misura d'un circolo maggiore,  
 o minore. Supponiamo primieramente che sia  
 la misura d'un circolo maggiore, e sia, se  
 è possibile,  $\frac{1}{2} CA \times \text{circ. } CA = \text{sup. } CB$ .

Al circolo, il cui raggio è CA, circoscri-  
 vete un poligono regolare DEFG ec., i di  
 cui lati non incontrino la circonferenza della

quale CB è il raggio \*; la superficie di questo poligono sarà uguale al suo contorno DE+EF+FG+, ec. moltiplicato per  $\frac{1}{2}AC$  \*: \* 10. ma il contorno del poligono è maggiore della circonferenza iscritta, poichè la circonda da tutte le parti; dunque la superficie del poligono DEFG ec. è maggiore di  $\frac{1}{2}AC \times circ. AC$ , che è la misura del circolo, di cui CB è il raggio; dunque il poligono sarebbe maggiore del circolo: ora al contrario è minore, poichè vi è contenuto; dunque è impossibile che  $\frac{1}{2}CA \times circ. CA$  sia maggiore di *sup.* CA, o, in altri termini, è impossibile che la circonferenza d'un circolo moltiplicata per la metà del suo raggio sia la misura d'un circolo maggiore.

Dico in secondo luogo che il medesimo prodotto non può essere la misura d'un circolo minore; e, per non cambiar figura, supporrò che si tratti del circolo, il cui raggio è CB: bisogna dunque provare che  $\frac{1}{2}CB \times circ. CB$  non può essere la misura d'un circolo minore, per esempio, del circolo, il cui raggio è CA. In fatti sia, se è possibile,  $\frac{1}{2}CB \times circ. CB = sup. CA$ .

Avendo fatto la stessa costruzione di sopra, la superficie del poligono DEFG ec.: avrà dunque per misura (DE+EF+FG+ ec.)  $\times \frac{1}{2}CA$ ; ma il contorno DE+EF+FG+ ec. è minore di *circ.* CB, che lo circonda da tutte le parti; dunque l'area del poligono è minore di  $\frac{1}{2}CA \times circ. CB$ , ed, a più forte ra-

gione, minore di  $\frac{1}{2}CB \times \text{circ. } CB$ . Quest' ultima quantità è per ipotesi, la misura del circolo, di cui  $CA$  è il raggio; dunque il poligono sarebbe minore del circolo iscritto; il che è assurdo; dunque è impossibile che la circonferenza d' un circolo moltiplicata per la metà del suo raggio sia la misura d' un circolo minore.

Dunque finalmente la circonferenza d' un circolo moltiplicata per la metà del suo raggio è la misura dell' area del medesimo circolo.

*Corollario I.* La superficie d' un settore è uguale all' arco di questo settore moltiplicato per la metà del raggio.

Fig. 163. Poichè il settore  $ACB$  stà al circolo intero come l' arco  $AMB$  stà alla circonferenza intera  $ABD$  \*, o come  $AMB \times \frac{1}{2}AC$  stà ad  $ABD \times \frac{1}{2}AC$ : ma il circolo intero  $= ABD \times \frac{1}{2}AC$ ; dunque il settore  $ACB$  ha per misura  $AMB \times \frac{1}{2}AC$ .

*Corollario II.* Chiamiamo  $p$  la circonferenza, il di cui diametro è l' unità: poichè le circonferenze stanno come i raggi, o come i diametri, si potrà far questa proporzione: il diametro 1 stà alla sua circonferenza  $p$  come il diametro  $2CA$  stà alla circonferenza, che ha per raggio  $CA$ ; talmente che si avrà  $1:p::2CA:\text{circ. } CA$ ; dunque  $\text{circ. } CA = 2p \times CA$ . Moltiplicando da ambe le parti per  $\frac{1}{2}CA$ , si avrà  $\frac{1}{2}CA \times \text{circ. } CA = p \times \overline{CA}^2$ , o  $\text{sup. } CA = p \cdot \overline{CA}^2$ ; dunque la superficie d' un cir-

colo è uguale al quadrato del suo raggio moltiplicato per il numero costante  $p$ , che rappresenta la circonferenza, il di cui diametro è 1, o il rapporto della circonferenza al diametro.

Parimente la superficie del circolo, che ha per raggio  $OB$ , sarà uguale a  $p \times \overline{OB}^2$ ; ora  $p \times \overline{CA}^2 : p \times \overline{OB}^2 :: \overline{CA}^2 : \overline{OB}^2$ ; dunque le superficie dei circoli stanno fra loro come i quadrati dei loro raggi; il che s' accorda col precedente teorema.

*Scolio.* Abbiamo già detto che il problema della quadratura del circolo consiste in trovare un quadrato uguale di superficie ad un circolo, il cui raggio è cognito; ma si è adesso provato che il circolo è equivalente al rettangolo fatto sulla circonferenza, e sulla metà del raggio; e questo rettangolo si cangia in un quadrato prendendo una media proporzionale fra le due sue dimensioni\*; quindi <sup>\* Pr. 6. lib. 3.</sup> è che il problema della quadratura del circolo si riduce a trovar la circonferenza quando si conosce il raggio, e per questo basta conoscere il rapporto della circonferenza al raggio, o al diametro.

Finora non si è potuto determinare questo rapporto se non che in una maniera prossima al vero; ma l'approssimazione è stata portata sì lungi, che la cognizione del rapporto esatto non avrebbe alcun vantaggio reale al di sopra di quella del rapporto approssimativo. Perciò questa ricerca, che ha molto occupato

i Geometri allorchè i metodi di approssimazione erano men conosciuti, è adesso riposta tra le ricerche futili, di cui non è permesso occuparsi se non a coloro, che hanno appena le prime nozioni della Geometria.

*Archimede* ha provato che il rapporto della circonferenza al diametro è compreso fra  $3\frac{1}{70}$  e  $3\frac{1}{71}$ ; laonde  $3\frac{1}{7}$ , ovvero  $2\frac{3}{7}$  è un valore già molto prossimo al numero, che abbiamo rappresentato con  $p$ ; e questa prima approssimazione è molto in uso a cagione della sua semplicità. *Mezio* ha trovato per il medesimo numero il valore molto più prossimo  $3\frac{55}{113}$ . Finalmente il valore di  $p$ , sviluppato fino a un cert'ordine di *decimali*, è stato trovato da altri calcolatori 3, 1415926535897932, ec., e si è avuta la pazienza di continuare queste *decimali* fino alla centventisettesima, e parimente sino alla cencinquantesima. È chiaro che una tale approssimazione quasi equivale alla verità, e che non si conoscono meglio le *radici* delle *potenze* imperfette.

Si spiegheranno nei problemi seguenti due dei metodi più semplici per ottenere queste approssimazioni.

### PROPOSIZIONE XIII.

#### PROBLEMA

*Essendo date la superficie d'un poligono regolare iscritto e la superficie d'un poligono simile circoscritto, trovare le superficie dei poligoni regolari iscritto, e circoscritto d'un doppio numero di lati.*



Sia  $AB$  il lato del poligono dato iscritto, Fig. 169.  $EF$  parallelo ad  $AB$  il lato del poligono simile circoscritto,  $C$  il centro del circolo: se si tirano la corda  $AM$ , e le tangenti  $AP$ ,  $BQ$ , la corda  $AM$  sarà il lato del poligono iscritto d'un doppio numero di lati, e  $PQ$ , doppio di  $PM$ , sarà quello del poligono simile circoscritto \*. Posto ciò, siccome la medesima costruzione ha luogo nei differenti angoli eguali ad  $ACM$ , basta considerare l'angolo  $ACM$  solo, ed i triangoli, che vi son contenuti, staranno fra loro come i poligoni interi. Sia  $A$  la superficie del poligono iscritto, di cui  $AB$  è un lato,  $B$  la superficie del poligono simile circoscritto,  $A'$  la superficie del poligono, di cui  $AM$  è un lato,  $B'$  la superficie del poligono simile circoscritto;  $A$ , e  $B$  son cogniti: si tratta di trovare  $A'$  e  $B'$ .

1.° I triangoli  $ACD$ ,  $ACM$ , il cui vertice comune è  $A$ , stanno fra loro come le rispettive basi  $CD$ ,  $CM$ ; d'altronde questi triangoli stanno come i poligoni  $A$ , ed  $A'$ , di cui fanno parte; dunque  $A : A' :: CD : CM$ . I triangoli  $CAM$ ,  $CME$ , il cui vertice comune è  $M$ , stanno fra loro come le basi rispettive  $CA$ ,  $CE$ ; questi medesimi triangoli stanno come i poligoni  $A'$ , e  $B$ , di cui fanno parte; dunque  $A' : B :: CA : CE$ . Ma, a motivo delle parallele  $AD$ ,  $ME$ , si ha  $CD : CM :: CA : CE$ ; dunque  $A : A' :: A' : B$ ; dunque il poligono  $A'$ , uno di quelli, che si cercano, è medio proporzionale fra i due poli-

goni cogniti  $A$ , e  $B$ , e si ha per conseguenza  $A' = \sqrt{A \times B}$ .

- \* 17, 5. 2.<sup>o</sup> Il triangolo  $CPM$  stà al triangolo  $CPE$ , a motivo dell'altezza comune  $CM$ , come  $PM$  stà a  $PE$ ; ma la linea  $CP$  dividendo in due parti uguali l'angolo  $MCE$ , si ha \*  $PM : PE :: CM : CE :: CD : CA :: A : A'$ ; dunque  $CPM : CPE :: A : A'$ ; componendo  $CMP : CPM + CPE$ , o  $CME$ , ::  $A : A + A'$ . Ma  $CMPA$  o  $2CMP$ , e  $CME$  stanno fra loro come i poligoni  $B'$ , e  $B$ , di cui fanno parte; dunque  $B' : B :: 2A : A + A'$ . Si è già determinato  $A'$ ; questa nuova proporzione determinerà  $B'$ , e si avrà  $B' = \frac{2A \times B}{A + A'}$ ; dunque col mezzo dei poligoni  $A$ , e  $B$ , è facile trovare i poligoni  $A'$ , e  $B'$ , che hanno doppio numero di lati.

#### PROPOSIZIONE XIV.

##### PROBLEMA

*Trovare il rapporto prossimo al vero della circonferenza al diametro.*

- \* 3. Sia il raggio del circolo  $= 1$ ; il lato del quadrato iscritto sarà  $\sqrt{2}$  \*; quello del quadrato circoscritto è uguale al diametro  $2$ ; dunque la superficie del quadrato iscritto  $= 2$ , e quella del quadrato circoscritto  $= 4$ . Adesso; se si fa  $A = 2$ , e  $B = 4$ , si troverà per il problema precedente l'ottagono iscritto  $A' = \sqrt{8} = 2,8284271$ , e l'ottagono circoscritto  $B' = \frac{16}{2 + \sqrt{8}} = 3,3137085$ . Conoscendo co-

si gli ottagoni iscritto, e circoscritto, si troveranno col loro mezzo i poligoni d' un doppio numero di lati; bisognerà nuovamente supporre  $A=2,8284271$ ,  $B=3,3137085$ , e si avrà

$$A'=\sqrt{A \times B}=3,0614674, \text{ e } B'=\frac{2A \times B}{A+A'}=3,$$

1825979. Dipoi questi poligoni di 16 lati serviranno a conoscere quelli di 32, e si continuerà così finchè il calcolo non dia più differenza fra i poligoni iscritto, e circoscritto, almeno nelle cifre *decimali* impiegate, che in questo caso son sette. Arrivati a tal punto, si conchiuderà che il circolo è uguale all' ultimo risultato, perchè il circolo dee sempre esser compreso tra il poligono iscritto, ed il poligono circoscritto; dunque, se questi non differiscono fra di loro fino a una certa cifra *decimale*, il circolo pure non ne differirà fino alla stessa cifra.

Ecco il calcolo di questi poligoni prolungato finchè non differiscano più nella settima cifra *decimale*.

| Numero de' lati | Poligono iscritto | Poligono circoscritto |
|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 4.....          | 2,0000000.....    | 4,0000000             |
| 8.....          | 2,8284271.....    | 3,3137085             |
| 16.....         | 3,0614674.....    | 3,1825979             |
| 32.....         | 3,1214451.....    | 3,1517249             |
| 64.....         | 3,1365485.....    | 3,1441184             |
| 128.....        | 3,1403311.....    | 3,1422236             |
| 256.....        | 3,1412772.....    | 3,1417504             |
| 512.....        | 3,1415138.....    | 3,1416321             |
| 1024.....       | 3,1415729.....    | 3,1416025             |

|            |                |           |
|------------|----------------|-----------|
| 2048.....  | 3,1415877..... | 3,1415951 |
| 4096.....  | 3,1415914..... | 3,1415933 |
| 8192.....  | 3,1415923..... | 3,1415928 |
| 16384..... | 3,1415925..... | 3,1415927 |
| 32768..... | 3,1415926..... | 3,1415926 |

Da ciò conchiudo che la superficie del circolo  $= 3,1415926$ . Si potrebbe aver dubbio sull'ultima *decimale* a cagione degli errori prodotti dalle parti neglette; ma il calcolo è stato fatto con una decimale di più, per esser certi del risultato, che abbiám trovato fino all'ultima *decimale*.

Poichè la superficie del circolo è uguale alla mezza-circonferenza moltiplicata per il raggio, essendo il raggio  $= 1$ , la mezza-circonferenza è  $3,1415926$ ; ovvero, essendo il diametro  $= 1$ , la circonferenza è  $3,1415926$  dunque il rapporto della circonferenza al diametro, indicato di sopra con  $p$ ,  $= 3,1415926 : 1$ .

### PROPOSIZIONE XV.

#### L E M M A

Fig. 170. Il triangolo CAB è equivalente al triangolo isoscele DCE, che ha il medesimo angolo C, e il di cui lato CE, o CD è medio proporzionale fra CA, e CB. Di più, se l'angolo CAB è retto, la perpendicolare CF abbassata sulla base del triangolo isoscele sarà media proporzionale fra il lato CA, e la mezza-somma dei lati CA, CB.

Perchè 1.º, a motivo dell'angolo comune C, il triangolo ABC stà al triangolo isoscele

DCE come  $AC \times CB$  stà a  $DC \times CE$ , o  $\overline{DC}^2$ ; \* 24, 3.  
 dunque questi triangoli saranno equivalenti,

se  $DC = AC \times CB$ , o se DC è media proporzionale tra AC, e CB.

2° La perpendicolare CGF tagliando in due parti uguali l'angolo ACB, si ha \* AG : \* 17, 3.

GB :: AC : CB, donde ne segue componendo AG : AG + GB, o AB :: AC : AC + CB; ma AG sta ad AB come il triangolo ACG stà al triangolo ACB, o 2CDF; d'altronde, se l'angolo A è retto, i triangoli rettangoli ACG, CDF sono simili, e si ha ACG :

CDF ::  $\overline{AC}^2$  :  $\overline{CF}^2$ ; dunque

$\overline{AC}^2$  :  $2\overline{CF}^2$  :: AC : AC + CB.

Moltiplicando il secondo rapporto per AC, gli antecedenti diverranno uguali, e si avrà per conseguenza  $2\overline{CF}^2 = AC \times (AC + CB)$ , o  $\overline{CF}^2 = AC \times \left(\frac{AC + CB}{2}\right)$ ; dunque 2°, se l'an-

golo A è retto, la perpendicolare CF sarà media proporzionale tra il lato AC, e la mezza somma dei lati AC, CB.

## PROPOSIZIONE XVI.

### PROBLEMA

*Trovare un circolo, che differisca quanto poco si voglia da un poligono regolare dato.*

Sia proposto per esempio il quadrato BMNP; Fig. 17°  
 abbassate dal centro C la perpendicolare CA sul lato MB, e tirate CB.

Il circolo descritto col raggio CA è iscritto nel quadrato, ed il circolo descritto col raggio CB è circoscritto al quadrato medesimo; il primo sarà minor del quadrato; il secondo sarà maggiore; si tratta di ristringere questi limiti.

15. Prendete CD, e CE uguali ciascuna alla media proporzionale tra CA, e CB; tirate ED; ed il triangolo isoscele CDE sarà equivalente al triangolo CAB \*; fate lo stesso per ciascuno degli otto triangoli, che compongono il quadrato; e formerete così un ottagono regolare equivalente al quadrato BMNP. Il circolo descritto col raggio CF medio proporzionale fra CA, e  $\frac{CA+CB}{2}$  sarà iscritto nell'ottagono, ed il circolo descritto col raggio CD gli sarà circoscritto; laonde il primo sarà minor del quadrato, ed il secondo maggiore.

Se si cangia nella medesima maniera il triangolo rettangolo CDF in un triangolo isoscele equivalente, si formerà con tal mezzo un poligono regolare di sedici lati equivalente al quadrato proposto. Il circolo iscritto in questo poligono sarà minor del quadrato, ed il circolo circoscritto sarà maggiore.

Si può continuare così finchè il rapporto tra il raggio del circolo iscritto, ed il raggio del circolo circoscritto differisca quanto poco si vorrà dall'uguaglianza. Allora l'uno,

e l'altro circolo potrà essere riguardato come equivalente al quadrato proposto.

Ecco a che cosa riducesi la ricerca dei raggi consecutivi. Sia  $a$  il raggio del circolo iscritto in uno dei poligoni trovati,  $b$  il raggio del circolo circoscritto al medesimo poligono; siano  $a'$ , e  $b'$  i raggi simili per il poligono susseguente, che ha un doppio numero di lati. Secondo ciò, che abbiám dimostrato,  $b'$  è una media proporzionale fra  $a$ , e  $b$ , ed  $a'$  è una media proporzionale fra  $a$ , ed  $\frac{a+b}{2}$ ; talmente che si avrà  $b' = \sqrt{a \times b}$ ;

ed  $a' = \sqrt{a \times \frac{a+b}{2}}$ ; dunque, essendo cogniti

i raggi  $a$ , e  $b$  d'un poligono, se ne deducano facilmente i raggi  $a'$ , e  $b'$  del poligono susseguente; e si continuerà così finchè la differenza fra i due raggi sia divenuta insensibile; ed allora l'uno, o l'altro di questi raggi sarà il raggio del circolo equivalente al quadrato, o al poligono proposto.

*Scolio.* Questo metodo è facile a praticarsi in linee, poichè si riduce a trovare delle medie proporzionali successive fra linee cognite; ma riesce ancor meglio in numeri, ed è uno dei mezzi più comodi, che la Geometria elementare possa offerire per trovar prontamente il rapporto prossimo al vero della circonferenza al diametro. Sia il lato del quadrato  $= 2$ ; il primo raggio iscritto CA sarà 1, ed il primo raggio circoscritto

CB sarà  $\sqrt{2}$ , ovvero 1,4142136. Facendo dunque  $a=1, b=1,4142136$ , si troverà  $b'=1,1892071$ , ed  $a'=1,0986841$ . Questi numeri serviranno a calcolare i seguenti secondo la legge data di continuazione. Ecco il risultato del calcolo fatto fino a sette, o otto cifre colle Tavole dei *logaritmi* ordinarij.

Raggi de' circoli circoscritti      Raggi de' circoli iscritti

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1,4142136 ..... | 1,0000000  |
| 1,1892071 ..... | 1,0986841  |
| 1,1430500 ..... | 1,1210863  |
| 1,1320149 ..... | 1,1265639  |
| 1,1292862 ..... | 1,1279257  |
| 1,1286063 ..... | 1,1282657. |

Adesso che la prima metà delle cifre è ridotta la medesima dalle due parti, invece dei medj geometrici, si posson prendere i medj aritmetici, che ne differiscono soltanto nelle *decimali ulteriori*. Con tal mezzo l'operazione si abbrevia molto, ed i risultati sono

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1,1284360 ..... | 1,1283508  |
| 1,1283934 ..... | 1,1283721  |
| 1,1283827 ..... | 1,1283774  |
| 1,1283801 ..... | 1,1283787  |
| 1,1283794 ..... | 1,1283791  |
| 1,1283792 ..... | 1,1283792. |

Dunque 1,1283792 è molto prossimamente al vero il raggio del circolo uguale in su-



perficie al quadrato, il di cui lato è 2. Quindi è facil trovare il rapporto della circonferenza al diametro; perchè si è dimostrato che la superficie del circolo è uguale al quadrato del raggio moltiplicato per il numero  $p$ ; dunque se si divide la superficie 4 per il quadrato di 1,1283792, si avrà il valore di  $p$ , che si trova con questo calcolo essere 3,1415926 ec., come si era trovato con altro metodo.

## APPENDICE AL LIBRO QUARTO

### DEFINIZIONI

I. Si chiama *massimo* la quantità più grande di tutte quelle della medesima specie; *minimo* la più piccola.

Così il diametro del circolo è un *massimo* fra tutte le linee, che congiungon due punti della circonferenza, e la perpendicolare è un *minimo* fra tutte le linee condotte da un punto dato ad una linea data.

II. Si chiamano figure *isoperimetre* quelle, che hanno i *perimetri* uguali.

### PROPOSIZIONE I.

#### TEOREMA

*Fra tutti i triangoli della stessa base, e dello stesso perimetro il triangolo isoscele è un massimo.*

**Fig. 172.** Sia  $AC=CB$ , e  $AM+MB=AC+CB$ ; dico che il triangolo isoscele  $ACB$  è maggiore in superficie del triangolo non isoscele  $AMB$ , che ha la medesima base, e lo stesso perimetro.

Dal punto  $C$ , come centro, e col raggio  $CA=CB$  descrivete una circonferenza, che incontri  $CA$  prolungato in  $D$ ; tirate  $DB$ ; e l'angolo  $DBA$  iscritto nel mezzo-circolo sarà un angolo retto \*. Prolungate la perpendicolare  $DB$  verso  $N$ ; fate  $MN=MB$ ; e tirate  $AN$ . Finalmente dai punti  $M$ , e  $C$  abbassate  $MP$ ,  $CG$  perpendicolari sopra  $DN$ . Poichè  $CB=CD$ , e  $MN=MB$ , si ha  $AC+CB=AD$ , e  $AM+MB=AM+MN$ . Ma  $AC+CB=AM+MB$ ; dunque  $AD=AM+MN$ ; dunque  $AD>AN$ . Ora, se l'obliqua  $AD$  è maggior dell'obliqua  $AN$ , dev'essere più lontana dalla perpendicolare  $AB$ ; dunque  $DB>BN$ . Dunque  $BG$ , che è metà di  $BD$  \*, sarà più grande di  $BP$ , metà di  $BN$ . Ma i triangoli  $ABC$ ,  $ABM$ , che hanno la medesima base  $AB$ , stanno fra loro come le rispettive altezze  $BG$ ,  $BP$ ; e poichè  $BG>BP$ , ne segue che il triangolo isoscele  $ABC$  è maggiore del non-isoscele  $ABM$  della medesima base, e dello stesso perimetro.

## PROPOSIZIONE II.

## TEOREMA

*Di tutti i poligoni isoperimetri, e d'un medesimo numero di lati il più grande è l'equilatero*

Poichè sia il poligono ABCDEF il poli- Fig. 173.  
gono massimo; se il lato BC non è uguale a CD, fate sulla base BD un triangolo isoscele BOD, che sia isoperimetro rispetto a BCD; il triangolo BOD sarà maggiore di BCD \*, e per conseguenza il poligono \* Pr. 1.  
ABODEF sarà maggiore di ABCDEF; dunque quest'ultimo non sarebbe il massimo fra tutti quelli, che hanno l'istesso perimetro, ed il medesimo numero di lati; il che è contra la supposizione; dunque  $BC=CD$ : per la medesima ragione  $CD=DE$ ,  $DE=EF$ ; dunque tutti i lati del poligono massimo sono uguali tra loro.

## PROPOSIZIONE III.

## TEOREMA

*Di tutti i triangoli formati con due lati dati, che faccian fra loro un angolo a piacere, il massimo è quello, in cui i due lati dati formano un angolo retto.*

Siano i due triangoli BAC, BAD, che Fig. 174.  
hanno il lato AB comune, ed il lato  $AC=AD$ ; se l'angolo BAC è retto, dico che il triangolo BAC sarà maggior del triangolo BAD, nel quale l'angolo A è acuto, od ottuso.

Poichè essendo la stessa la base  $AB$ , i due triangoli  $BAC$ ,  $BAD$  stanno come le altezze  $AC$ ,  $DE$ ; ma la perpendicolare  $DE$  è minor dell'obliqua  $AD$ , o della sua uguale  $AC$ ; dunque il triangolo  $BAD$  è minore di  $BAC$ .

### PROPOSIZIONE IV.

#### TEOREMA

*Di tutti i poligoni formati con dei lati dati, ed un ultimo a piacimento, il massimo dev'esser tale che tutti i suoi angoli siano iscritti in una mezza-circonferenza, di cui il lato incognito sia il diametro.*

Fig. 175. Sia  $ABCDEF$  il massimo dei poligoni formati coi lati dati  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EF$ , ed un ultimo  $AF$  a piacimento; tirate le diagonali  $AD$ ,  $DF$ . Se l'angolo  $ADF$  non è retto, si potrà, conservando le parti  $ABCD$ ,  $DEF$  tali quali sono, aumentare il triangolo  $ADF$ , e per conseguenza il poligono intero, rendendo l'angolo  $ADF$  retto: ma questo poligono non può essere aumentato di più, poichè si suppone giunto al suo massimo; dunque l'angolo  $ADF$  è già retto. Lo stesso è degli angoli  $ABF$ ,  $ACF$ ,  $AEF$ ; dunque tutti gli angoli  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$ ,  $F$  del poligono massimo sono iscritti in una mezza-circonferenza, di cui il lato indeterminato  $AF$  è il diametro.

*Scolio.* Questa proposizione fa nascere la questione se vi siano diverse maniere di formare un poligono con dei lati dati, ed un ultimo incognito, che sarà il diametro della

mezza-circonferenza, nella quale gli altri lati sono iscritti. Avanti di decidere questa questione bisogna osservare che, se una medesima corda AB sottende degli archi descritti Fig. 176. con differenti raggi AC, AD, l'angolo al centro appoggiato su questa corda sarà minore nel circolo, il cui raggio è maggiore; così  $\angle ACB < \angle ADB$  perchè  $\angle ADO = \angle ACD + \angle CAD^*$ ; dunque  $\angle ACD < \angle ADO$ , e rad-<sup>\* 19,1.</sup> doppiando da una parte, e dall'altra si avrà  $\angle ACB < \angle ADB$ .

# PROPOSIZIONE V.

## TEOREMA

*V'è una sola maniera di formare il poligono ABCDEF con dei lati dati, ed un ultimo incognito, che sia il diametro della mezza-circonferenza, nella quale sono iscritti gli altri lati.*

Poichè supponiamo che si sia trovato un Fig. 175. circolo, che soddisfaccia alla questione: se si prende un circolo maggiore, le corde AB, BC, CD, ec. corrisponderanno ad angoli al centro minori. La somma di questi angoli al centro sarà dunque minore di due angoli retti, e così le estremità dei lati dati non perverranno più alle estremità del diametro. L'inconveniente contrario avrà luogo se si prende un circolo minore; dunque il poligono, di cui si tratta, non può essere iscritto se non che in un sol circolo.

*Scolio.* Si può cambiare a piacimento l'ordine dei lati AB, BC, CD, ec., ed il dia-

metro del circolo circoscritto sarà sempre lo stesso, come pure la superficie del poligono; poichè, qualunque sia l'ordine degli archi  $AB$ ,  $BC$ , ec., basta che la lor somma faccia la mezza-circonferenza, ed il poligono avrà sempre la medesima superficie, poichè sarà uguale al mezzo-circolo meno i segmenti  $AB$ ,  $BC$ , ec., la somma de' quali è sempre la stessa.

## PROPOSIZIONE VI.

## TEOREMA

*Di tutti i poligoni formati con dei lati dati il massimo è quello, che si può inscrivere in un circolo.*

Fig. 177. Sia  $ABCDEFG$  il poligono iscritto, e  $abcdefg$  il non-inscrivibile formato con dei lati uguali, talmente che sia  $AB=ab$ ,  $BC=bc$ , ec.; dico che il poligono iscritto è maggiore dell'altro.

Tirate il diametro  $EM$ ; conducete  $AM$ ,  $MB$ ; sopra  $ab=AB$  fate il triangolo  $abm=ABM$ ; e tirate  $em$ .

In virtù della proposizione IV. il poligono  $EFGAM$  è maggiore di  $efgam$ , salvo che questo non possa essere parimente iscritto in una mezza-circonferenza, di cui il lato  $em$  sarebbe il diametro; nel qual caso i due poligoni sarebbero uguali in virtù della proposizione V. Per la medesima ragione il poligono  $EDCBM$  è maggiore di  $edcbm$ , eccetto il medesimo caso, in cui vi sarebbe uguaglianza. Dunque il poligono intero  $EFGAMBCDE$

è maggiore di *efgambcde* salvo che non siano interamente uguali; ma essi non lo sono, poichè l'uno è iscrivibile, e l'altro è supposto non iscrivibile; dunque il poligono iscritto è il maggiore. Da ambedue togliendo i triangoli uguali *ABM*, *abm*, resterà il poligono iscritto *ABCDEFG* maggiore del non-iscrivibile *abcdefg*.

*Scolio.* Si dimostrerà, come nella proposizione V., che non può esservi che un sol circolo, e per conseguenza che un sol poligono massimo, che soddisfaccia alla questione, e questo poligono sarebbe ancora della medesima superficie in qualunque modo che si cangiasse l'ordine dei suoi lati.

## PROPOSIZIONE VII.

## TEOREMA

*Il poligono regolare è un massimo fra tutti i poligoni isoperimetri, e d'un medesimo numero di lati.*

Poichè, secondo il teorema II., il poligono massimo ha tutti i suoi lati uguali; e, secondo il teorema precedente, è iscrivibile nel circolo; dunque esso è regolare.

## PROPOSIZIONE VIII.

## LEMMA

*Due angoli al centro, misurati in due circoli differenti, stanno fra loro come gli archi compresi divisi pe' i loro raggi.*

Così l'angolo *C* stà all'angolo *O* come il Fig. 1. 8.  
 rapporto  $\frac{AB}{AC}$  stà al rapporto  $\frac{DE}{DO}$ .

Con un raggio  $OF$  uguale ad  $AC$  descrivete l'arco  $FG$  compreso fra i lati  $OD$ ,  $OE$  prolungati: a cagione de' raggi uguali  $AC$ ,  $OF$ , si avrà primieramente  $C : O :: AB : FG$ ,

\* 17, 2. ovvero  $:: \frac{AH}{AC} : \frac{FG}{FO}$ ; ma \*, a cagione degli

\* 11. archi simili  $FG$ ,  $DE$ , si ha \*  $FG : DE :: FO : DO$ ; dunque il rapporto  $\frac{FG}{FO}$  è uguale

al rapporto  $\frac{DE}{DO}$ ; e per conseguenza si ha

$$C : O :: \frac{AB}{AC} : \frac{DE}{DO}.$$

### PROPOSIZIONE IX.

#### TEOREMA

*Di due poligoni regolari isoperimetri quello, che ha più lati, è il maggiore.*

Fig. 179. Sia  $DE$  il mezzo-lato d'un dei poligoni,  $O$  il suo centro,  $OE$  il suo apotema; sia  $AB$  il mezzo-lato dell'altro poligono,  $C$  il suo centro,  $CB$  il suo apotema. Si suppongono i centri  $O$ , e  $C$  situati ad una distanza qualunque  $OC$ , e gli apotemi  $OE$ ,  $CB$  nella direzione medesima  $OC$ . Così  $DOE$ , e  $ACB$  saranno i mezzi-angoli al centro dei poligoni, e siccome questi angoli non sono uguali, le rette  $AC$ ,  $OD$  prolungate s'incontreranno in un punto  $F$ ; da questo punto abbassate sopra  $OC$  la perpendicolare  $FG$ ; dai punti  $O$ , e  $C$ , come centri, descrivete gli archi  $GI$ ,  $GH$  terminati ai lati  $OF$ ,  $CF$ .

Posto ciò, si avrà per il Lemma prece-



dente  $O : C :: \frac{GI}{OG} : \frac{GH}{CG}$ ; ma DE stà al perimetro del primo poligono come l'angolo O stà a quattro angoli retti, ed AB stà al perimetro del secondo come l'angolo C stà a quattro angoli retti; dunque, poichè i perimetri dei poligoni sono uguali,  $DE : AB :: O : C$ ; dunque  $DE : AB :: \frac{GI}{OG} : \frac{GH}{CG}$ .

Moltiplicando gli antecedenti per OG, ed i conseguenti per CG, si avrà allora  $DE \times OG : AB \times CG :: GI : GH$ ; ma i triangoli simili ODE, OFG danno  $OE : OG :: DE : FG$ , donde resulta  $DE \times OG = OE \times FG$ . Si avrà parimente  $AB \times CG = CB \times FG$ ; dunque  $OE \times FG : CB \times FG :: GI : GH$ , ovvero  $OE : CB :: GI : GH$ . Dico adesso che l'arco GI è maggiore dell'arco GH, ed allora ne seguirà che l'apotèma OE è maggior di CB.

Dall'altra parte di CF si faccia la figura CKx interamente identica alla figura CGx, in modo che si abbia  $CK = CG$ , l'angolo  $HCK = HCG$ , e l'arco  $Kx = xG$ ; la curva KxG invilupperà KHG, e sarà maggior di quest'arco \*; dunque Gx metà della curva \* 9. è maggior di GH metà dell'arco; dunque molto più GI è maggior di GH.

Resulta da ciò che l'apotèma OE è maggior di CB: ma i due poligoni, avendo il medesimo perimetro, stanno fra loro come i rispettivi apotèmi \*; dunque il poligono, che \* 7. ha per mezzo-lato DE, è maggiore di quello, che ha per mezzo-lato AB; il primo ha più

lati, poichè l'angolo al centro è minore; dunque di due poligoni regolari isoperimetri quello, che ha più lati, è il maggiore.

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA

*Il circolo è maggiore d'ogni poligono isoperimetro.*

Fig. 180. Si è già provato che di tutti i poligoni isoperimetri, e d'un medesimo numero di lati, il poligono regolare è il più grande; laonde non si tratta che di paragonare il circolo ad un poligono regolare qualunque isoperimetro. Sia  $AI$  il mezzo-lato di questo poligono,  $C$  il suo centro. Sia nel circolo isoperimetro l'angolo  $DOE = ACI$ , e perciò l'arco  $DE$  uguale al mezzo-lato  $AI$ . Il poligono  $P$  starà al circolo  $C$  come il triangolo  $ACI$  stà al settore  $ODE$ , ossia  $P : C :: \frac{AI \times CI}{2} : \frac{DE \times OE}{2} :: CI : OE$ . Sia condotta al punto  $E$  la tangente  $EG$ , che incontri  $CD$  prolungata in  $G$ ; i triangoli simili  $ACI$ ,  $GOE$  daranno la proporzione  $CI : OE :: AI$ , ovvero  $DE : GE$ ; dunque  $P : C :: DE : GE$ , o come  $DE \times \frac{1}{2}OE$ , che è la misura del settore  $DOE$ , stà a  $GE \times \frac{1}{2}OE$ , che è la misura del triangolo  $GOE$ : ora il settore è minor del triangolo; dunque  $P$  è minore di  $C$ ; dunque il circolo è maggiore d'ogni poligono isoperimetro.

## LIBRO QUINTO

## I PIANI E GLI ANGOLI SOLIDI

## DEFINIZIONI

1. Una linea retta è *perpendicolare ad un piano* quando è perpendicolare a tutte le rette, che passano per il suo *pie**de*, e sono nel piano \*. Reciprocamente il piano è perpendicolare alla linea retta. \* Pr. 4.

Il *pie**de* della perpendicolare è il punto dove questa linea incontra il piano.

2. Una linea è *parallela ad un piano* quando non può incontrarlo, a qualunque distanza ambedue si prolunghino. Reciprocamente il piano è parallelo alla linea.

3. Due piani son *paralleli* fra loro quando non possono mai incontrarsi, a qualunque distanza si prolunghino l'uno, e l'altro.

4. Si dimostrerà \* che l'intersezione comune di due piani, che s'incontrano, è una linea retta: posto ciò, l'*inclinazione* scambievole di due piani è la quantità o apertura più, o meno grande, per cui sono distanti l'uno dall'altro; questa quantità si misura \* \* Pr. 17. dall'angolo, che fanno fra loro due perpen-

dicolari condotte in ognuno di questi piani ad un medesimo punto dell' intersezione comune.

« Quest' angolo può essere acuto, retto, od ottuso.

5. Se è retto, i due piani saranno *perpendicolari* fra loro.

6. *Angolo solido* è lo spazio angolare compreso tra più piani, che si riuniscono in un medesimo punto.

Fig. 199. Così l'angolo solido S è formato dalla riunione degli angoli piani ASB, BSC, CSD, DSA.

Sono necessari almeno tre angoli piani per formare un angolo solido.

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA

*Una linea retta non può essere in parte in un piano, ed in parte fuori.*

Poichè, secondo la definizione del piano, subito che una linea retta ha due punti comuni con un piano, dessa è tutta intera in un tal piano.

*Corollario.* Dunque, per riconoscere se una superficie è piana, bisogna applicare una linea retta in differenti sensi su questa superficie, e vedere se essa tocca la superficie in tutta la sua estensione.

## PROPOSIZIONE II.

### TEOREMA

*Due linee rette, che si tagliano, sono in*

*un medesimo piano, e ne determinano la posizione.*

Siano  $AB$ ,  $AC$  due linee rette, che si ta- Fig. 181.  
gliano in  $A$ : si può concepire un piano dove  
si trova la linea retta  $AB$ : se si fa girar  
questo piano intorno ad  $AB$  finchè passi per  
il punto  $C$ , allora la linea  $AC$ , che ha due  
dei suoi punti  $A$ , e  $C$  in questo piano, vi  
sarà tutta intera; dunque la posizione di que-  
sto piano è determinata dalla sola condizione  
di passare per le due rette  $AB$ ,  $AC$ .

*Corollario I.* Dunque un triangolo  $ABC$ ,  
o tre punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$  non in linea retta, de-  
terminano la posizione d' un piano.

*Corollario II.* Dunque anche due parallele Fig. 182.  
 $AB$ ,  $CD$  determinano la posizione d' un pia-  
no; perchè, se si conduce la secante  $EF$ , il  
piano delle due rette  $AE$ ,  $EF$ , sarà quello  
delle parallele  $AB$ ,  $CD$ .

### PROPOSIZIONE III.

#### TEOREMA

*Se due piani si tagliano, la loro comune  
intersezione sarà una linea retta.*

Poichè, se nei punti comuni ai due piani  
se ne trovassero tre, che non fossero in linea  
retta, i due piani, di cui si tratta, passando  
ciascuno per questi tre punti, non farebber  
che un solo, e medesimo piano \*; il che è \*  
contra la supposizione.

## PROPOSIZIONE IV.

## TEOREMA

Fig 183. *Se una linea retta AP è perpendicolare a due altre PB, PC, che s'incrociano al suo piede nel piano MN, essa sarà perpendicolare ad una retta qualunque PQ condotta dal suo piede nel medesimo piano, e perciò sarà perpendicolare al piano MN.*

Per un punto Q, preso a volontà sopra PQ, tirate la retta BC nell'angolo BPC, di  
 \* Prob. 5. maniera che  $BQ = QC$  \*; tirate AB, AQ, AC.  
 lib. 3.

Essendo la base BC divisa in due parti  
 \* 14, 3. uguali nel punto Q, il triangolo BPC darà \*

$$\overline{PC}^2 + \overline{PB}^2 = 2\overline{PQ}^2 + 2\overline{QC}^2.$$

Il triangolo BAC darà parimente

$$\overline{AC}^2 + \overline{AB}^2 = 2\overline{AQ}^2 + 2\overline{QC}^2.$$

Togliendo la prima equazione dalla seconda, e osservando che i triangoli APC, APB, ambedue rettangoli in P, danno  $\overline{AC}^2 - \overline{PC}^2 = \overline{AP}^2$ , e  $\overline{AB}^2 - \overline{PB}^2 = \overline{AP}^2$ , si avrà

$$\overline{AP}^2 + \overline{AP}^2 = 2\overline{AQ}^2 - 2\overline{PQ}^2.$$

Dunque, prendendo le metà da ambe le  
 parti,  $\overline{AP} = \overline{AQ} - \overline{PQ}$ , o  $\overline{AQ} = \overline{AP} + \overline{PQ}$ ; dun-  
 \* 13, 3. que il triangolo APQ è rettangolo in P \*;  
 dunque AP è perpendicolare a PQ.

*Scolio.* Si vede da ciò che non solamente è possibile che una linea retta sia perpendicolare a tutte quelle, che passano per il suo piede in un piano, ma che questo accade tutte

le volte che questa linea è perpendicolare a due rette condotte nel piano. Ciò dimostra la legittimità della definizione I.

*Corollario I.* La perpendicolare AP è più corta di un' obliqua qualunque AQ; dunque misura la vera distanza del punto A dal piano MN.

*Corollario II.* Da un punto P dato sopra un piano non si può alzare che una sola perpendicolare a questo piano; perchè, se si potessero alzare due perpendicolari dal medesimo punto P, conducete per queste due perpendicolari un piano, la cui intersezione col piano MN sia PQ; allora le due perpendicolari, di cui si tratta, sarebbero perpendicolari alla linea PQ nel medesimo punto, e nel medesimo piano; il che è impossibile.

È parimente impossibile d' abbassare da un punto dato fuori d' un piano due perpendicolari a questo piano; poichè siano AP, AQ queste due perpendicolari; allora il triangolo APQ avrebbe due angoli retti APQ, AQP; il che è impossibile.

## PROPOSIZIONE V.

### TEOREMA

*Le oblique ugualmente lontane dalla perpendicolare sono uguali; e di due oblique disugualmente lontane dalla perpendicolare quella, che se ne allontana di più, è la maggiore.*

Poichè essendo retti gli angoli APB, APC, Fig. 184. APD, se si suppongono le distanze PB, PC,

PD uguali fra loro, i triangoli APB, APC, APD avranno un angolo uguale compreso fra lati uguali; dunque saranno uguali; dunque le ipotenuse, o le oblique AB, AC, AD saranno uguali fra loro. Parimente, se la distanza PE è maggior di PD, o della sua uguale PB, è chiaro che l'obliqua AE sarà maggiore di AB, o della sua uguale AD.

*Corollario.* Tutte le oblique uguali AB, AC, AD, ec. terminano alla circonferenza BCD descritta dal piede della perpendicolare P come centro; dunque, essendo dato un punto A fuori d'un piano, se si vuol trovare su questo piano il punto P ove cadrebbe la perpendicolare abbassata da A, bisogna segnare su questo piano tre punti B, C, D ugualmente lontani dal punto A, e cercare in seguito il centro del circolo, che passa per questi tre punti: questo centro sarà il punto cercato P.

*Scolio.* L'angolo ABP è ciò, che si chiama *inclinazione dell'obliqua AB sul piano MN*; si vede che quest'inclinazione è uguale per tutte le oblique AB, AC, AD, ec., che si allontanano ugualmente dalla perpendicolare, perchè tutti gli angoli ABP, ACP, ADP, ec. sono uguali fra loro.

### PROPOSIZIONE VI.

#### TEOREMA

**Fig. 185.** Sia AP una perpendicolare al piano MN, BC una linea situata in questo piano; se dal piede P della perpendicolare si abbassa PD



*perpendicolare sopra BC, e che si tiri AD, dico che AD sarà perpendicolare a BC.*

Prendete  $DB=DC$ , e tirate  $PB, PC, AB, AC$ : poichè  $DB=DC$ , l'obliqua  $PB=PC$ ; e per rapporto alla perpendicolare  $AP$ , poichè  $PB=PC$ , l'obliqua  $AB=AC^*$ ; dunque \* 5. la linea  $AD$  ha due dei suoi punti  $A$ , e  $D$  ugualmente distanti dalle estremità  $B$ , e  $C$ ; dunque  $AD$  è perpendicolare sul mezzo di  $BC$ .

*Corollario.* Si vede nel medesimo tempo che  $BC$  è perpendicolare al piano  $APD$ , poichè  $BC$  è perpendicolare a un tempo alle due rette  $AD, PD$ .

*Scolio.* Le due linee  $AE, BC$  offron l'esempio di due linee rette, che non s'incontrano perchè non sono situate in un medesimo piano. La più corta distanza di queste linee è la retta  $PD$ , che è ad un tempo stesso perpendicolare alla linea  $AP$ , e alla linea  $BC$ . La distanza  $PD$  è la più corta fra queste due linee; poichè, se si congiungono due altri punti, come  $A$  e  $B$ , la distanza  $AB$  è maggiore di  $AD$ ;  $AD$  è maggior di  $PD$ ; dunque molto più  $AB > PD$ .

Le due linee  $AE, CB$ , benchè non situate in un medesimo piano, sono obbligate a fare tra loro un angolo retto, perchè  $AE$ , e la parallela condotta per un dei suoi punti alla linea  $BC$  faranno tra loro un angolo retto. Parimente la linea  $AB$ , e la linea  $PD$ , che rappresentano due linee rette qualunque non situate nel medesimo piano, sono obbli-

gate di far tra loro il medesimo angolo, che farebbe con AB la parallela a PD condotta per uno dei punti di AB.

## PROPOSIZIONE VII.

## TEOREMA

Fig. 186. *Se la linea AP è perpendicolare al piano MN, ogni linea DE parallela ad AP sarà perpendicolare al medesimo piano.*

Per le parallele AP, DE conducete un piano, la di cui intersezione col piano MN sarà PD; nel piano MN conducete BC perpendicolare a PD, e tirate AD.

Secondo il corollario del teorema precedente BC è perpendicolare al piano APDE; dunque l'angolo BDE è retto: ma l'angolo EDP è retto pure, poichè AP è perpendicolare a PD, e DE è parallela ad AP; dunque la linea DE è perpendicolare alle due rette DP, DB; dunque è perpendicolare al loro piano MN.

*Corollario I.* Reciprocamente, se le rette AP, DE son perpendicolari al medesimo piano MN, saranno parallele; poichè, se non lo fossero, conducete per il punto D una parallela ad AP, questa parallela sarà perpendicolare al piano MN; dunque si potrebbe da un medesimo punto D alzare due perpendicolari a un medesimo piano; il che è impossibile \*.

*Corollario II.* Due linee A, e B parallele ad una terza C sono parallele fra loro; poichè immaginate un piano perpendicolare alla

linea C; le linee A, e B parallele a questa perpendicolare saranno perpendicolari al medesimo piano; dunque, per il corollario precedente, saranno parallele fra loro. Si suppone che le tre linee non siano in un medesimo piano, senza di che la proposizione sarebbe già nota \*.

\* 26, 1.

## PROPOSIZIONE VIII.

## T E O R E M A

*Se la linea AB è parallela a una retta Fig. 187.  
CD condotta nel piano MN, sarà parallela a questo piano.*

Poichè, se la linea AB, che è nel piano ABCD, incontrasse il piano MN, ciò non potrebbe essere che in qualche punto della linea CD, intersezione comun dei due piani; ora AB non può incontrare CD, poichè le è parallela; dunque non incontrerà neppure il piano MN; dunque sarà parallela a questo piano \*.

\* Def. 2.

## PROPOSIZIONE IX.

## T E O R E M A

*Due piani MN, PQ perpendicolari a una Fig. 188.  
medesima retta AB son paralleli fra loro.*

Poichè, se s'incontrassero in qualche luogo, sia O uno dei loro punti comuni, e tirate OA, OB; la linea AB perpendicolare al piano MN è perpendicolare alla retta OA condotta dal suo piede in questo piano; per la medesima ragione AB è perpendicolare a BO; dunque OA, e OB sarebbero due per-

pendicolari abbassate dal medesimo punto O sulla medesima linea retta; il che è impossibile: dunque i piani MN, PQ non possono incontrarsi; dunque son paralleli.

## PROPOSIZIONE X.

## TEOREMA

Fig. 189. *Le intersezioni EF, GH di due piani paralleli MN, PQ con un terzo piano FG son parallele.*

Poichè, se le linee EF, GH situate in uno stesso piano non son parallele, essendo prolungate s'incontreranno; dunque i piani MN, PQ, ne' quali esse sono, s'incontrerebbero pure; dunque non sarebbero paralleli.

## PROPOSIZIONE XI.

## TEOREMA

Fig. 188. *La linea AB perpendicolare al piano MN è ancor perpendicolare al piano PQ parallelo a MN.*

Avendo tirata a piacere la linea BC nel piano PQ, per AB, e BC conducete un piano ABC, la cui intersezione col piano MN sia AD; l'intersezione AD sarà parallela a BC\*; ma la linea AB perpendicolare al piano MN è perpendicolare alla retta AD; dunque sarà pur perpendicolare alla sua parallela BC; e poichè la linea AB è perpendicolare ad ogni retta BC condotta per il suo piede nel piano PQ, ne segue ch'è perpendicolare al piano PQ.

## PROPOSIZIONE XII.

## TEOREMA

*Le parallele EG, FH comprese fra due piani paralleli MN, PQ sono uguali.* Fig. 189.

Per le parallele EG, FH fate passare il piano EGHF, che incontrerà i piani paralleli in EF, e GH. Le intersezioni EF, GH son parallele, come pure EG, FH; dunque la figura EGHF è un parallelogrammo; dunque  $EG=FH$ .

*Corollario.* Segue da ciò, che due piani paralleli sono da per tutto ad ugual distanza; poichè, se EG, e FH sono perpendicolari ai due piani MN, PQ, saranno parallele fra loro \*; dunque saranno uguali. \* 7.

## PROPOSIZIONE XIII.

## TEOREMA

*Se due angoli CAE, DBF non situati nello stesso piano hanno i loro lati paralleli, e diretti in un medesimo senso, questi angoli saranno uguali, e i loro piani paralleli.* Fig. 190.

Prendete  $AC=BD$ ,  $AE=BF$ , e tirate CE, DF, AB, CD, EF. Poichè AC è uguale, e parallela a BD, la figura ABDC è un parallelogrammo\*: dunque CD è uguale, e parallela ad AB. Per una simil ragione EF è uguale, e parallela ad AB; dunque ancora CD è uguale, e parallela ad EF: la figura CEFD è dunque un parallelogrammo, e il lato CE è uguale, e parallelo a DF: dunque i triangoli

CAE, DBF sono equilateri fra di loro ; dunque l'angolo  $CAE = DBF$ .

In secondo luogo dico che il piano ACE è parallelo al piano BDF ; poichè supponiamo che il piano parallelo a BDF condotto per il punto A incontri le linee EF, CD in punti diversi da C, ed E, per esempio, in G, e H ; allora , secondo la proposizione XII, le tre linee AB, GD, FH saranno uguali : ma le tre AB, CD, EF lo son già ; dunque si avrebbe  $CD = GD$ , e  $FH = EF$  ; il che è assurdo ; dunque il piano ACE è parallelo a BDF.

\* 10. *Corollario.* Se due piani paralleli MN, PQ sono incontrati da due altri piani CABD, EABF, gli angoli CAE, DBF formati dalle intersezioni dei piani paralleli saranno uguali ; perchè l'intersezione AC è parallela a BD \*, AE a BF ; dunque l'angolo  $CAE = DBF$ .

#### PROPOSIZIONE XIV.

##### TEOREMA

Fig. 190. *Se tre rette AB, CD, EF non situate nel medesimo piano sono eguali, e parallele, i triangoli ACE, BDF, formati da una parte e dall'altra congiungendo l'estremità di queste rette, saranno uguali, e i loro piani saran paralleli.*

Poichè, siccome AB è uguale, e parallela a CD, la figura ABDC è un parallelogrammo ; dunque il lato AC è uguale, e parallelo a BD. Per la stessa ragione i lati AE, BF

sono eguali, e paralleli, come pure CF, BF; dunque i due triangoli CAE, BDF sono eguali: si proverà ancora, come nella proposizion precedente, che i loro piani son paralleli.

## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA

*Le parti di due rette comprese tra piani paralleli sono proporzionali.*

Supponiamo che la linea AB incontri i piani paralleli MN, PQ, RS in A, E, B, e che la linea CD incontri i medesimi piani in C, F, D; dico che si avrà  $AE : EB :: CF : FD$ . Fig. 191.

Tirate AD, che incontri il piano PQ in G, e conducete AC, EG, GF, BD: le intersezioni EG, BD dei piani paralleli PQ, RS col piano ABD son parallele; dunque  $AE : EB :: AG : GD$ ; parimente \*, essendo parallele le intersezioni AC, GF, si ha  $AG : GD :: CF : FD$ ; dunque, a cagione del rapporto comune AG : GD, si avrà  $AE : EB :: CF : FD$ . 10.

## PROPOSIZIONE XVI.

## TEOREMA

*Sia ABCD un quadrilatero qualunque situato, o non situato in un medesimo piano, se si tagliano i lati opposti proporzionalmente con due rette EF, GH, talmentechè si abbia  $AE : EB :: DF : FC$ , e  $BG : GC :: AH : HD$ ; dico che le rette EF, GH si taglieran-* Fig. 192.

no in un punto *M* di maniera che si avrà  
 $HM : MG :: AE : EB$ , ed  $EM : MF ::$   
 $AH : HD$ .

Conducete per *AD* un piano qualunque *AbHcD*, che non passi per *GH*; per i punti *E*, *B*, *C*, *F* conducete a *GH* le parallele *Ee*, *Bb*, *Cc*, *Ff*, che incontrino questo piano in *e*, *b*, *c*, *f*. S' avrà primieramente, a  
 \* 15, 3. motivo delle parallele *Bb*, *GH*, *Cc* \*, *bH* :  
 \* 20, 3. *Hc* :: *BG* : *GC* :: *AH* : *HD*; dunque \* i  
 triangoli *AHb*, *eHD* sono simili. Si avrà di  
 più *Ae* : *eb* :: *AE* : *EB*, e *Df* : *fc* :: *DF* :  
*FC*; dunque *Ae* : *eb* :: *Df* : *fc*, o, componendo, *Ae* : *Df* :: *Ab* : *Dc*. Ma, a motivo  
 dei triangoli simili *AHb*, *cHD*, si ha *Ab* :  
*Dc* :: *AH* : *HD*; dunque *Ae* : *Df* :: *AH* :  
*HD*; d'altronde i triangoli *AHb*, *cHD* es-  
 sendo simili, l'angolo *HAe* = *HDf*; dunque  
 \* 20, 3. i triangoli *AHe*, *DHf* sono simili \*, e l'angolo  
*AHe* = *DHf*. Ne segue in primo luogo che *eHf*  
 è una linea retta, e che perciò le tre para-  
 llele *Ee*, *GH*, *Ff* son situate in un mede-  
 simo piano, il quale conterrà le rette *EF*,  
*GH*; dunque queste debbon tagliarsi in un  
 punto *M*. Dipoi, a cagione delle parallele  
*Ee*, *MH*, *Ff*, si avrà  $EM : MF :: eH :$   
 $Hf :: AH : HD$ . Con una costruzione si-  
 mile facendo passare un piano per *AB*, si  
 dimostrerebbe che  $HM : MG :: AE : EB$ .



## PROPOSIZIONE XVII.

## TEOREMA

*L'angolo compreso fra due piani MAN, MAP Fig. 193. può esser misurato, conforme alla definizione, dall'angolo NAP, che fanno fra loro le due perpendicolari AN, AP condotte in ciascuno di questi piani all'intersezione comune AM.*

Per dimostrare la legittimità di questa misura, bisogna provare 1.° che essa è costante, ossia che sarà la medesima da qualunque punto dell'intersezione comune si conducano le due perpendicolari

Infatti, se si prende un altro punto M, e si conducono MC nel piano MN, e MB nel piano MP perpendicolari all'intersezione comune AM, poichè MB, ed AP son perpendicolari a una medesima retta AM, saranno parallele fra loro. Per la medesima ragione, MC è parallela ad AN; dunque l'angolo  $BMC = PAN$  \*; dunque è indifferente il condurre le perpendicolari dal punto M, o dal punto A; l'angolo compreso sarà sempre lo stesso. 13.

2.° Bisogna provare che se l'angolo dei due piani cresce, o diminuisce in un certo rapporto, l'angolo PAN aumenterà, o diminuirà nel rapporto medesimo.

Nel piano PAN descrivete col centro A, e con un raggio a piacere l'arco NDP; col centro M, e con un raggio uguale descrivete l'arco CEB; tirate AD a piacimento: i due

- \* 9. piani PAN, BMC essendo perpendicolari ad una medesima retta, saran paralleli \*, dunque le intersezioni AD, ME di questi due piani con un terzo AMD saran parallele; dunque l'angolo BME sarà eguale a PAD \*.

\* 13.

Chiamiamo, per un momento, *canto* l'angolo formato da' due piani PM, MN: posto ciò, se l'angolo DAP fosse uguale a DAN, è chiaro che il *canto* DAMP sarebbe uguale al *canto* DAMN, perchè la base DAP si situerebbe esattamente sulla sua ugnale DAN, l'altezza AM sarebbe sempre la stessa: dunque i due *canti* coinciderebbero l'uno coll'altro. Si vede del pari che se l'angolo DAP fosse contenuto un certo numero preciso di volte nell'angolo PAN, il *canto* DAMP sarebbe contenuto altrettante volte nel *canto* PAMN. D'altronde dal rapporto in numeri interi a un rapporto qualunque la conclusione è legittima, ed è stata dimostrata tale in un'occasione interamente simile \*; dunque, qualunque sia il rapporto dell'angolo DAP all'angolo PAN, il *canto* DAMP sarà nel medesimo rapporto col *canto* PAMN; dunque l'angolo NAP può esser preso per la misura del *canto* PAMN, o dell'angolo, che fanno fra loro i due piani MAP, MAN.

\* 17,2.

*Scolio.* Quando due piani si traversano scambievolmente, si forman quattro angoli, di cui gli opposti al vertice sono uguali, e i due adjacenti equivalgono a due angoli retti; dunque, se un piano è perpendicolare ad

un altro, questo secondo è pur perpendicolare al primo. Parimente nell'incontro dei piani paralleli con un terzo piano si avranno le medesime uguaglianze d'angoli, e le medesime proprietà che nell'incontro di due linee parallele con una terza.

## PROPOSIZIONE XVIII.

## TEOREMA

*Essendo la linea AP perpendicolare al piano MN, ogni piano APB condotto per AP sarà perpendicolare al piano medesimo MN.* Fig. 194.

Sia BC l'intersezione dei piani AB, MN; se nel piano MN si conduce DE perpendicolare a BP, la linea AP, essendo perpendicolare al piano MN, sarà perpendicolare a ciascuna delle due rette BC, DE: ma l'angolo APD, formato dalle due perpendicolari PA, PD all'intersezione comune BP, è l'angolo dei due piani AB, MN; dunque, poichè quest'angolo è retto, i due piani son perpendicolari fra loro.

*Scolio.* Quando tre rette, come AP, BP, DP, son perpendicolari fra loro, ciascuna di queste linee è perpendicolare al piano dell'altre due, e i tre piani son perpendicolari fra loro.

## PROPOSIZIONE XIX.

## TEOREMA

*Se il piano APB è perpendicolare al piano MN, e se si conduca nel piano APB la linea PA perpendicolare all'intersezione comune* Fig. 194.

**PB**, dico che **PA** sarà perpendicolare al piano **MN**.

Poichè, se nel piano **MN** si conduce **DP** perpendicolare a **PB**, l'angolo **APD** sarà retto, giacchè i piani son perpendicolari fra loro: dunque la linea **AP** è perpendicolare alle due rette **PB**, **PD**; dunque è perpendicolare al loro piano **MN**.

*Corollario.* Se il piano **AB** è perpendicolare al piano **MN**, e per un punto **P** dell'intersezione comune si alza una perpendicolare al piano **MN**; dico che questa perpendicolare sarà nel piano **AB**; poichè, se non vi fosse, si potrebbe condurre nel piano **AB** la perpendicolare **AP** all'intersezione comune **BP**, la quale sarebbe nel medesimo tempo perpendicolare al piano **MN**; dunque nel medesimo punto **P** vi sarebbero due perpendicolari al piano **MN**; il che è impossibile \*.

\* 4.

## PROPOSIZIONE XX.

### TEOREMA

**Fig. 194.** *Se due piani **AB**, **AD** sono perpendicolari ad un terzo **MN**, la loro intersezione comune **AP** sarà perpendicolare a questo terzo piano.*

Poichè, se per il punto **P** si alza una perpendicolare al piano **MN**, questa perpendicolare dee trovarsi ad un tempo nel piano **AB**, e nel piano **AD** \*; dunque è la loro comune intersezione **AP**.

\* 19.

194

## PROPOSIZIONE XXI.

## TEOREMA

*Se un angolo solido è formato da tre angoli piani, la somma di due qualunque di questi angoli sarà maggiore del terzo.*

Non v'è bisogno di dimostrar la proposi- Fig. 195<sup>r</sup>  
zione se non quando uno degli angoli piani è maggior di ciascuno degli altri due. Sia dunque l'angolo solido S formato da tre angoli piani ASB, ASC, BSC, e supponiamo che l'angolo ASB sia il più grande di essi; dico che sarà  $ASB < ASC + BSC$ .

Nel piano ASB fate l'angolo BSD = BSC; tirate a piacere ADB; ed avendo preso SC = SD, tirate AC, BC.

I due lati BS, SD sono uguali ai due BS, SC, l'angolo BSD = BSC; dunque i due triangoli BSD, BSC sono uguali; dunque BD = BC. Ma  $AB < AC + BC$ ; togliendo da una parte BD, dall'altra BC, resterà  $AD < AC$ . I due lati AS, SD sono uguali ai due AS, SC, il terzo AD è minore del terzo AC; dunque \*  
l'angolo ASD < ASC. Aggiungendo BSD = BSC, si avrà ASD + BSD, o  $ASB < ASC + BSC$ . \* 10, 1.

## PROPOSIZIONE XXII.

## TEOREMA

*La somma degli angoli piani, che formano un angolo solido, è sempre minore di quattro angoli retti.*

Tagliate l'angolo solido S con un piano Fig. 196.

qualunque ABCDE; da un punto O preso in questo piano conducete a tutti gli angoli le linee rette OA, OB, OC, OD, OE.

Gli angoli di tutti i triangoli ASB, BSC, ec. formati intorno al vertice S, presi insieme, equivalgono a tutti gli angoli d'un simil numero di triangoli AOB, BOC, ec., formati intorno al vertice O. Ma al punto B gli angoli ABO, OBC presi insieme fanno l'angolo ABC minor della somma degli angoli ABS, SBC \*; parimente al punto C si ha  $BCO + OCD < BCS + SCD$ ; e così rispetto a tutti gli angoli del poligono ABCDE. Segue da ciò che nei triangoli il cui vertice è in O, la somma degli angoli alla base è minor della somma degli angoli alla base dei triangoli, il cui vertice è in S; dunque in compensazione la somma degli angoli formati intorno al punto O è maggiore della somma degli angoli intorno al punto S. Ma la somma degli angoli intorno al punto O è uguale a quattro angoli retti \*; dunque la somma degli angoli piani, che formano l'angolo solido S, è minore di quattro angoli retti.

*Scolio.* Questa dimostrazione suppone che l'angolo solido sia *convesso*, ossia che il piano d'una faccia prolungato non possa mai tagliare l'angolo solido; se fosse altrimenti, la somma degli angoli piani non avrebbe più limite, e potrebb'essere d'una grandezza qualunque.

## PROPOSIZIONE XXIII.

## TEOREMA

*Se due angoli solidi son composti di tre angoli piani rispettivamente uguali, i piani, nei quali sono gli angoli uguali, saranno ugualmente inclinati fra loro.*

Sia l'angolo  $ASC = DTF$ , l'angolo  $ASB = DTE$ , e l'angolo  $BSC = ETF$ ; dico che i due piani  $ASC$ ,  $ASB$  avranno fra loro la medesima inclinazion dei due piani  $DTF$ ,  $DTE$ . Fig. 197.

Avendo preso  $SB$  a piacere, conducete  $BO$  perpendicolare al piano  $ASC$ ; dal punto  $O$ , dove questa perpendicolare incontra il piano, conducete  $OA$ ,  $OC$  perpendicolari sopra  $SA$ ,  $SC$ ; tirate  $AB$ ,  $BC$ ; prendete dipoi  $TE = SB$ ; conducete  $EP$  perpendicolare sul piano  $DTF$ ; dal punto  $P$  conducete  $PD$ ,  $PF$  perpendicolari sopra  $TD$ ,  $DF$ ; infine tirate  $DE$ ,  $EF$ .

Il triangolo  $SAB$  è rettangolo in  $A$ , ed il triangolo  $TDE$  in  $D$ \*; e, poichè l'angolo  $ASB = DTE$ , si ha pure  $SBA = TED$ . D'altronde  $SB = TE$ ; dunque il triangolo  $SAB$  è uguale al triangolo  $TDE$ ; dunque  $SA = TD$ , e  $AB = DE$ . Si dimostrerà similmente che  $SC = TF$ , e  $BC = EF$ . Posto ciò, il quadrilatero  $SAOC$  è uguale al quadrilatero  $TDPF$ ; poichè, ponendo l'angolo  $ASC$  sul suo uguale  $DTF$ , a cagione di  $SA = TD$ , e  $SC = TF$ , il punto  $A$  cadrà in  $D$ , ed il punto  $C$  in  $F$ . Nel medesimo tempo  $AO$  perpendicolare a  $SA$  cadrà sopra  $DP$  perpendicolare a  $TD$ , e parimente  $OC$  sopra  $PF$ ; dunque il punto

O cadrà sul punto P, e si avrà  $AO=DP$ . Ma i triangoli AOB, DPE son rettangoli in O, e P, l'ipotenusa  $AB=DE$ , e il lato  $AO=DP$ ; dunque questi triangoli sono uguali \*; dunque l'angolo  $OAB=PDE$ . L'angolo OAB è l'inclinazione dei due piani ASB, ASC; l'angolo PDE è quella dei due piani DTF, DTE; dunque queste due inclinazioni sono uguali fra loro.

Bisogna osservare frattanto che l'angolo A del triangolo rettangolo OAB non è propriamente l'inclinazione dei due piani ASB, ASC, se non quando la perpendicolare BO cade per rapporto a SA dalla medesima parte di SC; se cadesse dall'altra parte, allora l'angolo dei due piani sarebbe ottuso, ed unito all'angolo A del triangolo OAB farebbe due angoli retti. Ma, nel medesimo caso, l'angolo dei due piani TDE, TDF sarebbe parimente ottuso, ed unito all'angolo D del triangolo DPE farebbe due angoli retti; dunque, siccome l'angolo A sarebbe sempre uguale a D, si conchiuderebbe parimente che l'inclinazione dei due piani ASB, ASC è uguale a quella dei due piani TDE, TDF.

*Scolio.* Se due angoli solidi son composti di tre angoli piani rispettivamente uguali, e se al tempo stesso gli angoli uguali, od omologhi sono *disposti della stessa maniera* nei due angoli solidi, allora questi angoli solidi saranno uguali, e posti l'uno sull'altro coincideranno. In fatti si è già veduto che il quadrilatero SAOC può esser situato



sul suo uguale TDPF; così situando SA sopra TD, SC cade sopra TF, e il punto O sul punto P. Ma, a cagione dell'uguaglianza dei triangoli AOB, DPE, la OB perpendicolare al piano ASC è uguale alla PE perpendicolare al piano TDF; di più queste perpendicolari son dirette nel medesimo senso; dunque il punto B cadrà sul punto E, la linea retta SB sopra TE, ed i due angoli solidi coincideranno interamente l'uno coll'altro.

Questa coincidenza però non ha luogo se non in quanto gli angoli piani uguali sono *disposti della maniera medesima* nei due angoli solidi; poichè, se gli angoli piani uguali fosser *disposti in un ordin inverso*, o, il che torna lo stesso, se le perpendicolari OB, PE, invece d'esser dirette nel medesimo senso per rapporto ai piani ASC, DTF, fosser dirette in senso contrario, allora sarebbe impossibile di far coincidere i due angoli solidi l'uno coll'altro. Non sarebbe però meno vero, conforme al teorema, che i piani nei quali sono gli angoli uguali, fossero ugualmente inclinati fra loro; talmente che i due angoli solidi sarebbero uguali in tutte le loro parti costituenti, senza però poter essere sovrapposti. Questa specie d'uguaglianza, che non è assoluta, o di sovrapposizione, merita d'esser distinta con una denominazione particolare: noi la chiameremo *uguaglianza per simmetria*. Così i due angoli solidi, di cui si tratta, che son formati da tre angoli rispettivamente uguali, ma disposti in un

ordine inverso, si chiameranno *angoli eguali per simmetria*, o semplicemente *angoli simmetrici*.

La medesima osservazione s'applica agli angoli solidi formati da più di tre angoli piani: così un angolo solido formato dagli angoli piani A, B, C, D, E, ed un altro angolo solido formato dai medesimi angoli in un ordine inverso A, E, D, C, B posson essere tali che i piani, nei quali sono gli angoli uguali, siano ugualmente inclinati fra loro. Questi due angoli solidi, che sarebbero uguali senza che fosse possibile la lor sovrapposizione, si chiameranno *angoli uguali per simmetria*, o *angoli simmetrici*.

Nelle figure piane propriamente non vi è *eguaglianza per simmetria*, e tutte quelle, che si volessero chiamar così, sarebbero *eguaglianze assolute*, o di sovrapposizione. La ragione è questa che si può rovesciare una figura piana, e prendere indifferentemente il di sopra per il di sotto: accade diversamente nei solidi, ove la terza dimensione può esser presa in due sensi diversi.

## PROPOSIZIONE XXIV.

### PROBLEMA

*Essendo dati i tre angoli piani, che formano un angolo solido, trovare con una costruzione lineare piana l'angolo, che due di questi piani fanno fra loro.*

Fig. 178. Sia S l'angolo solido già costruito, nel qual si conoscano i tre angoli piani ASB,

ASC, BSC; si cerca l'angolo, che fanno fra loro due di questi piani, per esempio, i piani ASB, ASC.

Immaginiamo che si sia fatta la stessa costruzione come nel teorema precedente; l'angolo OAB sarebbe l'angolo richiesto. Si tratta dunque di trovare il medesimo angolo con una costruzione lineare-piana, o fatta sopra un piano.

A tal oggetto fate sopra un piano gli angoli B'SA, ASC, B''SC uguali agli angoli BSA, ASC, BSC della figura solida; prendete B'S, e B''S uguali ciascuno a BS della figura solida; dai punti B', e B'' abbassate B'A, e B''C perpendicolari sopra SA, e SC, che s'incontrino in un punto O. Dal punto A, come centro, e col raggio AB' descrivete la mezza circonferenza B'bE: dal punto O alzate sopra B'E la perpendicolare Ob, che incontra la circonferenza in b; tirate Ab; e l'angolo EAb sarà l'inclinazione cercata dei due piani ASC, ASB nell'angolo solido.

Tutto si riduce a far vedere che il triangolo AOOb della figura piana è uguale al triangolo AOB della figura solida. Ora i due triangoli B'SA, BSA son rettangoli in A', e gli angoli in S sono uguali; dunque gli angoli in B, e B' son parimente uguali. Ma l'ipotenusa SB' è uguale all'ipotenusa SB; dunque questi triangoli sono uguali: dunque SA della figura piana è uguale a SA della figura solida, ed anche AB', o la sua uguale Ab nella figura piana è uguale ad AB nella

figura solida. Si dimostrerà pure che  $SC$  è uguale dalle due parti; d'onde ne segue che il quadrilatero  $SAOC$  è uguale in ambedue le figure, e che così  $AO$  della figura piana è uguale ad  $AO$  della figura solida; dunque nell'una, e nell'altra i triangoli rettangoli  $AOB$ ,  $AOB$  hanno l'ipotenusa uguale, ed un lato uguale; dunque sono uguali, e l'angolo  $EAOb$  trovato colla costruzione lineare-piana è uguale all'inclinazion dei due piani  $SAB$ ,  $SAC$  nell'angolo solido.

Quando il punto  $O$  cada fra  $A$ , e  $B'$  nella figura piana, l'angolo  $EAOb$  diventa ottuso, e misura sempre la vera inclinazione dei piani. Perciò si è indicata con  $EAOb$ , e non con  $OAB$  l'inclinazione richiesta, affinchè la medesima soluzione convenga a tutti i casi senza eccezione.

*Scolio.* Si potrebbe domandare se, prendendo tre angoli a piacere, si potrà formare un angolo solido con questi tre angoli piani.

Primieramente bisogna che la somma dei tre angoli dati sia minore di quattro angoli retti, senza di che l'angolo solido non può esser formato: bisogna di più che dopo aver preso due degli angoli a piacimento  $B'SA$ ,  $ASC$ , il terzo  $CSB''$  sia tale che la perpendicolare  $B''C$  al lato  $SC$  incontri il diametro  $B'E$  fra le sue estremità  $B'$ , ed  $E$ . Quindi è che i limiti della grandezza dell'angolo  $CSB''$  sono quelli, che fanno andare la perpendicolare  $B''C$  ai punti  $B'$ , ed  $E$ . Da questi punti abbassate sopra  $SC$  le perpendicolari  $B'I$ ,  $EK$ ,

che incontrino in I, e K la circonferenza descritta col raggio  $SB''$ ; ed i limiti dell'angolo  $CSB''$  saranno CSI, e CSK.

Ma nel triangolo isoscele  $B'SI$ , essendo la linea  $SI$  prolungata perpendicolare alla base  $B'I$ , si ha l'angolo  $CSI = CSB' = ASC + ASB'$ . E nel triangolo isoscele  $ESK$ , essendo la linea  $SK$  perpendicolare ad  $EK$ , si ha l'angolo  $CSK = CSE$ . D'altronde, a cagione dei triangoli uguali  $ASE$ ,  $ASB'$ , l'angolo  $ASE = ASB'$ ; dunque  $CSE$ , o  $CSK = ASC - ASB'$ .

Risulta da ciò che il problema sarà possibile ogni volta che il terzo angolo  $CSB'$  sarà minor della somma degli altri due  $ASC$ ,  $ASB'$ , e maggiore della lor differenza; condizione, che si accorda col teorema XXI; poichè, in virtù di un tal teorema, bisogna che si abbia  $CSB'' < ASC + ASB'$ , e bisogna pure che sia  $ASC < CSB'' + ASB'$ , o  $CSB'' > ASC - ASB'$ .

## PROPOSIZIONE XXV.

### PROBLEMA

*Essendo dati due dei tre angoli piani, che formano un angolo solido, coll'angolo, che i loro piani fanno fra loro, trovare il terzo angolo piano.*

Siano  $ASC$ ,  $ASB'$  i due angoli piani dati, Fig. 198 e supponiamo, per un momento, che  $CSB''$  sia il terzo angolo, che si cerca; allora, facendo la medesima costruzione del problema precedente, l'angolo compreso tra' piani dei due primi sarebbe  $EAb$ . Ora nello stesso

modo che si determina l'angolo  $EAb$  col mezzo di  $CSB''$  essendo dati gli altri due, così si può determinare  $CSB''$  col mezzo di  $EAb$ ; il che risolverà il problema proposto.

Avendo preso  $SB'$  a piacere, abbassate sopra  $SA$  la perpendicolare indefinita  $B'E$ ; fate l'angolo  $EAb$  uguale all'angolo dei due piani dati; dal punto  $b$ , ove il lato  $Ab$  incontra la circonferenza descritta col centro  $A$ , e col raggio  $AB'$ , abbassate sopra  $AE$  la perpendicolare  $bo$ , e dal punto  $O$  abbassate sopra  $SC$  la perpendicolare indefinita  $OCB''$ , che terminerete in  $B''$  di modo che  $SB' = SB''$ : l'angolo  $CSB''$  sarà il terzo angolo piano richiesto.

Perchè, se si facesse un angolo solido coi tre angoli piani  $B'SA$ ,  $ASC$ ,  $CSB''$ , l'inclinazione dei piani, ove sono gli angoli dati  $ASB'$ ,  $ASC$ , sarebbe uguale all'angolo dato  $EAb$ .

Fig. 199. *Scolio.* Se un angolo solido è *quadruplo*, o formato da quattro angoli piani  $ASB$ ,  $BSC$ ,  $CSD$ ,  $DSA$ , la cognizione di questi angoli non basta per determinare le inclinazioni scambievoli dei loro piani; poichè coi medesimi angoli piani si potrebbe formare un'infinità d'angoli solidi. Ma, se si aggiunga una condizione, per esempio, se sia data l'inclinazione dei due piani  $ASB$ ,  $BSC$ , allora l'angolo solido è intieramente determinato, e si potrà trovare l'inclinazione di due qualunque dei suoi piani. Infatti immaginate un angolo solido *triplo* formato dagli angoli

piani ASB, BSC, ASC; i due primi angoli sono dati, come pure l'inclinazion dei lor piani; si potrà dunque determinare mediante il problema presente il terzo angolo ASC. Dipoi, se si considera l'angolo solido *triplo* formato dagli angoli piani ASC, ASD, DSC, questi tre angoli son cogniti, onde l'angolo solido è interamente determinato. Ma l'angolo solido *quadruplo* è formato dalla riunione dei due angoli solidi *tripli*, di cui parliamo: dunque, poichè questi angoli parziali son noti, e determinati, l'angolo totale sarà parimente noto, e determinato.

(L'angolo dei due piani ASD, DSC si troverebbe immediatamente col mezzo del secondo angolo solido parziale. In quanto all'angolo dei due piani BSC, CSD bisognerebbe in un angolo solido parziale cercar l'angolo compreso fra i due piani BSC, ASC, e nell'altro l'angolo compreso fra i due piani ASC, DSC; la somma di questi due angoli sarebbe l'angolo compreso fra i piani BSC, DSC.)

Si troverà nella stessa maniera che, per determinare un angolo solido *quintuplo*, bisogna conoscere, oltre ai cinque angoli piani, che lo compongono, due delle inclinazioni scambievoli dei loro piani. Ne bisognerebbero tre nell'angolo solido *sestuplo*; e così in seguito.

---

## LIBRO SESTO

## I POLIEDRI

## DEFINIZIONI

1. Si chiama *solido poliedro*, o semplicemente *poliedro* ogni solido terminato da piani, o faccie piane. ( Questi piani sono necessariamente terminati da linee rette ). Si chiama in particolare *tetraedro* il solido, che ha quattro faccie; *essaedro* quello, che ne ha sei; *ottaedro* quello, che ne ha otto; *dodecaedro* quello, che ne ha dodici; *icosaedro* quello, che ne ha venti, ec.

Il *tetraedro* è il poliedro più semplice, perchè bisognano almeno tre piani per formare un angolo solido, e questi tre piani lasciano un vuoto, che per esser chiuso, esige almeno un quarto piano.

2. L' intersezione comune di due faccie adjacenti d' un poliedro si chiama *lato*, *spigolo*, o *costola* del poliedro.

3. Si chiama *poliedro regolare* quello, di cui tutte le faccie son poligoni regolari uguali, e di cui tutti gli angoli solidi son uguali fra loro. Questi poliedri son in nu-



mero di cinque. *Vedete l' Appendice ai Libri VI. e VII.*

4. Il *prisma* è un solido compreso da più piani parallelogrammi, terminati da una parte e dall'altra da piani poligoni eguali, e paralleli.

Per costruir questo solido, sia ABCDE un poligono qualunque; se in un piano parallelo ad ABC si conducon le linee FG, GH, HI, ec. eguali, e parallele ai lati AB, BC, CD, ec., si formerà con questi il poligono FGHIK eguale ad ABCDE; e se in seguito si uniscon da un piano all' altro i vertici degli angoli omologhi con le rette AF, BG, CH, ec., le faccie ABGF, BCHG, ec. saranno parallelogrammi, ed il solido così formato ABCDEFGHIK sarà un prisma. Fig. 200.

5. I poligoni uguali, e paralleli ABCDE, FGHIK si chiamano le *basi del prisma*; gli altri piani parallelogrammi presi insieme costituiscono ciò, che si chiama la *superficie laterale*, o *convessa del prisma*.

6. L'*altezza d' un prisma* è la distanza delle sue basi, o la perpendicolare abbassata da un punto della base superiore sopra il piano della base inferiore.

7. Un *prisma* è *retto* quando i suoi lati AF, BG, ec. son perpendicolari ai piani delle basi; allora ciascuno di questi lati è uguale all' altezza del prisma. In ogni altro caso il prisma è *obliquo*, e l' altezza è minore del lato.

8. Un *prisma* è *triangolare*, *quadrango-*

*lare, pentagono, esagono* ec. secondo che la base è un triangolo, un quadrilatero, un pentagono, un esagono, ec.

Fig. 106. 9. Il prisma, che ha per base un parallelogrammo, ha tutte le sue faccie parallelogramme, e si chiama *parallelepipedo*.

Il *parallelepipedo* è *rettangolo* quando tutte le sue faccie sono rettangoli.

10. Tra i parallelepipedi rettangoli si distingue il *cubo*, o *essaedro regolare* compreso da sei quadrati uguali.

Fig. 196. 11. La *piramide* è il solido, che vien formato quando più piani triangolari, che partono da un medesimo punto S, terminano ad un medesimo piano poligono ABCDE.

Il poligono ABCDE si chiama la *base* della piramide; il punto S n'è il *vertice*, e il complesso dei triangoli ASB, BSC, ec. forma la *superficie convessa o laterale* della piramide.

12. L'*altezza* della piramide è la perpendicolare abbassata dal vertice sul pian della base, prolungato se bisogna.

13. La piramide è *triangolare, quadrangolare* ec. secondo che la base è un triangolo, un quadrilatero, ec

14. Una piramide è *regolare* quando la base è un poligono regolare, e nel tempo stesso la perpendicolare abbassata dal vertice sul pian della base passa per il di lei centro. Questa linea si chiama allora l'*asse* della piramide.

15. *Diagonale* d'un poliedro è la linea congiungente i vertici di due angoli solidi non adjacenti.

16. Chiamerò *poliedri simmetrici* due poliedri, che, avendo una base comune, sono costrutti similmente, uno al di sopra del piano di questa base, l'altro al di sotto, in modo che gli angoli solidi omologhi siano situati ad uguali distanze dal piano della base sopra una medesima retta perpendicolare a questo piano.

Per esempio, se la retta  $ST$  è perpendicolare al piano  $ABC$ , e se nel punto  $O$ , ove incontra questo piano, sia divisa in due parti uguali, le due piramidi  $SABC$ ,  $TABC$ , che hanno la base comune  $ABC$ , saranno due poliedri simmetrici. Fig. 202.

17. Due *piramidi triangolari* son simili quando hanno due faccie rispettivamente simili, similmente poste, ed ugualmente inclinate fra loro.

Così, supponendo gli angoli  $ABC=DEF$ ,  $BAC=EDF$ ,  $ABS=DET$ ,  $BAS=EDT$ , se in oltre l'inclinazione dei piani  $ABS$ ,  $ABC$  è uguale a quella dei loro omologhi  $DTE$ ,  $DEF$ , le piramidi  $SABC$ ,  $TDEF$  saranno simili. Fig. 203.

18. Avendo formato un triangolo con tre angoli presi sopra una medesima faccia, o base d'un poliedro, si può immaginare che i vertici dei differenti angoli solidi del poliedro, situati fuori del piano di questa base, sien quelli d'altrettante piramidi triangolari, che hanno per base comune il triangolo indicato; e ciascuna di queste piramidi determinerà la posizione di ciascun angolo so-

lido del poliedro per rapporto alla base:  
Posto ciò,

Due *poliedri* son *simili* quando, avendo basi simili, i vertici degli angoli solidi omologhi fuori di queste basi sono determinati da piramidi triangolari rispettivamente simili.

19. Chiamerò *vertici* d' un poliedro i punti situati ai vertici dei suoi differenti angoli solidi.

*N. B.* Tutti i poliedri, che noi consideriamo, son poliedri cogli angoli in fuori, o poliedri *convessi*. Chiamiamo così quelli, la cui superficie non può esser incontrata da una linea retta in più di due punti. In questa specie di poliedri il piano d' una faccia prolungato non può tagliare il solido; è dunque impossibile che il poliedro sia in parte al di sopra del pian d' una faccia, in parte al di sotto; esso è tutto da una medesima parte di un tal piano.

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA

*Due poliedri non possono avere i medesimi vertici, ed in numero uguale senza coincidere l' uno coll' altro.*

Poichè, supponiamo uno dei poliedri già costruito; se si vuol costruirne un altro, che abbia i medesimi vertici, ed in numero uguali, bisognerà che i piani di questo non passino tutti per i medesimi vertici, per cui passan nel primo; senza di che non differirebbero l' uno dall' altro. Ma allora è chiaro che alcuni dei nuovi piani taglierebbero il

primo poliedro; vi sarebbero dei vertici al di sopra di questi piani, e dei vertici parimente al di sotto; il che non può convenire a un poliedro convesso: dunque, se due poliedri hanuo i medesimi vertici, ed in numero uguale, debbono necessariamente coincidere l'uno con l'altro.

*Scolio.* Essendo dati di posizione i punti A, B, C, K, ec., che debbon servire di vertici a un poliedro, è facile descrivere il poliedro.

Scegliete prima tre vertici vicini D, E, H Fig. 204. tali, che il piano DEH passi, se ciò ha luogo, per dei nuovi vertici K, C, ma lasci tutti gli altri da una medesima parte, cioè, tutti al di sopra del piano, o tutti al di sotto. Il piano DEH, o DEHKC così determinato sarà una faccia del solido. Per uno de' suoi lati EH conducete un piano, che farete girare finchè incontri un nuovo vertice F, o più insieme F, I; avrete una seconda faccia, che sarà FEH, o FEHI. Continuate così, facendo passare dei piani per i lati trovati finchè il solido sia terminato da tutte le parti; questo solido sarà il poliedro richiesto, perchè non ve ne son due, che possan passare per i medesimi vertici.

## PROPOSIZIONE II.

### TEOREMA

*Due poliedri simmetrici hanno le faccie omologhe rispettivamente uguali; e l'inclinazione di due faccie adjacenti in uno di*

*questi poliedri è uguale all' inclinazione delle faccie omologhe nell' altro.*

Fig. 205. Sia ABCDE la base comune ai due poliedri; siano M, e N i vertici di due angoli solidi qualunque d' uno dei poliedri; M', e N' i vertici omologhi dell' altro poliedro; bisognerà, secondo la definizione, che le rette MM', NN' siano perpendicolari al piano ABC, e siano divise in due parti uguali nei punti m, e n, ove incontrano questo piano. Posto ciò, dico che la distanza MN è uguale a M'N'.

Poichè, se si fa girare il trapezio mM'N'n intorno a mn finchè il suo piano si applichi al piano mMNn, a cagione degli angoli retti in m, ed in n, il lato mM' cadrà sul suo uguale mM, e nN' sopra nN; dunque i due trapezj coincideranno, e si avrà  $MN = M'N'$ .

Sia P un terzo vertice del poliedro superiore, e P' il suo omologo nell' altro; si avrà pure  $MP = M'P'$ , e  $NP = N'P'$ ; dunque il triangolo MNP, che unisce tre vertici qualunque del poliedro superiore è uguale al triangolo M'N'P', che unisce i tre vertici omologhi dell' altro poliedro.

Se tra questi triangoli si consideran soltanto quelli, che son formati alla superficie dei poliedri, si può già conchiudere che le superficie dei due poliedri son composte d' un medesimo numero di triangoli rispettivamente uguali.

Dico adesso che, se alcuni triangoli d' una

superficie sono in un medesimo piano, e formano una medesima faccia poligona, i triangoli omologhi saranno in un medesimo piano sopra l'altra superficie, e formeranno una faccia poligona uguale.

Infatti siano  $MPN$ ,  $NPQ$  due triangoli adjacenti, che si suppongono in uno stesso piano; e siano  $M'P'N'$ ,  $N'P'Q'$  i loro omologhi. Si ha l'angolo  $MNP = M'N'P'$ ; l'angolo  $PNQ = P'N'Q'$ ; e, se si tirano  $MQ$ , e  $M'Q'$ , il triangolo  $MNQ$  sarebbe uguale a  $M'N'Q'$ ; perciò si avrebbe l'angolo  $MNQ = M'N'Q'$ . Ma, poichè  $MPNQ$  è un solo piano, si ha l'angolo  $MNQ = MNP + PNQ$ . Dunque si avrà pure  $M'N'Q' = M'N'P' + P'N'Q'$ . Or, se i tre piani  $M'N'P'$ ,  $P'N'Q'$ ,  $M'N'Q'$  non fossero confusi in un solo, questi tre piani formerebbero un angolo solido, e si avrebbe \*  $20, 5.$  l'angolo  $M'N'Q' < M'N'P' + P'N'Q'$ . Dunque, poichè questa condizione non ha luogo, i due triangoli  $M'N'P'$ ,  $P'N'Q'$  sono in un medesimo piano.

Segue da ciò che ciascuna faccia, o triangolare, o poligona, d'un poliedro corrisponde a una faccia uguale nell'altro, e che perciò i due poliedri son compresi da un medesimo numero di piani rispettivamente uguali.

Resta a provare che l'inclinazione di due faccie adjacenti qualunque in uno dei poliedri è uguale all'inclinazione delle due faccie omologhe nell'altro.

Siano  $MPN$ ,  $NPQ$  due triangoli formati

sulla costola comune NP nei piani di due faccie adjacenti; siano  $M'P'N'$ ,  $N'P'Q'$  i loro omologhi: si può concepire in N un angolo solido formato dai tre angoli piani MNQ, MNP, PNQ, e in N' un angolo solido formato dai tre  $M'N'Q'$ ,  $M'NP'$ ,  $P'N'Q'$ . Ora abbiain già provato che questi angoli piani son rispettivamente uguali; dunque l'inclinazione dei due piani MNP, PNQ è uguale a quella dei loro omologhi  $M'NP'$ ,  $P'N'Q'$  \*.

Dunque nei poliedri simmetrici le faccie son rispettivamente uguali, e i piani di due faccie qualunque adjacenti in uno dei solidi hanno tra loro la medesima inclinazione che i piani di due faccie omologhe nell'altro solido.

*Scolio.* Si può osservare che gli angoli solidi di un poliedro son simmetrici rispetto agli angoli solidi dell'altro poliedro: poichè, se l'angolo solido N è formato dai piani MNP, PNQ, QNR, ec., il suo omologo N' è formato dai piani  $M'NP'$ ,  $P'N'Q'$ ,  $Q'N'R'$ , ec.; e questi sono disposti nel medesim'ordin degli altri. Ma, siccome i due angoli solidi sono in una situazione inversa l'uno per rapporto all'altro, ne segue che la disposizione reale dei piani, che formano l'angolo solido N', è l'inversa di quella, che ha luogo nell'angolo omologo N. D'altronde le inclinazioni dei piani consecutivi sono uguali nell'uno, e nell'altro angolo solido. Dunque gli angoli solidi son simmetrici l'uno coll'altro. Vedete lo scolio della proposizione XXIII. Lib. V.



Quest'osservazione prova che un poliedro qualunque non può avere che un solo poliedro *simmetrico*. Poichè, se si costruisse sopra un'altra base un nuovo poliedro *simmetrico* col poliedro dato, gli angoli solidi di questo sarebbero sempre *simmetrici* cogli angoli del poliedro dato. Dunque sarebbero uguali a quelli del poliedro *simmetrico* costruito sulla prima base. D'altronde le faccie omologhe sarebbero sempre uguali. Dunque i poliedri *simmetrici* costrutti sopra una base, o sopra un'altra avrebbero le faccie uguali, e gli angoli solidi uguali; dunque coinciderebbero mediante la sovrapposizione, e formerebbero un solo, e medesimo poliedro.

## PROPOSIZIONE III.

## T E O R E M A

*Due prismi sono uguali allorchè hanno un angolo solido compreso fra tre piani rispettivamente uguali, e similmente posti.*

Sia la base ABCDE uguale alla base *abcde*, Fig. 200. il parallelogrammo ABGF uguale al parallelogrammo *abgf*, e il parallelogrammo BCHG uguale al parallelogrammo *bchg*; dico che il prisma ABCI sarà uguale al prisma *abci*.

Poichè, sia situata la base ABCDE sulla sua uguale *abcde*, queste due basi coinciderranno; ma i tre angoli piani, che formano l'angolo solido B, sono rispettivamente uguali ai tre angoli piani, che formano l'angolo solido *b*, cioè,  $ABC = abc$ ,  $ABG = abg$ , e  $GBC = gbc$ ; di più questi angoli son simil-

mente posti; dunque gli angoli solidi  $B$ , e  $b$  sono uguali, e per conseguenza il lato  $BG$  cadrà sul suo uguale  $bg$ . Si vede pure che, a cagione dei parallelogrammi uguali  $ABGF$ ,  $abgf$ , il lato  $GF$  cadrà sul suo uguale  $gf$ , e similmente  $GH$  sopra  $gh$ ; dunque la base superiore  $FGHIK$  coinciderà interamente colla sua uguale  $fghik$ , ed i due solidi saranno confusi in un solo, poichè avranno i medesimi vertici \*. Dunque due prismi sono uguali ec.

*Corollario, Due prismi retti, che hanno basi eguali, ed altezze eguali, sono eguali.* Perchè avendo il lato  $AB$  eguale ad  $ab$ , e l'altezza  $BG$  eguale a  $bg$ , il rettangolo  $ABGF$  sarà eguale al rettangolo  $abgf$ ; sarà lo stesso dei rettangoli  $BGFC$ ,  $bgfc$ ; e così i tre piani, che forman l'angolo  $B$ , son uguali ai tre, che forman l'angolo solido  $b$ . Dunque i due prismi sono eguali.

#### PROPOSIZIONE IV.

##### TEOREMA

*In ogni parallelepipedo i piani opposti sono uguali, e paralleli.*

Fig 206. Poichè, secondo la definizione di questo solido, le basi  $ABCD$ ,  $EFGH$  son parallelogrammi uguali, e i loro lati son paralleli; resta dunque a dimostrare che la medesima cosa ha luogo per due faccie laterali opposte, come  $AEHD$ ,  $BFGC$ . Ora  $AD$  è uguale, e parallela ad  $AB$ , giacchè la figura  $ABCD$  è un parallelogrammo; per una simil ragio-

ne  $AE$  è uguale, e parallela a  $BF$ : dunque l'angolo  $DAE$  è uguale all'angolo  $CBF$  \*, \* 13, 5. e il piano  $DAE$  parallelo a  $CBF$ . Dunque anche il parallelogrammo  $DAEH$  è uguale al parallelogrammo  $CBFG$ . Si dimostrerà del pari che i parallelogrammi  $ABFE$ ,  $DCGH$  sono uguali, e paralleli.

*Corollario.* Poichè il parallelepipedo è un solido compreso da sei piani, di cui gli opposti sono uguali, e paralleli, ne segue che una faccia qualunque, e la sua opposta possono esser prese per le basi del parallelepipedo.

*Scolio.* Essendo date tre rette  $AB$ ,  $AE$ ,  $AD$ , che passino per un medesimo punto  $A$ , e faccian fra loro degli angoli dati, si può su queste tre rette costruire un parallelepipedo  $AG$ : a tal effetto bisogna condurre dall'estremità di ciascuna retta un piano parallelo al piano dell'altre due, cioè, per il punto  $B$  un piano parallelo a  $DAE$ , per il punto  $D$  un piano parallelo a  $BAE$ , e per il punto  $E$  un piano parallelo a  $BAD$ . Gli incontri scambievoli di questi piani formeranno il parallelepipedo richiesto.

## PROPOSIZIONE V.

### TEOREMA

*In ogni parallelepipedo gli angoli solidi opposti son simmetrici, e le diagonali condotte dai vertici di questi angoli si tagliano scambievolmente in due parti uguali.*

Paragoniamo, per esempio, l'angolo soli- Fig. 106.

do  $A$  al suo opposto  $G$ ; l'angolo  $EAB$  uguale ad  $EFB$  è pure uguale a  $HGC$ , l'angolo  $DAE=DHE=CGF$ , e l'angolo  $DAB=DCB=HGF$ . Dunque i tre angoli piani, che formano l'angolo solido  $A$ , sono rispettivamente uguali ai tre, che formano l'angolo solido  $G$ . Ma, siccome sono disposti differentemente nei due angoli solidi, ne segue 1.° che questi due angoli  $A$ , e  $G$  sono  
 \* 23, 5. simmetrici l'uno coll'altro \*.

In secondo luogo immaginiamo due diagonali qualunque  $EC$ ,  $AG$  con lotte da dei vertici opposti: poichè  $AE$  è uguale, e parallela a  $CG$ , la figura  $AEGC$  è un parallelogrammo; dunque le diagonali  $EC$ ,  $AG$  si taglieranno scambievolmente in due parti uguali. Si dimostrerà ancora che la diagonale  $EC$ , ed un'altra  $DF$  si taglieranno pure in due parti uguali: dunque 2.° le quattro diagonali si taglieranno scambievolmente in due parti uguali in un medesimo punto, che si può riguardare come il centro del parallelepipedo.

### PROPOSIZIONE VI.

#### TEOREMA

Fig. 227. *Il piano  $BDHF$ , che passa per due costole parallele opposte  $BF$ ,  $DH$ , divide il parallelepipedo  $AG$  in due prismi triangolari  $ABDHEF$ ,  $GHFBCD$  simmetrici l'uno coll'altro.*

In primo luogo questi due solidi son prismi, perchè i triangoli  $ABD$ ,  $EFH$ , avendo i loro lati uguali, e paralleli, sono uguali,

e nel tempo stesso le faccie laterali  $ABFE$ ,  $ADHE$ ,  $BDHF$  son parallelogrammi; dunque il solido  $ABDHEF$  è un prisma: lo stesso è del solido  $GHFBCD$ . Dico adesso che questi due prismi son simmetrici l'uno dell'altro.

Sulla base  $ABD$  fate il prisma  $ABDE'F'H'$ , che sia simmetrico col prisma  $ABDEFH$ . Secondo, ciò ch'è stato già dimostrato \*, il \* 2. piano  $ABF'E'$  è uguale ad  $ABFE$ , ed il piano  $ADH'E'$  è uguale ad  $ADHE$ : ma, se si paragona il prisma  $GHFBCD$  al prisma  $ABDH'E'F'$ , la base  $GHF$  è uguale ad  $ABD$ , il parallelogrammo  $GHDC$ , che è uguale ad  $ABFE$ , è pure uguale ad  $ABF'E'$ , e il parallelogrammo  $GFBC$ , che è uguale ad  $ADHE$ , è eguale ancora ad  $ADH'E'$ . Dunque i tre piani, che forman l'angolo solido  $G$  nel prisma  $GHFBCD$ , son rispettivamente uguali ai tre piani, che forman l'angolo solido  $A$  nel prisma  $ABDH'E'F'$ : d'altronde son disposti similmente; dunque questi due prismi sono uguali, \* e potrebbero \* 3. esser sovrapposti. Ma uno di essi  $ABDH'E'F'$  è simmetrico col prisma  $ABDHEF$ ; dunque l'altro  $GHFBCD$  è pure simmetrico con  $ABDHEF$ .

### PROPOSIZIONE VII.

#### L E M M A

*In qualunque prisma  $ABCI$  le sezioni  $NOPQR$ ,  $STUXY$ , fatte da dei piani paralleli, son poligoni eguali.* Fig. 201.

Poichè i lati  $NO$ ,  $ST$  son paralleli, essendo le intersezioni di due piani paralleli con

un terzo piano  $ABGF$ , e questi medesimi lati  $NO$ ,  $ST$  son compresi tra le parallele  $NS$ ,  $OT$ , che son lati del prisma; dunque  $NO$  è uguale a  $ST$ . Per una simil ragione, i lati  $OP$ ,  $PQ$ ,  $QR$ , ec. della sezione  $NOPQR$  son rispettivamente eguali ai lati  $TV$ ,  $VX$ ,  $XY$ , ec. della sezione  $STVXY$ . D'altronde i lati eguali sono nel medesimo tempo paralleli; dal che ne segue che gli angoli  $NOP$ ,  $OPQ$ , ec. della prima sezione son rispettivamente eguali agli angoli  $STV$ ,  $TVX$ , ec. della seconda. Dunque le due sezioni  $NOPQR$ ,  $STVXY$  son poligoni eguali.

*Corollario.* Ogni sezione, fatta in un prisma parallelamente alla sua base, è eguale alla detta base.

### PROPOSIZIONE VIII.

#### TEOREMA

*Fig. 208.* *Idue prismi triangolarisimmetrici*  $ABDHEF$ ,  $BCDFGH$ , *nei quali si decompone il parallelepipedo*  $AG$ , *sono equivalenti tra loro.*

Per i vertici  $B$ , e  $F$  conducete perpendicolarmente al lato  $BF$  i piani  $Badc$ ,  $Fehg$ , che incontreranno da una parte in  $a$ ,  $d$ ,  $c$ , dall'altra in  $e$ ,  $h$ ,  $g$  i tre altri  $AE$ ,  $DH$ ,  $CG$  dello stesso parallelepipedo; le sezioni  $Badc$ ,  $Fehg$  saranno parallelogrammi eguali. Queste sezioni sono eguali perchè son fatte da piani perpendicolari ad una medesima retta, e per conseguenza paralleli \*; son parallelogrammi perchè due lati opposti d'una medesima sezione  $aB$ ,  $dc$  son le in-

\* 7.

tersezioni de' due piani paralleli  $ABFE$ ,  $DCGH$  fatte da un medesimo piano.

Per una simil ragione, la figura  $BaeF$  è un parallelogrammo, come pure le altre faccie laterali  $BFgc$ ,  $cdhg$ , ec. del solido  $Badcfehg$ : dunque questo solido è un prisma \*, e que- \* Def. 4.  
sto prisma è retto, poichè il lato  $BF$  è perpendicolare al pian della base.

Ciò posto, se per il piano  $BFHD$  si divida il prisma retto  $Bh$  in due prismi triangolari retti  $aBdeFh$ ,  $BdcFhg$ , dico che il prisma triangolare obliquo  $ABDEFH$  sarà equivalente al prisma triangolare retto  $aBdeFh$ .

Infatti questi due prismi avendo una parte comune  $ABDheF$ , basterà provare che le parti rimanenti, cioè i solidi  $BaADd$ ,  $FeEHh$ , sono equivalenti tra loro.

Ora, a causa dei parallelogrammi  $ABFE$ ,  $aBFe$ , i lati  $AE$ ,  $ae$ , eguali al lor parallelo  $BF$ , sono eguali tra loro; così togliendone la parte comune  $Ae$ , resterà  $Aa = Ee$ . Proverebbesi parimente che  $Dd = Hh$ .

Adesso, per operar la sovrapposizione de' due solidi  $BaADd$ ,  $FeEHh$ , ponghiamo la base  $Feh$  sopra la sua eguale  $Bad$ ; allora il punto  $e$  cadendo in  $a$ , ed il punto  $h$  in  $d$ , i lati  $eE$ ,  $hH$  cadranno sopra i loro eguali  $aA$ ,  $dD$ , poichè essi son perpendicolari al medesimo piano  $Bad$ . Dunque i due solidi, di cui si tratta, coincideranno interamente l'uno con l'altro; dunque il prisma obliquo  $BADFEH$  è equivalente al prisma retto  $BadFeh$ .

Si dimostrerà similmente che il prisma obliquo  $BDUFHG$  è equivalente al prisma retto  $BdcFhg$ . Ma i due prismi retti  $BadFeh$ ,  $BdcFhg$  son eguali tra loro, poichè hanno la medesima altezza  $BF$ , e le loro basi  $Bad$ ,  $Bdc$  son metà d'un medesimo parallelogrammo \*. Dunque i due prismi triangolari  $BADFEH$ ,  $BDCFHG$  equivalenti a dei prismi eguali sono equivalenti tra loro.

\* 2, 3.  
Cor. 1.

*Coroll.* Ogni prisma triangolare  $ABDHEF$  è la metà del parallelepipedo  $AG$  costruito sul medesimo angolo solido  $A$  con le medesime costole, o spigoli  $AB$ ,  $AD$ ,  $AE$ .

## PROPOSIZIONE IX.

### TEOREMA

Fig. 209. *Se due parallelepipedi  $AG$ ,  $AL$  hanno la base comune  $ABCD$ , e se le lor basi superiori  $EFGH$ ,  $IKLM$  sono comprese in un medesimo piano, e tra le medesime parallele  $EK$ ,  $HL$ , questi due parallelepipedi saranno equivalenti fra loro.*

Possono accadere tre casi, secondo che  $EI$  è maggiore, minore, o eguale a  $EF$ ; ma la dimostrazione è la stessa per tutti. E in primo luogo dico che il prisma triangolare  $AEIDHM$  è uguale al prisma triangolare  $BFKCGL$ .

Infatti, poichè  $AE$  è parallela a  $BF$ , e  $HE$  a  $GF$ , l'angolo  $AEI = BFK$ ,  $HEI = GFK$ , e  $HEA = GFB$ . Di questi sei angoli i primi tre formano l'angolo solido  $E$ , gli altri tre



formano l'angolo solido F; dunque, poichè gli angoli piani son rispettivamente eguali, e similmente disposti, ne segue che gli angoli solidi E, ed F sono eguali. Adesso, se si pone il prisma AEM sul prisma BFL, e prima la base AEI sulla base BIK, queste due basi essendo uguali coincideranno; e, poichè l'angolo solido E è uguale all'angolo solido F, il lato EH cadrà sul suo uguale FG. Non bisogna altro di più per provare che i due prismi coincideranno in tutta la loro estensione; perchè la base AEI, e la costola EH determinano il prisma AEM, come la base BFK, e la costola FG determinano il prisma BFL \*. Dunque questi due \* 3. prismi son uguali.

Ma, se dal solido AL si toglie il prisma AEM, resterà il parallelepipedo AIL; e, se dallo stesso solido AL si toglie il prisma BFL, resterà il parallelepipedo AEG. Dunque i due parallelepipedi AIL, AEG sono equivalenti fra loro.

### PROPOSIZIONE X.

#### TEOREMA

*Due parallelepipedi della medesima base, e della medesima altezza sono equivalenti fra loro.*

Sia ABCD la base comune ai due para- Fig. 210.  
llepipedi AG, AL; poichè hanno la medesima altezza, le loro basi superiori EFGH, IKLM saranno nel medesimo piano. Di più i lati EF, ed AB sono uguali, e paralleli,

come pure  $IK$ , ed  $AB$ ; dunque  $EF$  è uguale, e parallela ad  $IK$ : per una simil ragione  $GF$  è uguale, e parallela a  $LK$ . Siano prolungati i lati  $EF$ ,  $HG$ , ed ancora  $LK$ ,  $IM$ , finchè gli uni, e gli altri formino colle loro intersezioni il parallelogrammo  $NOPQ$ ; è chiaro che questo parallelogrammo sarà uguale a ciascuna delle basi  $EFGH$ ,  $IKLM$ . Ora, se s'immagina un terzo parallelepipedo, che colla medesima base inferiore  $ABCD$  abbia per base superiore  $NOPQ$ , questo terzo parallelepipedo sarebbe equivalente al parallelepipedo  $AG$  \*, poichè, avendo la stessa base inferiore, le basi superiori son situate in un medesimo piano, e fra le parallele  $GQ$ ,  $FN$ . Per la medesima ragione, questo terzo parallelepipedo sarebbe equivalente al parallelepipedo  $AL$ . Dunque i due parallelepipedi  $AG$ ,  $AL$ , che hanno la medesima base, e la medesima altezza, sono equivalenti fra loro.

\* 7.

## PROPOSIZIONE XI.

## T E O R E M A

*Ogni parallelepipedo può esser cangiato in un parallelepipedo rettangolo equivalente, che avrà la medesima altezza, e una base equivalente.*

Fig. 210. Sia  $AG$  il parallelepipedo proposto: dai punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  conducete  $AI$ ,  $BK$ ,  $CL$ ,  $DM$  perpendicolari al pian della base; formerete così il parallelepipedo  $AL$  equivalente al parallelepipedo  $AG$ , le di cui faccie

lateralì  $AK$ ,  $BL$ , ec. saranno rettangoli. Se dunque la base  $ABCD$  è un rettangolo,  $AL$  sarà il parallelepipedo rettangolo equivalente al parallelepipedo proposto  $AG$ . Ma, se  $ABCD$  non è un rettangolo, conducete  $AO$ , e  $BN$  perpendicolari sopra  $CD$ , dipoi  $OQ$ , e  $NP$  perpendicolari sopra la base; avrete il solido  $ABNOIKPQ$ , che sarà un parallelepipedo rettangolo. Infatti, per costruzione, la base  $ABON$ , e la sua opposta  $IKPQ$  sono rettangoli; le faccie laterali sono pur tali, poichè le costole  $AI$ ,  $OQ$ , ec. son perpendicolari al pian della base: dunque il solido  $AP$  è un parallelepipedo rettangolo. Ma i due parallelepipedi  $AP$ ,  $AL$  possono considerarsi come costrutti sulla medesima base  $ABKI$ , e colla medesima altezza  $AO$ ; dunque sono equivalenti: dunque il parallelepipedo  $AG$ , ch' era stato prima cangiato in un parallelepipedo equivalente  $AL$ , si trova di nuovo cangiato in un parallelepipedo rettangolo equivalente  $AP$ , che ha la medesima altezza  $AI$ , e la di cui base  $ABNO$  è equivalente alla base  $ABCD$ .

Fig. 210.  
C 211.

## PROPOSIZIONE XII.

## TEOREMA

*Due parallelepipedi rettangoli  $AG$ ,  $AL$ , che hanno la medesima base  $ABCD$ , stanno fra loro come le loro altezze  $AE$ ,  $AI$ .*

Supponiamo primieramente che le altezze  $AE$ ,  $AI$  stiano fra loro come dei numeri interi, per esempio, come 15 stà a 8. Si divi-

derà AE in 15 parti uguali, di cui AI ne conterrà 8; e per i punti di divisione  $x, y, z$ , ec. si condurranno dei piani paralleli alla base. Questi piani divideranno il solido AG in 15 parallelepipedì parziali, che saranno tutti uguali fra loro, perchè avranno basi uguali, ed altezze uguali; basi uguali perchè ogni sezione, come MIKL, fatta in un prisma parallelamente alla sua base ABCD, è eguale a questa base \*; altezze uguali perchè queste altezze sono le divisioni stesse Ax, xy, yz, ec. Ora di questi 15 parallelepipedì 8 son contenuti in AL; dunque il solido AG stà al solido AL come 15 stà a 8, o in generale come l'altezza AE stà all'altezza AI.

In secondo luogo, se il rapporto d'AE ad AI non può esprimersi in numeri, dico che sarà ugualmente *solid. AG : solid. AL :: AE : AI*. Poichè, se que ta proporzion non ha luogo, supponiamo che si abbia *sol. AG : sol. AL :: AE : AO*. Dividete AE in parti uguali, di cui ciascuna sia minore di OI; vi sarà almeno un punto di divisione  $m$  fra O, ed I. Sia P il parallelepipedo, che ha per base ABCD, e per altezza Am; poichè le altezze AE, Am stanno fra loro come due numeri interi, si avrà *sol. AG : P :: AE : Am*. Ma si ha, per ipotesi, *sol. AG : sol. AL :: AE : AO*; da ciò resulta *sol. AL : P :: AO : Am*. Ma AO è maggiore di Am; dunque bisognerebbe, perchè la proporzione avesse luogo, che il solido AL fosse mag-

giore di P; ora al contrario è minore: dunque è impossibile che il quarto termine della proporzione *sol.*  $AG : sol. AI :: AE : X$  sia una linea AO maggiore di AI. Con un ragionamento simile si dimostrerebbe che il quarto termine non può esser minore di AI; dunque è uguale ad AI. Dunque i parallelepipedi rettaugoli della medesima base stanno fra loro come le loro altezze.

### PROPOSIZIONE XIII.

#### TEOREMA

*Due parallelepipedi rettangoli AG, AK, Fig. 213. che hanno la medesima altezza AE, stanno fra loro come le basi ABCD, AMNO.*

Avendo situato i due solidi uno accanto dell' altro, come la figura gli rappresenta, prolungate il piano ONKL finchè incontri il piano DCGH in PQ; avrete un terzo parallelepipedo AQ, che si potrà paragonare a ciascuno dei parallelepipedi AG, AK. I due solidi AG, AQ, avendo la medesima base AEHD, stanno fra loro come le rispettive altezze AB, AO; parimente i due solidi AQ, AK, avendo la medesima base AOLE, stanno fra loro come le loro altezze AD, AM. Perciò si avranno le due proporzioni

$$sol. AG : sol. AQ :: AB : AO,$$

$$sol. AQ : sol. AK :: AD : AM.$$

Moltiplicando per ordine queste due proporzioni, ed omettendo nel risultato il moltiplicatore comune *sol.* AQ, si avrà

$$sol. AG : sol. AK :: AB \times AD : AO \times AM.$$

Ma  $AB \times AD$  rappresenta la base  $ABCD$ , e  $AO \times AM$  rappresenta la base  $AMNO$ ; dunque due parallelepipedi rettangoli della medesima altezza stanno fra loro come le basi.

### PROPOSIZIONE XIV.

#### TEOREMA

*Due parallelepipedi rettangoli qualunque stanno fra loro come i prodotti delle lor basi per le loro altezze, o come i prodotti delle loro tre dimensioni.*

Fig. 213. Poichè, avendo situato i due solidi  $AG$ ,  $AZ$  in maniera che le lor superficie abbiano un angolo comune  $BAE$ , prolungate i piani necessarj per formare il terzo parallelepipedo  $AK$  della medesima altezza col parallelepipedo  $AG$ . Si avrà, per la proposizion precedente,

$$\text{sol. } AG : \text{sol. } AK :: ABCD : AMNO.$$

Ma i due parallelepipedi  $AK$ ,  $AZ$ , che hanno la medesima base  $AMNO$ , stanno fra loro come le loro altezze  $AE$ ,  $AX$ , onde si ha

$$\text{sol. } AK : \text{sol. } AZ :: AE : AX.$$

Moltiplicando per ordine queste due proporzioni, ed omettendo nel resultato il moltiplicatore comune  $\text{sol. } AK$ , si avrà

$$\text{sol. } AG : \text{sol. } AZ :: ABCD \times AE : AMNO \times AX.$$

In vece di  $ABCD$ , ed  $AMNO$  si può mettere  $AB \times AD$ , ed  $AO \times AM$ , il che darà

$$\text{sol. } AG : \text{sol. } AZ :: AB \times AD \times AE : AO \times AM \times AX.$$

Dunque due parallelepipedi rettangoli qualunque stanno fra loro ec.

*Scolio.* Da ciò segue che si può prendere per misura d'un parallelepipedo rettangolo il prodotto della sua base per la sua altezza, o il prodotto delle sue tre dimensioni. Su questo principio valuteremo tutti gli altri solidi.

Per l'intelligenza di questa misura bisogna rammentarsi che s'intende per prodotto di due, o di più linee il prodotto dei numeri, che rappresentano tali linee; e questi numeri dipendono dall'unità lineare, che si può prendere a piacimento. Posto ciò, il prodotto delle tre dimensioni d'un parallelepipedo è un numero, che non significa niente in se stesso, e che sarebbe differente se si fosse presa un'altra unità lineare. Ma, se si moltiplicano parimente le tre dimensioni d'un altro parallelepipedo, valutandole sulla medesima unità lineare, i due prodotti staranno fra di loro come i solidi, e daranno l'idea della loro grandezza relativa.

La grandezza d'un solido, il suo volume, o la sua estensione costituiscono ciò, che si chiama la sua *solidità*; e la parola *solidità* è impiegata particolarmente per indicare la misura d'un solido. Così si dice che la solidità d'un parallelepipedo rettangolo è uguale al prodotto della sua base per la sua altezza, o al prodotto delle sue tre dimensioni.

Essendo le tre dimensioni del cubo uguali fra loro, se il lato è 1, la solidità sarà  $1 \times 1 \times 1$ , ossia 1; se il lato è 2, la solidità sarà  $2 \times 2 \times 2$ , ovvero 8; se il lato è 3, la solidità sarà

$3 \times 3 \times 3$ , ossia 27, e così in seguito: perciò, essendo i lati dei cubi come i numeri 1, 2, 3, ec., i cubi stessi, o le loro solidità stanno come i numeri 1, 8, 27, ec. Quindi è che in Aritmetica si chiama *cubo* d'un numero il prodotto, che risulta da tre fattori uguali a questo numero.

Se si proponesse di fare un cubo doppio d'un cubo dato, bisognerebbe che il lato del cubo cercato fosse al lato del cubo dato come la radice cuba di 2 è all'unità. Ora si trova facilmente con una costruzione geometrica la radice quadrata di 2, ma non si può trovare ugualmente la sua radice cubica, almeno colle operazioni della Geometria elementare, le quali consistono in impiegare solamente linee rette, di cui si conoscan due punti, e circoli, di cui siano determinati i centri, ed i raggi.

Per motivo di questa difficoltà il problema della *duplicazione del cubo* è stato celebre fra gli antichi Geometri, come quello della *trisezione dell'angolo*, che è presso a poco del medesim' ordine. Ma si conoscono fin da gran tempo le soluzioni, delle quali queste specie di problemi son suscettibili; e benchè meno semplici delle costruzioni della Geometria elementare, non son per altro meno esatte, nè men rigorose.



## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA

*La solidità d'un parallelepipedo, ed in generale la solidità d'un prisma qualunque è uguale al prodotto della sua base per la sua altezza.*

Poichè 1.<sup>o</sup> un parallelepipedo qualunque è equivalente a un parallelepipedo rettangolo della medesima altezza, e di base equivalente \*. Ora la solidità di questo è uguale \* 11. alla sua base moltiplicata per la sua altezza; dunque la solidità del primo è parimente uguale al prodotto della sua base per la sua altezza.

2.<sup>o</sup> Ogni prisma triangolare è la metà d'un parallelepipedo della medesima altezza, e di base doppia \*. Ora la solidità di questo è \* 3. uguale alla sua base moltiplicata per la sua altezza; dunque quella del prisma triangolare è uguale al prodotto della sua base, metà di quella del parallelepipedo, moltiplicata per la sua altezza.

3.<sup>o</sup> Un prisma qualunque può esser diviso in tanti prismi triangolari della medesima altezza quanti triangoli si posson formare nel poligono, che gli serve di base. Ma la solidità d'ogni prisma triangolare è uguale alla sua base moltiplicata per la sua altezza; e, poichè l'altezza è la medesima per tutti, ne segue che la somma di tutti i prismi parziali sarà uguale alla somma dell'area di tutti i triangoli, che servon loro di basi, mol-

tiplicata per l'altezza comune. Dunque la solidità d'un prisma poligono qualunque è uguale al prodotto della sua base per la sua altezza.

*Corollario.* Se si paragonan due prismi, che abbiano la medesima altezza, i prodotti delle basi per le altezze staranno come le basi. Dunque *due prismi della medesima altezza stanno fra loro come le loro basi*; per una simil ragione, *due prismi della medesima base stanno fra loro come le loro altezze*.

### PROPOSIZIONE XVI.

#### TEOREMA.

Fig 214. *Se una piramide SABCDE è tagliata da un piano abd parallelo alla base,*

1.° *I lati SA, SB, SC, ec., e l'altezza SO saranno tagliati proporzionalmente in a, b, c, ec., ed o;*

2.° *La sezione abcde sarà un poligono simile alla base ABCDE.*

Poichè 1.° essendo paralleli i piani ABD, abd, le loro intersezioni AB, ab con un terzo piano SAB saranno altresì parallele\*; dunque i triangoli SAB, sab son simili, e si ha la proporzione SA : Sa :: SB : Sb; si avrebbe pure SB : Sb :: SC : Sc; e così in seguito. Dunque tutti i lati SA, SB, SC, ec. sono tagliati proporzionalmente in a, b, c, ec. L'altezza SO è tagliata nella proporzione medesima al punto o, perchè BO, e bo son parallele, e però si ha SO : So :: SB : Sb.

\* 10, 5.

2.° Perchè  $ab$  è parallela ad  $AB$ ,  $bc$  a  $BC$ ,  $cd$  a  $CD$ , ec., l'angolo  $abc = ABC$ , l'angolo  $bcd = BCD$ , e così in seguito. Di più, a cagione dei triangoli simili  $SAB$ ,  $Sab$ , si ha  $AB : ab :: SB : Sb$ ; ed, a cagione dei triangoli simili  $SBC$ ,  $Sbc$ , si ha  $SB : Sb :: BC : bc$ ; dunque  $AB : ab :: BC : bc$ : si avrebbe pure  $BC : bc :: CD : cd$ , e così in seguito. Dunque i poligoni  $abcde$ ,  $ABCDE$  hanno gli angoli uguali, e i lati omologhi proporzionali; dunque son simili.

*Corollario.* Siano  $SABCDE$ ,  $SXYZ$  due piramidi, il cui vertice è comune, e le cui basi sono sopra un medesimo piano, talmente che hanno la medesima altezza: se si tagliano con un piano parallelo al pian delle basi, sia  $abcde$  la sezione fatta in una piramide,  $xyz$  la sezione fatta nell'altra; dico che le sezioni  $abcde$ ,  $xyz$  staranno fra loro come le basi  $ABCDE$ ,  $XYZ$ .

Poichè, essendo simili i poligoni  $ABCDE$ ,  $abcde$ , le loro superficie stanno come i quadrati dei lati omologhi  $AB$ ,  $ab$ ; ma  $AB : ab :: SA : Sa$ ; dunque  $ABCDE : abcde :: SA^2 : Sa^2$ . Per la medesima ragione,  $XYZ : xyz :: SX^2 : Sx^2$ . Ma, poichè  $abcxyz$  è un solo piano, si ha pure  $SA : Sa :: SX : Sx$ ; dunque  $ABCDE : abcde :: XYZ : xyz$ . Dunque le sezioni  $abcde$ ,  $xyz$  stanno fra loro come le basi  $ABCDE$ ,  $XYZ$ .

## PROPOSIZIONE XVII.

## LEMMA

**Fig. 215.** Sia  $SABC$  una piramide triangolare, di cui  $S$  è il vertice, ed  $ABC$  la base; se si dividono i lati  $SA, SB, SC, AB, AC, BC$  in due parti eguali nei punti  $D, E, F, G, H, I$ , e che per questi punti si tirino le linee rette  $DE, EF, DF, EG, FH, EI, GH$ ; dico che si potrà considerar la piramide  $SABC$  come composta di due prismi  $AGHFDE, EGICFH$  equivalenti tra loro, e di due piramidi eguali  $SDEF, EGBI$ .

In conseguenza della costruzione  $ED$  è parallela a  $BA$ , e  $GE$  ad  $AS$ ; dunque la figura  $ADEG$  è un parallelogrammo. La figura  $ADFH$  lo è pure per la stessa ragione; dunque le tre rette  $AB, GE, HF$  sono eguali, e parallele; dunque il solido  $AGHFDE$  è

\* 14, 5. un prisma \*.

Si proverà similmente che le due figure  $EFCI, CIGH$  son parallelogrammi, e le tre rette  $EF, CI, GH$  son pur parallele, ed eguali; dunque il solido  $EGICFH$  è parimente un prisma. Dico adesso che questi due prismi triangolari sono equivalenti fra loro.

In effetto, se sopra le costole  $GI, GE, GH$  si forma il parallelepipedo  $GX$ , il prisma triangolare  $GEICFH$  sarà la metà di questo parallelepipedo \*; d'altronde il prisma  $AGHFDE$  è eguale pure alla metà del parallelepipedo  $GX$  \*, perchè hanno la mede-

\* 6.

\* 12.

sima altezza, e perchè il triangolo AGH, base del prisma, è metà del parallelogrammo GICH\*, base del parallelepipedo. Dunque i due prismi EGICFH, AGHFDE sono equivalenti fra loro. \* 2, 3.

Questi due prismi essendo tolti dalla piramide SABC, non restano che le due piramidi SDEF, EGBI: dico adesso che queste due piramidi sono eguali tra loro.

Infatti, a motivo dei lati eguali, cioè,  $BE = SE$ ,  $BG = AG = DE$ ,  $EG = AD = SD$ , il triangolo BEG è eguale al triangolo ESD. Per una simil ragione, il triangolo BEI è eguale al triangolo SEF; d'altronde l'inclinazione scambievolmente dei due piani BEG, BEI è la medesima di quella dei due piani ESD, SEF, poichè BEG non fa che un sol piano con ESD, come pure BEI con SEF. Dunque, se per eseguir la sovrapposizione delle due piramidi SDEF, EGBI si pone il triangolo EBG sopra il suo eguale SDE, bisognerà che il piano BEI cada sopra il piano SEF; e, poichè i triangoli EBI, SEF sono eguali, e similmente posti, il punto I cadrà in F, e le due piramidi SDEF, EGBI coincideranno perfettamente.

Dunque la piramide intera SABC è composta di due prismi triangolari AGF, GIF equivalenti fra loro, e di due piramidi eguali SDEF, EGBI.

*Corollario I.* Dal vertice S sia abbassata SO perpendicolare sopra il piano ABC; e sia P il punto ove questa perpendicolare incon-

- \* 16. tra il piano DEF parallelo ad ABC. Poichè  $SD = \frac{1}{2}SA$ , si avrà  $SP = \frac{1}{2}SO$  \*, ed il triangolo  $DEF = \frac{1}{4}ABC$ : dunque la solidità del prisma  $AGHFDE = \frac{1}{4}ABC \times \frac{1}{2}SO$ , e quella dei due prismi riuniti  $AGHFDE$ ,  $EGICFH = \frac{1}{4}ABC \times SO$ . Questi due prismi sono minori della piramide  $SABC$ , poichè vi son contenuti; dunque *la solidità d'una piramide triangolare è più grande che il quarto del prodotto della sua base per la sua altezza.*

*Corollario II.* Se si conducono le rette  $DG$ ,  $DH$ , si avrà una nuova piramide  $ADGH$ , che sarà eguale alla piramide  $SDEF$ ; perchè si può porre la base  $DEF$  sopra la sua eguale  $AGH$ ; ed allora gli angoli  $SDE$ ,  $SDF$ , essendo eguali agli angoli  $DAG$ ,  $DAH$  è visibile che  $DS$  cadrà sopra  $AD$  \*, ed il vertice  $S$  sopra il vertice  $D$ . Ora la piramide  $ADGH$  è minore del prisma  $AGHDEF$ , poichè v'è contenuta; dunque ciascuna delle piramidi  $SDEF$ ,  $EGBI$  è minore del prisma  $AGHDEF$ ; dunque la piramide  $SABC$ , che è composta di due piramidi, e di due prismi, è minore di quattro di questi medesimi prismi. Ora la solidità d'uno di questi prismi  $= \frac{1}{4}ABC \times SO$ , ed il suo quadruplo è eguale a  $\frac{1}{2}ABC \times SO$ ; dunque *la solidità d'una piramide triangolare qualunque è minore della metà del prodotto della sua base per la sua altezza,*

\* 25, 5.  
Scol.

## PROPOSIZIONE XVIII.

## TEOREMA

La solidità d'una piramide triangolare è eguale al terzo del prodotto della sua base per la sua altezza.

Sia  $SABC$  una piramide triangolare qua- Fig. 215.  
lunque,  $ABC$  la sua base,  $SO$  la sua altezza; dico che la solidità della piramide  $SABC$  sarà eguale al terzo del prodotto dell'area  $ABC$  per l'altezza  $SO$ , in modo che si avrà  $SABC = \frac{1}{3}ABC \times SO$ , ovvero  $SO \times \frac{1}{3}ABC$ .

Perchè, se si nega questa proposizione, bisognerà che la solidità  $SABC$  sia eguale al prodotto di  $SO$  per una quantità più grande, o più piccola che  $\frac{1}{3}ABC$ .

Sia 1.<sup>o</sup> questa quantità più grande, di modo che si abbia  $SABC = SO \left( \frac{1}{3}ABC + M \right)$ . Se si fa la stessa costruzione che nella proposizion precedente, la piramide  $SABC$  sarà divisa in due prismi equivalenti tra loro  $AGHFDE$ ,  $EGICFH$ , ed in due piramidi eguali  $SDEF$ ,  $EGBI$ . Ora la solidità del prisma  $AGHFDE$  è  $DEF \times PO$ , e quella dei due prismi insieme è per conseguenza  $DFE \times 2PO$ , ovvero  $DFE \times SO$ . Togliendo i due prismi dalla piramide intera, il resto sarà eguale al doppio della piramide  $SDEF$ , in modo che si avrà  $2SDEF = SO \times \left( \frac{1}{3}ABC + M - DFE \right)$ . Ma, perchè  $SA$  è doppia di  $SD$ , la superficie  $ABC$  è quadruple di  $DEF$ \*, \* 16. e così  $\frac{1}{3}ABC - DFE = \frac{4}{3}DFE - DFE = \frac{1}{3}DFE$ ; dunque  $2SDEF = SO \times \left( \frac{1}{3}DEF + M \right)$ . E così

prendendo la metà da una parte, e dall'altra, si avrà  $SDEF = SP \left( \frac{1}{3}DEF + M \right)$ . Dal che si fa manifesto che, per avere la solidità della piramide  $SDEF$ , bisognerà aggiungere al terzo della sua base la medesima superficie  $M$ , ch'è stata aggiunta al terzo della base della gran piramide, e moltiplicare il tutto per l'altezza  $SP$  della piccola piramide.

Se si divide  $SD$  in due parti eguali nel punto  $K$ , e che per il punto  $K$  si faccia passare il piano  $KLM$  parallelo a  $DEF$ , il quale incontri in  $Q$  la perpendicolare  $SP$ , la medesima dimostrazione prova egualmente che la solidità della piramide  $SKLM$  sarà eguale a  $SQ \times \left( \frac{1}{3}KLM + M \right)$ .

Continuando così a formare una serie di piramidi, i cui lati decrescano in ragion sud-dupla, e le basi in ragion suquadrupla, si arriverà ben presto ad una piramide  $Sabc$ , la di cui base  $abc$  sarà più piccola di  $6M$ . Sia  $So$  l'altezza di quest'ultima piramide, e la sua solidità, dedotta da quelle delle piramidi precedenti, sarà  $So \times \left( \frac{1}{3}abc + M \right)$ . Ma si ha  $M > \frac{1}{3}abc$ , e per conseguenza  $\frac{1}{3}abc + M > \frac{1}{2}abc$ ; bisognerebbe dunque che la solidità della piramide  $Sabc$  fosse maggiore di  $So \times \frac{1}{2}abc$ ; risultato assurdo, poichè si è provato nel corollario II. della proposizion precedente, che la solidità d'una piramide triangolare è sempre minore della metà del prodotto della sua base per la sua altezza. 1.º È dunque impossibile che la solidità della pi-



ramide  $SABC$  sia maggiore di  $SO \times \frac{1}{3}ABC$ .

Sia 2.º  $SABC = SO \times (\frac{1}{3}ABC - M)$ ; si proverà, come nel primo caso, che la solidità della piramide  $SDEF$ , le cui dimensioni son due volte minori, è eguale a  $SP \times (\frac{1}{3}DEF - M)$ ; e continuando la serie delle piramidi, i di cui lati decrescono in ragion suddupla, fino ad un termin qualunque  $Sabc$ , si avrà parimente la solidità dell'ultima piramide  $Sabc = SO \times (\frac{1}{3}abc - M)$ . Ma le basi  $ABC$ ,  $DEF$ ,  $LKM$  . . . ,  $abc$  formando una serie decrescente, di cui ciascun termine è il quarto del precedente, si arriverà ben presto ad un termine  $abc$  eguale a  $12M$ , o che sarà compreso tra  $12M$ , e  $3M$ ; allora  $M$  essendo eguale, o maggiore di  $\frac{1}{12}abc$ , la quantità  $\frac{1}{3}abc - M$  sarà eguale a  $\frac{1}{4}abc$ , o più piccola che  $\frac{1}{4}abc$ , in modo che la solidità della piramide  $Sabc$  sarà o  $= SO \times \frac{1}{4}abc$ , o  $< SO \times \frac{1}{4}abc$ ; risultato parimente assurdo, poichè, secondo il corollario I. della proposizion precedente, la solidità d'una piramide triangolare è sempre maggiore del quarto del prodotto della sua base per la sua altezza. Dunque 2.º la solidità della piramide  $SABC$  non può esser minore di  $SO \times \frac{1}{3}ABC$ .

Dunque finalmente la solidità della piramide  $SABC = SO \times \frac{1}{3}ABC$ , ovvero  $= \frac{1}{3}ABC \times SO$ , conformemente all'enunciato del teorema.

*Corollario I.* Ogni piramide triangolare è la terza parte del prisma triangolare della medesima base, e della medesima altezza;

perchè  $ABC \times SO$  è la solidità del prisma, di cui  $ABC$  è la base, e  $SO$  l'altezza.

*Corollario II.* Due piramidi triangolari della medesima altezza stanno tra loro come le basi, e due piramidi triangolari della medesima base stanno tra loro come le altezze.

### PROPOSIZIONE XIX.

#### TEOREMA

**Fig. 214.** *Ogni piramide  $SABCDE$  ha per misura la terza parte de prodotto della sua base  $ABCDE$  per la sua altezza  $SO$ .*

Poichè, facendo passare i piani  $SEB$ ,  $SEC$  per le diagonali  $EB$ ,  $EC$ , si dividerà la piramide poligona  $SABCDE$  in più piramidi triangolari, che avranno tutte la medesima altezza  $SO$ . Ma, per il teorema precedente, ciascuna di queste piramidi si misura moltiplicando ognuna delle basi  $ABE$ ,  $BCE$ ,  $CDE$  per la terza parte dell'altezza  $SO$ ; dunque la somma delle piramidi triangolari, o la piramide poligona  $SABCDE$ , avrà per misura la somma dei triangoli  $ABE$ ,  $BCE$ ,  $CDE$ , o il poligono  $ABCDE$  moltiplicato per  $\frac{1}{3}SO$ . Dunque ogni piramide ha per misura la terza parte del prodotto della sua base per la sua altezza.

*Corollario I.* Ogni piramide è dunque la terza parte del prisma della medesima base, e della medesima altezza.

*Corollario II.* Due piramidi della medesima altezza stanno fra loro come le loro basi, e due piramidi della medesima base stanno fra loro come le loro altezze.

*Scolio.* Si può valutare la solidità d'ogni corpo poliedro decomponendolo in piramidi; e questa decomposizione si può fare in più maniere. Una delle più semplici è di far partire i piani di divisione dal vertice d'un istess'angolo solido; allora si avranno tante piramidi parziali quante facce sono nel poliedro, eccetto quelle, che formau l'angolo solido, donde partono i piani di divisione.

## PROPOSIZIONE XX.

## TEOREMA

*Due poliedri simmetrici sono equivalenti tra loro, ovvero eguali in solidità.*

Poichè 1.<sup>o</sup> due piramidi triangolari sim- Fig. 202.  
metriche, come  $SABC$ ,  $TABC$ , hanno per misura comune il prodotto della base  $ABC$  per il terzo dell'altezza  $SO$ , ovvero  $TO$ ; dunque queste piramidi sono equivalenti tra loro.

2.<sup>o</sup> Se si divide in una maniera qualunque uno de' poliedri simmetrici in piramidi triangolari, si potrà dividere parimente l'altro poliedro in piramidi triangolari simmetriche: ora le piramidi triangolari simmetriche son rispettivamente equivalenti; dunque i poliedri interi saranno tra loro equivalenti, od eguali in solidità.

*Scolio.* Questa medesima proposizione sembrava risultare immediatamente dalla proposizione II., ove si è fatto vedere che in due poliedri simmetrici tutte le parti costituenti d'un solido sono eguali alle parti costituenti dell'altro.

## PROPOSIZIONE XXI.

## TEOREMA

*Se una piramide è tagliata da un piano parallelo alla sua base, il tronco, che resta togliendo la piccola piramide, è uguale alla somma di tre piramidi, che avessero per altezza comune l'altezza del tronco, e le cui basi fossero la base inferiore del tronco, la sua base superiore, ed una media proporzionale fra queste due basi.*

- Fig. 217. Sia  $SABCDE$  una piramide tagliata dal piano  $abd$  parallelo alla base; sia  $TEGH$  una piramide triangolare, la di cui base, ed altezza siano uguali, od equivalenti a quelle della piramide  $SABCDE$ . Si possono supporre le due basi situate sopra un medesimo piano; ed allora il piano  $abd$  prolungato determinerà nella piramide triangolare una sezione  $fgh$  situata alla medesima altezza sopra il piano comun delle basi; dal che risulta che la sezione  $fgh$  stà alla sezione  $abd$  come la base  $FGH$  stà alla base  $ABD$  \*; e, poichè le basi sono equivalenti, le sezioni lo saran pure. Da ciò segue che le piramidi  $Sabcde$ ,  $Tfgh$  sono equivalenti, giacchè hanno la medesima altezza, e basi equivalenti. Le piramidi intere  $SABCDE$ ,  $TEGH$  sono equivalenti per la medesima ragione; dunque i tronchi  $ABDdab$ ,  $FGHhfg$  son equivalenti, e per conseguenza basterà dimostrare la proposizione enunziata per il solo caso del tronco di piramide triangolare.
- \* 16.

Sia dunque  $FGHhfg$  un tronco di piramide triangolare a basi parallele: per i tre punti  $F, g, H$  conducete il piano  $FgH$ , che taglierà del tronco la piramide triangolare  $gFGH$ : questa piramide ha per base la base inferiore  $FGH$  del tronco; ha pure per altezza l'altezza del tronco, poichè il vertice  $g$  è nel piano della base superiore  $fgh$ . Fig. 218.

Dopo aver tolto questa piramide resterà la piramide quadrangolare  $gfhHF$ , il cui vertice è  $g$ , e la base  $fghHF$ . Per i tre punti  $f, g, H$  conducete il piano  $fgH$ , che dividerà la piramide quadrangolare in due piramidi triangolari  $gFfH, gfhH$ . Quest'ultima ha per base la base superiore  $gfh$  del tronco, e per altezza l'altezza del tronco, poichè il suo vertice  $H$  appartiene alla base inferiore. Quindi abbiamo già due delle tre piramidi, che debbon comporre il tronco.

Resta a considerare la terza  $gFfH$ : ora, se si conduce  $gK$  parallela a  $fF$ , e se s'immagina una nuova piramide  $fFHK$ , il cui vertice è  $K$ , e la base  $FfH$ , queste due piramidi avranno la medesima base  $FfH$ ; avranno pure la medesima altezza, poichè i vertici  $g$ , e  $K$  son situati sopra una linea  $gK$  parallela a  $Ff$ , e per conseguenza parallela al pian della base; dunque queste piramidi sono equivalenti: ma la piramide  $fFHK$  può considerarsi come se avesse il suo vertice in  $f$ , e così ella avrà la medesima altezza del tronco. Quanto alla sua base  $FKH$ , dico ch'è media proporzionale fra le basi  $FGH$ ,

*figh*. Infatti i triangoli  $FHK$ , *figh* hanno un angolo uguale  $E = f$ , ed un lato uguale  $FK = fg$ ; si ha dunque  $* FHK : fgh :: FH : fh$ . Si ha pure  $FHG : FHK :: FG : FK$ , o *fg*. Ma i triangoli simili  $FGH$ , *figh* danno  $FG : fg :: FH : fh$ ; dunque  $FGH : FHK :: FHK : fgh$ , cioè, la base  $FHK$  è media proporzionale fra le due  $FGH$ , *figh*. Dunque un tronco di piramide triangolare a basi parallele equivale a tre piramidi, che hanno per altezza comune l'altezza del tronco, e le cui basi sono la base inferiore del tronco, la sua base superiore, ed una media proporzionale fra queste due basi.

## PROPOSIZIONE XXII.

## TEOREMA

Fig. 216. *Se si taglia un prisma triangolare, di cui ABC è la base, con un piano DEF inclinato a questa base, il solido ABCDEF, che risulta da questa sezione, sarà eguale alla somma di tre piramidi, i vertici delle quali sono D, E, F, e la base comune ABC.*

Per i tre punti  $F, A, C$  fate passare il piano  $FAC$ , che toglierà dal prisma troncato  $ABCDEF$  la piramide triangolare  $FABC$ : questa piramide ha per base  $ABC$ , e per vertice il punto  $F$ .

Dopo aver tolto questa piramide, resterà la piramide quadrangolare  $FACDE$ , di cui  $F$  è il vertice, ed  $ACDE$  la base. Per i tre punti  $F, E, C$  conducete un piano  $FEC$ , che dividerà la piramide quadrangolare in due piramidi triangolari  $FACE$ ,  $FCDE$ .

La piramide  $FAEC$ , che ha per base il triangolo  $AEC$ , e per vertice il punto  $F$ , è equivalente ad una piramide  $EABC$ , che avesse per base  $AEC$ , e per vertice il punto  $B$ . Perchè queste due piramidi hanno la medesima base, ed hanno ancora la medesima altezza, poichè la linea  $BF$  essendo parallela a ciascuna delle linee  $AE$ ,  $CD$ , è parallela perciò al loro piano  $ACE$ ; dunque la piramide  $FAEC$  è equivalente alla piramide  $EABC$ , la quale può esser considerata come se avesse per base  $ABC$ , e per vertice il punto  $E$ .

La terza piramide  $FCDE$  può esser cambiata primieramente in  $AFCD$ , perchè queste due piramidi hanno la medesima base  $FCD$ , ed hanno ancora la medesima altezza, essendo  $AE$  parallela al piano  $FCD$ ; dunque la piramide  $FCDE$  è equivalente ad  $AFCD$ . In seguito la piramide  $AFCD$  può esser cambiata in  $ABCD$ , perchè queste due piramidi hanno la base comune  $ACD$ , ed hanno ancora la medesima altezza, per essere i loro vertici  $F$ , e  $B$  situati sopra una parallela al piano della base. Dunque la piramide  $FCDE$ , equivalente ad  $AFCD$ , è ancora equivalente ad  $ABCD$ . Ora questa piramide può essere riguardata come se avesse per base  $ABC$ , e per vertice il punto  $D$ .

Dunque finalmente il prisma troncato  $ABCDEF$  è eguale alla somma di tre piramidi, che abbian per base comune  $ABC$ , e i di cui vertici sian rispettivamente i punti  $D$ ,  $E$ ,  $F$ .

*Corollario.* Se le costole o spigoli AE, BF, CD sien perpendicolari al pian della base, dessi saranno nel medesimo tempo le altezze delle tre piramidi, che compongono insieme il prisma troncato; di modo che la solidità del prisma troncato sarà allora espressa per  $\frac{1}{3}ABC \times AE + \frac{1}{3}ABC \times BF + \frac{1}{3}ABC \times CD$ ; quantità, che riducesi a  $\frac{1}{3}ABC \times (AE + BF + CD)$ .

## PROPOSIZIONE XXIII.

## T E O R E M A

*Due piramidi triangolari simili hanno le facce omologhe simili, e gli angoli solidi omologhi uguali.*

Fig. 203. Secondo la definizione le due piramidi triangolari SAB, TDEF son simili se i due triangoli SAB, ABC sono simili ai due TDE, DEF, e similmente posti, cioè, se si ha l'angolo  $ABS = DET$ ,  $BAS = EDT$ ,  $ABC = DEF$ ,  $BAC = EDF$ , e se inoltre l'inclinazione dei piani SAB, ABC è uguale a quella dei piani TDE, DEF. Posto ciò, dico che queste piramidi hanno tutte le facce rispettivamente simili, e gli angoli solidi omologhi uguali.

Prendete  $BG = ED$ ,  $BH = EF$ ,  $BI = ET$ , e tirate GH, GI, IH. La piramide TDEF è uguale alla piramide IGBH; poichè, avendo preso i lati GB, BH uguali ai lati DE, EF, e l'angolo GBH essendo per supposizione, uguale all'angolo DEF, il triangolo GBH è uguale a DEF. Dunque, per effet-



tuare la sovrapposizione delle due piramidi, si può primieramente situare la base DEF sulla sua uguale GBH; dipoi, giacchè il piano DTE è inclinato sopra DEF quanto il piano SAB sopra ABC, è chiaro che il piano DET cadrà indefinitamente sopra il piano BAS. Ma, per supposizione, l'angolo  $DET = GBI$ ; dunque ET cadrà sulla sua uguale BI. E poichè i quattro angoli D, E, F, T coincidono con i quattro G, B, H, I, ne segue \* che la piramide TDEF \* 1. coincide colla piramide IGBH.

Ora, a cagione dei triangoli uguali DEF, GBH, si ha l'angolo  $BGH = EDF = BAC$ ; dunque GH è parallela ad AC. Per una ragione simile GI è parallela ad AS; dunque il piano IGH è parallelo a SAC \*. Da ciò \* 13, 5. segue che il triangolo IGH, o il suo uguale TDF è simile a SAC \*, ed il triangolo IBH, \* 15. o il suo uguale TEF è simile a SBC; dunque le due piramidi triangolari simili SABC, TDEF hanno le quattro facce rispettivamente simili: di più hanno gli angoli solidi omologhi uguali.

Perchè si è già situato l'angolo solido E sul suo omologo B, e si potrebbe fare lo stesso per due altri angoli solidi omologhi; ma si vede immediatamente che due angoli solidi omologhi sono uguali, per esempio, gli angoli T, e S, perchè sono formati da tre angoli piani rispettivamente uguali, e similmente posti.

Dunque due piramidi triangolari simili

hanno le facce omologhe simili, e gli angoli solidi omologhi uguali.

*Corollario I.* I triangoli simili nelle due piramidi danno le proporzioni  $AB : DE :: BC : EF :: AC : DF :: AS : DT :: SB : TE :: SC : TF$ ; dunque *nelle piramidi triangolari simili i lati omologhi sono proporzionali.*

*Corollario II.* E poichè gli angoli solidi omologhi sono uguali, ne segue che *l'inclinazione di due facce qualunque d'una piramide è uguale all'inclinazione delle facce omologhe della piramide simile.*

*Corollario III.* Se si taglia la piramide triangolare  $SABC$  con un piano  $GIH$  parallelo ad una delle facce  $SAC$ , la piramide parziale  $BGHI$  sarà simile alla piramide intera  $SABC$ . Poichè i triangoli  $BGI$ ,  $BGH$  son rispettivamente simili ai triangoli  $BAS$ ,  $BAC$ , e similmente posti, l'inclinazione dei loro piani è la medesima negli uni, e negli altri; dunque le due piramidi sono simili.

**Fig. 214.** *Corollario IV.* In generale, *se si taglia una piramide qualunque  $SABCDE$  con un piano  $abcde$  parallelo alla base, la piramide parziale  $Sabcde$  sarà simile alla piramide intera  $SABCDE$ .* Poichè le basi  $ABCDE$ ,  $abcde$  son simili, e tirando  $AC$ , *ac* si è adesso provato che la piramide triangolare  $SABC$  è simile alla piramide  $Sabc$ ; dunque il punto  $S$  è determinato per rapporto alla base  $ABC$ ,  
 \* Def. 18. come il punto  $S$  per rapporto alla base  $abc$  \*; dunque le due piramidi  $SABCDE$ ,  $Sabcde$  sono simili.

*Scolio.* In vece dei cinque dati richiesti dalla definizione perchè due piramidi triangolari sian simili si potrebbe sostituirne altri cinque secondo differenti combinazioni, e ne risulterebbero altrettanti teoremi, fra' quali si può distinguere questo: *Due piramidi triangolari son simili quand' hanno tutti i lati omologhi proporzionali*

Poichè, se si hanno le proporzioni  $AB:DE::BC:EF::AC:DF::AS:DT::SB:TE::SC:TF$ , il che comprende cinque condizioni, i triangoli  $ABS$ ,  $ABC$  saranno simili ai triangoli  $DET$ ,  $DEF$ , e similmente posti. Si avra pure il triangolo  $SBC$  simile a  $TEF$ ; dunque i tre angoli piani, che formano l'angolo solido  $B$ , saranno uguali rispettivamente agli angoli piani, che forman l'angolo solido  $E$ ; donde ne segue che l'inclinazione dei piani  $SAB$ ,  $ABC$  è uguale a quella dei loro omologhi  $TDE$ ,  $DEF$ , e che perciò le due piramidi saranno simili. Fig. 203.

## PROPOSIZIONE XXIV.

## TEOREMA

*Due poliedri simili hanno le facce omologhe simili, e gli angoli solidi omologhi uguali.*

Sia  $ABCDE$  la base d' un poliedro; siano  $M$ , e  $N$  i vertici di due angoli solidi fuori di questa base, determinati dalle piramidi triangolari  $MABC$ ,  $NABC$ , la cui base comune è  $ABC$ : siano nell' altro poliedro  $abcde$  la base omologa, o simile ad  $ABCDE$ ;  $m$ , e  $n$  i vertici omologhi a  $M$ , e  $N$ , determi- Fig. 219.

nati dalle piramidi *mabc*, *nabc* simili alle piramidi *MABC*, *NABC*; dico primieramente che le distanze *MN*, *mn* sono proporzionali ai lati omologhi *AB*, *ab*.

Infatti, essendo simili le piramidi *MABC*, *mabc*, l'inclinazione dei piani *MAC*, *BAC* è uguale a quella dei piani *mac*, *bac*; parimente, essendo simili le piramidi *NABC*, *nabc*, l'inclinazione dei piani *NAC*, *BAC* è uguale a quella dei piani *nac*, *bac*. Dunque, se si tolgano le prime inclinazioni dall'ultime, resterà l'inclinazione dei piani *NAC*, *MAC* uguale a quella dei piani *nac*, *mac*. Ma, a motivo della similitudine delle stesse piramidi, il triangolo *MAC* è simile a *mac*, ed il triangolo *NAC* è simile a *nac*. Dunque le due piramidi triangolari *MNAC*, *mnac* hanno due facce rispettivamente simili, similmente poste, ed ugualmente inclinate fra loro. Dunque queste piramidi sono simili \*, e i loro lati omologhi danno la proporzione  $MN : mn :: AM : am$ . D'altroude  $AM : am :: AB : ab$ ; dunque  $MN : mn :: AB : ab$ .

Siano *P*, e *p* due altri vertici omologhi dei medesimi poliedri; si avrà similmente  $PN : pn :: AB : ab$ ;  $PM : pm :: AB : ab$ ; dunque  $MN : mn :: PN : pn :: PM : pm$ . Dunque il triangolo *PNM*, che unisce tre vertici qualunque d'un poliedro, è simile al triangolo *pnm*, che unisce i tre vertici omologhi dell'altro poliedro.

Siano inoltre *Q*, e *q* due vertici omologhi,

ed il triangolo PQN sarà simile a  $pqn$ . Dico di più che l'inclinazione dei piani PQN, PMN è eguale a quella dei piani  $pqn$ ,  $pmn$ .

Poichè, se si tirino QM, e  $qm$ , si avrà sempre il triangolo QNM simile a  $qnm$ , e per conseguenza l'angolo QNM uguale a  $qnm$ . Concepite in N un angolo solido formato dai tre angoli piani QNM, QNP, PNM, ed in  $n$  un altr'angolo solido formato dai tre angoli piani  $qnm$ ,  $qnp$ ,  $pnm$ : poichè questi angoli piani son rispettivamente uguali, ne segue che gli angoli solidi sono uguali. Dunque l'inclinazion dei due piani PNQ, PNM è uguale a quella dei loro omologhi  $pnq$ ,  $pnm$ . Dunque, se i due triangoli PNQ, PNM fossero in un medesimo piano, nel qual caso si avrebbe l'angolo  $QNM = QNP + PNM$ , si avrebbe pure l'angolo  $qnm = qnp + pnm$ , ed i due triangoli  $qnp$ ,  $pnm$  sarebbero parimente in un medesimo piano.

Tutto ciò, che abbiám dimostrato, ha luogo qualunque siano gli angoli M, N, P, Q paragonati ai loro omologhi  $m$ ,  $n$ ,  $p$ ,  $q$ .

Supponiamo adesso che la superficie d'uno dei poliedri sia divisa in triangoli ABC, ACD, MNP, NPQ, ec.; si vede tosto che la superficie dell'altro poliedro conterrà un ugual numero di triangoli  $abc$ ,  $acd$ ,  $mnp$ ,  $npq$ , ec. simili, e similmente posti. E se più triangoli, come MPN, NPQ ec., appartengono ad una medesima faccia, e sono in un medesimo piano, i loro omologhi  $mpn$ ,  $npq$ , ec. saranno parimente in un medesimo pia-

no. Dunque ogni faccia poligona in un poliedro corrisponderà ad una faccia poligona simile nell'altro poliedro. Dunque i due poliedri saranno compresi da un medesimo numero di piani simili; e similmente posti. Dico di più che gli angoli solidi omologhi saranno uguali.

Poichè, se l'angolo solido  $N$ , per esempio, è formato dagli angoli piani  $QNP$ ,  $PNM$ ,  $MNR$ ,  $QNR$ , l'angolo solido omologo  $n$  sarà formato dagli angoli piani  $qnp$ ,  $pnm$ ,  $mnr$ ,  $qnr$ . Ora questi angoli piani son rispettivamente uguali, e l'inclinazione di due piani adjacenti è uguale a quella dei loro omologhi. Dunque i due angoli solidi sono uguali, giacchè potrebbero essere sovrapposti.

Dunque finalmente due poliedri simili hanno le facce omologhe simili, e gli angoli solidi omologhi uguali.

*Corollario.* Segue dalla dimostrazion precedente che, se con quattro vertici d'un poliedro si formi una piramide triangolare, e si formi un'altra piramide pure coi quattro vertici omologhi d'un poliedro simile, queste due piramidi saranno simili, perchè avranno

\* 21. Scol. no i lati omologhi proporzionali \*.

Si vede nel tempo stesso che due diagonali \* 17, 2. omologhe \*  $AN$ ,  $an$  stanno fra loro come due lati omologhi  $AB$ ,  $ab$ .

## PROPOSIZIONE XXV.

## TEOREMA

*Due poliedri simili posson dividersi in un medesimo numero di piramidi triangolari simili rispettivamente, e similmente poste.*

Poichè si è già veduto che le superficie dei due poliedri si posson dividere in un medesimo numero di triangoli simili rispettivamente, e similmente posti. Considerate tutti i triangoli d'un poliedro, fuorchè quelli, che formano l'angolo solido A, come basi di tante piramidi triangolari, il cui vertice è in A; queste piramidi prese insieme comporranno il poliedro. Dividete parimente l'altro poliedro in piramidi, che abbian per vertice comune quello dell'angolo a omologo ad A. È chiaro che la piramide, la quale congiunge quattro vertici d'un poliedro, sarà simile alla piramide, che congiunge i quattro vertici omologhi dell'altro poliedro. Dunque due poliedri simili ec.

## PROPOSIZIONE XXVI.

## TEOREMA

*Due piramidi simili stanno fra loro come i cubi dei lati omologhi.*

Poichè, essendo simili due piramidi, la minore potrà esser situata sulla maggiore in maniera che abbiano l'angolo solido S comune. Allora le basi ABCDE, *abcde* saranno parallele; poichè, siccome le facce omologhe sono simili \*, l'angolo Sab è uguale \* 22.

Fig. 214.

22.

- a SAB, come pure Sbc a SBC; dunque il  
 \* 13, 5. piano *abc* è parallelo al piano ABC \*. Posto  
 ciò, sia SO la perpendicolare abbassata dal  
 vertice S sul piano ABC, e sia o il punto  
 ove questa perpendicolare incontra il piano  
*abc*; si avrà, secondo quello ch'è già stato  
 \* 15. dimostrato \*,  $SO : So :: SA : Sa :: AB : ab$ ,  
 e per conseguenza

$$\frac{1}{3} SO : \frac{1}{3} So :: AB : ab.$$

Ma essendo le basi ABCDE, *abcde* figure  
 simili, si ha

$$ABCDE : abcde :: \overline{AB}^2 : \overline{ab}^2$$

Moltiplicando queste due proporzioni ter-  
 mine per termine, ne risulterà la proporzione

$ABCDE \times \frac{1}{3} SO : abcde \times \frac{1}{3} So :: \overline{AB}^3 : \overline{ab}^3$ .  
 Ora  $ABCDE \times \frac{1}{3} SO$  è la solidità della pira-  
 \* 18. mide SABCDE \*, e  $abcde \times \frac{1}{3} So$  è quella  
 della piramide *Sabcde*; dunque due piramidi  
 simili stanno fra loro come i cubi dei loro  
 lati omologhi.

## PROPOSIZIONE XXVII.

### TEOREMA

*Due poliedri simili stanno fra loro come  
 i cubi dei lati omologhi.*

Fig 219. Poichè due poliedri simili posson esser di-  
 visi in un medesimo numero di piramidi trian-  
 golari rispettivamente simili \*. Ora le due  
 piramidi simili APNM, *apnm* stanno fra  
 loro come i cubi dei lati omologhi AM, *am*,  
 o come i cubi dei lati omologhi AB, *ab*. Lo  
 stesso rapporto avrà luogo fra due altre pi-



ramidi omologhe qualunque; dunque la somma di tutte le piramidi, che compongono un poliedro, ossia il poliedro stesso stà all'altro poliedro come il cubo d'un lato qualunque del primo stà al cubo del lato omologo del secondo.

*Scolio generale.*

Possiamo presentare in termini algebrici, cioè nella maniera più succinta, la ricapitolazione delle principali proposizioni di questo Libro riguardo alle solidità dei poliedri.

Sia  $B$  la base d'un prisma,  $H$  la sua altezza; la solidità del prisma sarà  $B \times H$ , o  $BH$ .

Sia  $B$  la base d'una piramide,  $H$  la sua altezza; la solidità della piramide sarà  $B \times \frac{1}{3}H$ , o  $H \times \frac{1}{3}B$ , o  $\frac{1}{3}BH$ .

Sia  $H$  l'altezza d'un tronco di piramide a basi parallele; siano  $A$ , e  $B$  le sue basi;  $\sqrt{AB}$  sarà la media proporzionale fra esse; la solidità del tronco sarà  $\frac{1}{3}H (A+B+\sqrt{AB})$ .

Sia  $B$  la base d'un tronco di prisma triangolare;  $H$ ,  $H'$ ,  $H''$ , le altezze relative ai suoi tre vertici superiori; la solidità del prisma troncato sarà  $\frac{1}{3}B \times (H+H'+H'')$ .

Siano finalmente  $P$ , e  $p$  le solidità di due poliedri simili;  $A$ , ed  $a$  due lati omologhi di questi poliedri; si avrà  $P : p :: A^3 : a^3$ .

---

 LA SFERA
 

---

## DEFINIZIONI

1. La *sfera* è un solido terminato da una superficie curva, di cui tutti i punti sono ugualmente distanti da un punto interno, che si chiama *centro*

Fig. 220. Si può immaginare che la sfera sia prodotta dalla rivoluzione del mezzo-circolo DAE intorno al diametro DE; poichè la superficie descritta con tal movimento dalla curva DAE avrà tutti i suoi punti a distanze uguali dal centro C.

2. Il *raggio della sfera* è una linea retta condotta dal centro a un punto della superficie; il *diametro*, o *asse* è una linea, che passa per il centro, e termina dalle due parti alla superficie.

Tutti i raggi della sfera sono uguali; tutti i diametri sono uguali, e doppie del raggio.

\* Pr. 1. 3. Si dimostrerà \* che ogni sezione della sfera fatta da un piano è un *circolo*: posto ciò, si chiama *gran circolo* la sezione, che

passa per il centro, *piccolo circolo* quella, che non vi passa.

4. Un *piano* è *tangente* della sfera quando ha un solo punto comune colla sua superficie.

5. Il *polo d'un circolo* della sfera è un punto della superficie ugualmente lontano da tutti i punti della circonferenza di questo circolo. Si farà veder \* che ogni circolo, \* Pr. 6. grande, o piccolo, ha sempre due poli.

6. *Triangolo sferico* è una parte della superficie della sfera racchiusa da tre archi di circoli grandi.

Questi archi, che si chiamano *i lati* del triangolo, vengon sempre supposti minori della mezza-circonferenza. Gli angoli, che i loro piani fanno fra loro, sono gli angoli del triangolo.

7. Un *triangolo sferico* prende il nome di *rettangolo*, *obliquangolo*, *isoscele*, *equilatero* ne' casi stessi d'un triangolo rettilineo.

8. *Poligono sferico* è una parte della superficie della sfera racchiusa da tre, o più archi di circoli grandi.

9. *Fuso* è la parte della superficie della sfera compresa fra due gran mezzi-circoli, che terminano a un diametro comune.

10. Chiamerò *cuneo*, o *unghia sferica* la parte del solido della sfera compresa fra i medesimi gran mezzi-circoli, ed alla quale il fuso serve di base.

11. *Piramide sferica* è la parte del solido della sfera compresa fra i piani d'un angolo

solido, il cui vertice è al centro. La base della piramide sarà un poligono sferico intercetto tra i medesimi piani.

12. Si chiama *zona* la parte della superficie della sfera compresa fra due piani paralleli, che sono le basi; uno di questi piani può esser tangente della sfera, ed allora la zona ha una sola base.

13. *Segmento sferico* è la porzione del solido della sfera compresa fra due piani paralleli, che sono le basi; uno di questi piani può esser tangente della sfera, ed allora il segmento sferico ha una sola base.

14. L'*asse*, o *altezza* d'una zona, e d'un segmento è la distanza dei due piani paralleli, che son le basi della zona, o del segmento addetto.

Fig. 220. 15. Mentre il mezzo-circolo DAE girando intorno al diametro DE descrive la sfera, ogni settor circolare, come DCF, o FCH, descrive un solido, che si chiama *settore sferico*.

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA

*Se la sfera è tagliata da un piano qualunque, la sezione sarà un circolo.*

Fig. 221. Sia AMB la sezione fatta da un piano nella sfera, il cui centro è C. Dal punto C conducete la perpendicolare CO sul piano AMB, e più linee rette CM, CM a diversi punti della curva qualunque siasi AMB, che termina la sezione.

Le oblique  $CM$ ,  $CM$ ;  $CB$  sono uguali, poichè son raggi della sfera; esse son dunque ugualmente lontane dalla perpendicolare  $CO$  \*; dunque tutte le linee  $OM$ ,  $OM$ ,  $OB$  \* 5, 5. sono uguali; dunque la sezione  $AMB$  è un circolo, di cui il punto  $O$  è il centro.

*Corollario I.* Se la sezione passa per il centro della sfera, il suo raggio sarà il raggio della sfera; dunque tutti i gran circoli sono uguali fra loro.

*Corollario II.* Due gran circoli si tagliano sempre in due parti uguali, poichè la loro comune intersezione, passando per il centro, è un diametro.

*Corollario III.* Ogni gran circolo divide la sfera, e la sua superficie in due parti uguali; poichè se, dopo aver separato i due emisferi, si applicano sulla base comune rivolgendo la convessità dal medesimo lato, le due superficie coincideranno una coll'altra, senza di che vi sarebber dei punti più vicini al centro gli uni degli altri.

*Corollario IV.* Il centro d'un piccolo circolo, e quello della sfera sono sopra una medesima retta perpendicolare al piano del circolo piccolo.

*Corollario V.* I circoli piccoli sono tanto più piccoli quanto sono più lontani dal centro della sfera; poichè, quanto è più grande la distanza  $CO$ , tanto è più piccola la corda  $AB$ , diametro del piccol circolo  $AMB$ .

*Corollario VI.* Per due punti dati sulla superficie d'una sfera si può far passare un

arco di circolo grande; poichè i due punti dati, e il centro della sfera sono tre punti, che determinano la posizione d'un piano. Ma, se i due punti dati fossero alle estremità d'un diametro, allora questi due punti, ed il centro sarebbero in linea retta, e vi sarebbe un'infinità di circoli grandi, che potrebbero passare per i due punti dati.

## PROPOSIZIONE II.

## TEOREMA

Fig. 222. *In ogni triangolo sferico ABC un lato qualunque è minor della somma degli altri due.*

Sia O il centro della sfera, e siano condotti i raggi OA, OB, OC. Se s'immaginano i piani AOB, AOC, COB, questi piani formeranno al punto O un angolo solido; e gli angoli AOB, AOC, COB avranno per misura i lati AB, AC, BC del triangolo sferico ABC. Ora ciascuno dei tre angoli piani, che compongono l'angolo solido, è minor della  
 \* 21, 5. somma degli altri due \*; dunque un lato qualunque del triangolo ABC è minor della somma degli altri due.

## PROPOSIZIONE III.

## TEOREMA

*Il più corto cammino da un punto ad un altro sulla superficie della sfera è l'arco di circolo grande, che unisce i due punti dati.*

Fig. 223. Sia ANB l'arco di circolo grande, che unisce i punti A, e B, e sia fuor di quest'arco, se è possibile, M un punto della linea la più

corta fra A, e B. Per il punto M conducete gli archi di circolo grande MA, MB, e prendete  $BN=MB$ .

Per il teorema precedente, ANB è più corto di  $AM+MB$ ; togliendo da ambedue le parti  $BN=BM$ , resterà  $AN<AM$ . Ora la distanza da B a M, ossia ch'essa si confonda coll'arco BM, o ch'ella sia qualunque altra linea, è uguale alla distanza da B a N; poichè, facendo girare il piano del circolo grande BM intorno al diametro, che passa per B, si può condurre il punto M sul punto N, e allora la linea più corta da M a B, qualunque sia, si confonderà con quella da N a B; dunque i due cammini da A a B, l'uno che passa per M, l'altro per N, hanno una parte uguale da M a B, e da N a B. Il primo cammino, per supposizione, è il più corto: dunque la distanza da A a M è più corta della distanza da A a N; il che è assurdo, poichè l'arco AM è maggiore di AN. Dunque verun punto della linea più corta fra A, e B non può essere fuori dell'arco ANB; dunque quest'arco stesso è la linea più corta fra le di lui estremità.

## PROPOSIZIONE IV.

## TEOREMA

*La somma dei tre lati d'un triangolo sferico è minore della circonferenza d'un circolo grande.*

Sia ABC un triangolo sferico qualunque; Fig. 225. prolungate i lati AB, AC finchè s'incontri-

- no di nuovo in D. Gli archi ABD, ACD saranno mezze-circonferenze, poichè due circoli grandi si tagliano sempre in due parti uguali \*; ma nel triangolo BCD il lato BC < BD+CD\*; aggiungendo dalle due parti AB+AC, si avrà  $AB+AC+BC < ABD+ACD$ , cioè minore d'una circonferenza.

## PROPOSIZIONE V.

## TEOREMA

*La somma dei lati d'ogni poligono sferico è minore della circonferenza d'un circolo grande.*

Fig. 225. Sia, per esempio, il pentagono ABCDE; prolungate i lati AB, DC finchè s'incontrino in F: poichè BC è minore di BF+CF, il contorno del pentagono ABCDE è minore di quello del quadrilatero AEDF. Prolungate nuovamente i lati AE, FD finchè s'incontrino in G; si avrà  $ED < EG+GD$ ; dunque il contorno del quadrilatero AEDF è minore di quello del triangolo AFG; questo è minore della circonferenza d'un circolo grande: dunque a più forte ragione il contorno del poligono ABCDE è minore della stessa circonferenza.

*Scolio.* Questa proposizione è in sostanza la medesima della 22. del Libro 5. Perchè, se O è il centro della sfera, si può immaginare al punto O un angolo solido formato dagli angoli piani AOB, BOC, COD, ec., e la somma di questi angoli debb'esser minore di quattro angoli retti; il che non dif-



ferisce dalla proposizione presente. La dimostrazione, che ora ne abbiamo data, è differente da quella del Libro quinto: l'una; e l'altra però suppongono che il poligono *ABCDE* sia *convesso*, ovvero che verun lato prolungato non tagli la figura.

## PROPOSIZIONE VI.

## TEOREMA

*Se si conduce il diametro DE perpendicolare al piano del circolo grande AMB, le estremità D, ed E di questo diametro saranno i poli del circolo AMB, e di tutti i piccoli circoli, come FNG, che gli son paralleli.* Fig. 220.

Poichè DC essendo perpendicolare al piano AMB, è perpendicolare a tutte le rette CA, CM, CB, ec. condotte dal suo piede in questo piano; dunque tutti gli archi DA, DM, DB, ec. sono quarte parti di circonferenza; lo stesso è degli archi EA, EM, EB, ec. Dunque ciascuno dei punti D, ed E è ugualmente lontano da tutti i punti della circonferenza AMB; dunque essi sono i poli della circonferenza medesima \*.

\* Def. 5.

In secondo luogo il raggio DC, perpendicolare al piano AMB, è perpendicolare al suo parallelo FNG; dunque passa per il centro O del circolo FNG\*; dunque, se si tirino le oblique DF, DN, DG, queste si allontaneranno ugualmente dalla perpendicolare DO, e saranno uguali. Ma, essendo uguali le corde, sono uguali gli archi; dunque tutti gli archi DF, DN, DG, ec. sono

fra loro uguali; dunque il punto  $D$  è il polo del circolo piccolo  $FNG$ , e per la medesima ragione il punto  $E$  è l'altro polo.

*Corollario I* Ogni arco  $DM$  condotto da un punto dell'arco di circolo grande  $AMB$  al suo polo è un quarto di circonferenza, che noi per abbreviare lo chiameremo *quadrante*, e questo *quadrante* fa nel medesimo tempo un angolo retto coll'arco  $AM$ . Poichè, essendo la linea  $DC$ , perpendicolare al piano  $AMC$ , ogni piano  $DMC$ , che passa per la  
 \* 18, 5. linea  $DC$ , è perpendicolare al piano  $AMC$ \*; dunque l'angolo di questi piani, o seguendo la definizione 6.  $AMD$  è un angolo retto.

*Corollario II.* Per trovare il polo d'un arco dato  $AM$  conducete l'arco indefinito  $MD$  perpendicolare ad  $AM$ ; prendete  $MD$  uguale a un *quadrante*, ed il punto  $D$  sarà uno dei poli dell'arco  $AM$ : ovvero conducete per i due punti  $A$ , e  $M$  gli archi  $AD$ , e  $MD$  perpendicolari ad  $AM$ ; il punto d'incontro  $D$  di questi due archi sarà il polo richiesto.

*Corollario III.* Reciprocamente, se la distanza del punto  $D$  da ciascuno dei punti  $A$ , e  $M$  è uguale a un *quadrante*, dico che il punto  $D$  sarà il polo dell'arco  $AM$ , e che nel medesimo tempo gli angoli  $DAM$ ,  $AMD$  saranno retti.

Poichè sia  $C$  il centro della sfera, e siano condotti i raggi  $CA$ ,  $CD$ ,  $CM$ : giacchè gli angoli  $ACD$ ,  $MCD$  sono retti, la linea  $CD$  è perpendicolare alle due rette  $CA$ ,  $CM$ ; dunque è perpendicolare al lor piano; dun-

que il punto  $D$  è il polo dell'arco  $AM$ ; e però gli angoli  $DAM$ ,  $AMD$  sono retti.

*Scolio.* Le proprietà dei poli permettono di segnare sulla superficie della sfera degli archi di circolo colla medesima facilità che sopra una superficie piana. Si vede, per esempio, che facendo girare l'arco  $DF$ , od ogni altra linea dello stesso intervallo intorno al punto  $D$ , l'estremità  $F$  descriverà il piccolo circolo  $FNG$ ; e, se si fa girare il *quadrante*  $DFA$  intorno al punto  $D$ , l'estremità  $A$  descriverà l'arco di circolo grande  $AM$ .

Se bisogni prolungar l'arco  $AM$ , o se non sian dati che i soli punti  $A$ , e  $M$ , per cui deve passar quest'arco, si determinerà prima il polo  $D$  coll'intersezion di due archi, descritti dai punti  $A$ , e  $M$ , come centri, con un intervallo uguale al *quadrante*. Essendo trovato il polo  $D$ , si descriverà dal punto  $D$ , come centro, e col medesimo intervallo l'arco  $AM$ , ed il suo prolungamento.

Finalmente, se da un punto dato  $P$  si dee abbassare un arco perpendicolare sull'arco dato  $AM$ , si prolungherà quest'arco in  $S$  fino a che quest'intervallo  $PS$  sia eguale a un *quadrante*; in seguito dal polo  $S$ , e col medesimo intervallo si descriverà l'arco  $PM$ , che sarà l'arco perpendicolare richiesto.

## PROPOSIZIONE VII.

### TEOREMA

*Ogni piano perpendicolare all'estremità d'un raggio è tangente della sfera.*

**Fig. 226** Sia  $FAG$  un piano perpendicolare all'estremità del raggio  $OA$ ; se si prende un punto qualunque  $M$  su questo piano, e che si tirino  $OM$ , ed  $AM$ , l'angolo  $OAM$  sarà retto, e però la distanza  $OM$  sarà maggiore di  $OA$ . Il punto  $M$  è dunque fuor della sfera; e siccome è lo stesso per ogni altro punto del piano  $FAG$ , ne segue che questo piano ha il solo punto  $A$  comune colla superficie della sfera; dunque è tangente di questa superficie \*.

**\* Def. 4.** *Scolio:* Si può provar parimente che due sfere hanno un sol punto comune, e sono per conseguenza *tangenti* l'una dell'altra, quando la distanza dei loro centri è uguale alla somma, o alla differenza dei loro raggi. Allora i centri, ed il punto di contatto sono in linea retta.

### PROPOSIZIONE VIII.

#### TEOREMA

**Fig. 226.** *L'angolo  $BAC$ , che fanno fra loro due archi di circoli grandi  $AB$ ,  $AC$ , è uguale all'angolo  $FAG$  formato dalle tangenti di questi archi al punto  $A$ ; ha pur per misura l'arco  $DE$  descritto dal punto  $A$ , come polo, fra i lati  $AB$ ,  $AC$ , prolungati, se sia necessario.*

• Poichè la tangente  $AF$  condotta nel piano dell'arco  $AB$  è perpendicolare al raggio  $AO$ ; la tangente  $AG$  condotta nel piano dell'arco  $AC$  è perpendicolare al medesimo raggio  $AO$ : dunque l'angolo  $FAG$  è uguale  
 \* 17, 5. all'angolo dei piani  $OAB$ ,  $OAC$  \*, ch'è

quello degli archi  $AB$ ,  $AC$ , e che s'indica con  $BAC$ .

Parimente, se l'arco  $AD$  è uguale a un quadrante, come pure  $AE$ , le linee  $OD$ ,  $OE$  saranno perpendicolari ad  $AO$ , e perciò l'angolo  $DOE$  sarà uguale all'angolo dei piani  $AOD$ ,  $AOE$ . Dunque l'arco  $DE$  è la misura dell'angolo di questi piani, ossia la misura dell'angolo  $BAC$ .

*Corollario.* Gli angoli dei triangoli sferici possono paragonarsi fra loro per mezzo degli archi di circoli grandi descritti dai loro vertici, come poli, e compresi fra i loro lati. Laond'è facile far un angolo sferico uguale ad un angolo dato.

*Scolio.* L'angolo  $ACO$  è eguale al suo opposto al vertice  $BCN$ ; l'uno, o l'altro è sempre l'angolo formato dai due piani  $ACB$ ,  $OCN$ . Fig. 238.

Si vede pure che nell'incontro dei due archi  $ACB$ ,  $OCN$  i due angoli adjacenti  $ACO$ ,  $OCB$  presi insieme equivalgono sempre a due angoli retti.

## PROPOSIZIONE IX.

### TEOREMA

*Essendo dato il triangolo sferico  $ABC$ , se dai punti  $A, B, C$ , come poli, si descrivano gli archi  $EF$ ,  $FD$ ,  $DE$ , che formino il triangolo  $DEF$ , reciprocamente i tre punti  $D, E, F$  saranno i poli dei lati  $BC$ ,  $AC$ ,  $AB$ .* Fig. 237.

Poichè, essendo il punto  $A$  il polo dell'arco  $EF$ , la distanza  $AE$  è un quadrante; es-

- 6.  
Cor. 3. sendo il punto C il polo dell'arco DE, la distanza CE è parimente un *quadrante*; dunque il punto E è lontano un *quadrante* da ciascuno dei punti A, e C; dunque è il polo dell'arco AC\*. Si dimostrerà del pari che D è il polo dell'arco BC, e F quello dell'arco AB.

*Corollario.* Dunque il triangolo ABC può esser descritto per mezzo di DEF, come DEF per mezzo di ABC.

### PROPOSIZIONE X.

#### TEOREMA

- Fig. 227. *Poste le medesime cose del teorema precedente, ciascun angolo d'un dei triangoli ABC, DEF avrà per misura la mezza-circonferenza meno il lato opposto nell'altro triangolo.*

Sian prolungati, se è necessario, i lati AB, AC finchè incontrino EF in G, e H: poichè il punto A è il polo dell'arco GH, l'angolo A avrà per misura l'arco GH: ma l'arco EH è un *quadrante*, come pure GF, giacchè E è il polo di AH, e F è il polo di AG: dunque EH+GF equivale ad una mezza-circonferenza. Ora EH+GF è lo stesso che EF+GH. Dunque l'arco GH, che misura l'angolo A, è uguale ad una mezza-circonferenza meno il lato EF; parimente l'angolo B avrà per misura  $\frac{1}{2}$  circ. — DF, e l'angolo C  $\frac{1}{2}$  circ. — DE.

Questa proprietà dev'esser reciproca fra i due triangoli, giacchè si descrivono nella

stessa maniera l'uno col mezzo dell'altro. Perciò si troverà che gli angoli D, E, F del triangolo DEF hanno per misura rispettivamente  $\frac{1}{2}$  circ.  $\rightarrow$  BC,  $\frac{1}{2}$  circ.  $\rightarrow$  AC,  $\frac{1}{2}$  circ.  $\rightarrow$  AB. Infatti l'angolo D, per esempio, ha per misura l'arco MI: ora  $MI + BC = MC + BI = \frac{1}{2}$  circ. Dunque l'arco MI, misura dell'angolo D,  $= \frac{1}{2}$  circ.  $\rightarrow$  BC; e così degli altri.

*Scolio.* Bisogna osservare che oltre al triangolo DEF se ne potrebbero formare tre altri con l'intersezione dei tre archi DE, EF, DF. Ma la proposizione attuale non ha luogo che per il triangolo centrale, che è distinto dagli altri tre in questo che i due angoli A, e D Fig. 227. son situati da una medesima parte di BC, i due B, ed E da una medesima parte di AC, ed i due C, e F da una medesima parte di AB.

Si danno diversi nomi ai due triangoli ABC, DEF: noi gli chiameremo *triangoli polari*.

## PROPOSIZIONE XI.

## LEMMA

*Essendo dato il triangolo ABC, se dal polo A, e coll'intervallo AC si descriva l'arco di piccol circolo DEC; se dal polo B, e coll'intervallo BC si descriva parimente l'arco DFC; e dal punto D, ove gli archi DEC, DFC si taglieranno, si conducano gli archi di circolo grande AD, DB; dico che il triangolo ADB così formato avrà le sue parti uguali a quelle del triangolo ABC.* Fig. 229.

Poichè, per costruzione, il lato  $AD=AC$ ,  $DB=BC$ ,  $AB$  è comune; dunque questi triangoli hanno i lati rispettivamente uguali. Dico adesso che gli angoli opposti ai lati uguali sono uguali.

Infatti, se si suppone il centro della sfera in  $O$ , si può concepire un angolo solido formato al punto  $O$  dai tre angoli piani  $AOB$ ,  $AOC$ ,  $BOC$ ; si può concepir parimente un secondo angolo solido formato dai tre angoli piani  $AOB$ ,  $AOD$ ,  $BOD$ . E poichè i lati del triangolo  $ABC$  sono uguali a quelli del triangolo  $ABD$ , ne segue che gli angoli piani, che forman uno di questi angoli solidi, sono rispettivamente uguali agli angoli piani, che forman l'altro angolo solido. Ma

- \* 23, 5. in tal caso si è dimostrato \* che i piani, in cui sono gli angoli uguali, son ugualmente inclinati fra loro; dunque gli angoli del triangolo sferico  $DAB$  sono uguali a quelli del triangolo  $CAB$ , cioè  $DAB=BAC$ ,  $DBA=ABC$ , e  $ADB=ACB$ . Dunque i lati, e gli angoli del triangolo  $ADB$  sono uguali ai lati, e agli angoli del triangolo  $ACB$ .

*Scolio.* L'uguaglianza di questi triangoli non è però un'uguaglianza assoluta, o di sovrapposizione, perchè sarebbe impossibile d'applicar l'uno sull'altro esattamente, salvo che non fossero isosceli. L'uguaglianza, di cui si tratta, è quella, che abbiamo già chiamata uguaglianza di *simmetria*, e perciò chiameremo i triangoli  $ACB$ ,  $ADB$  *triangoli simmetrici*.



## PROPOSIZIONE XII.

## TEOREMA

*Due triangoli situati sopra la medesima sfera, o sopra sfere uguali, sono uguali in tutte le loro parti quando hanno un angolo uguale compreso fra lati rispettivamente uguali.*

Sia il lato  $AB=EF$ , il lato  $AC=EG$ , e Fig. 230. l'angolo  $BAC=FEG$ ; il triangolo  $EFG$  potrà esser situato sopra il triangolo  $ABC$ , o sul suo simmetrico  $ABD$  nella medesima maniera che si soprappongono due triangoli rettilinei, che hanno un angolo uguale compreso fra lati uguali. Dunque tutte le parti del triangolo  $EFG$  saranno uguali a quelle del triangolo  $ABC$ , cioè, oltre le tre parti, che sono supposte uguali, si avrà il lato  $BC=FG$ , l'angolo  $ABC=EFG$ , e l'angolo  $ACB=EGF$ .

## PROPOSIZIONE XIII.

## TEOREMA

*Due triangoli situati sopra la medesima sfera, o sopra sfere uguali, sono uguali in tutte le loro parti quando hanno un lato uguale adjacente a due angoli rispettivamente uguali.*

Poichè uno di questi triangoli può essere situato sopra l'altro, o sul suo simmetrico, come si è spiegato nel caso simile dei triangoli rettilinei. *Ved. la Prop. VII. del Lib. I.*

## PROPOSIZIONE XIV.

## TEOREMA

*Se due triangoli situati sulla medesima sfera, o sopra sfere uguali, sono equilateri fra loro, saranno anche equiangoli, e gli angoli uguali saranno opposti ai lati uguali.*

Fig. 129. Ciò è manifesto per la Prop. XI., ove si è veduto che con tre lati dati  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  non si può fare che due triangoli  $ACB$ ,  $ABD$  differenti in quanto alla posizione delle parti, ma uguali in quanto alla grandezza di queste medesime parti. Dunque due triangoli equilateri fra loro sono o assolutamente uguali, o almeno uguali per simmetria; in ambedue i casi sono equiangoli, e gli angoli uguali sono opposti ai lati uguali.

## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA

*In ogni triangolo sferico isoscele gli angoli opposti ai lati uguali sono uguali; e reciprocamente, se due angoli d' un triangolo sferico son uguali, il triangolo sarà isoscele.*

Fig. 131. 1.° Sia il lato  $AB=AC$ ; dico che si avrà l'angolo  $C=B$ ; poichè, se dal vertice  $A$  al punto  $D$ , mezzo della base, si conduce l'arco  $AD$ , i due triangoli  $ABD$ ,  $ADC$  avranno i tre lati rispettivamente uguali, cioè  $AD$  comune,  $BD=DC$ , e  $AB=AC$ ; dunque, per il teorema precedente, questi triangoli avranno gli angoli uguali, e si avrà  $B=C$ .

2.° Sia l'angolo  $B=C$ ; dico che sarà  $AC=$

AB: poichè, se il lato AB non è uguale ad AC, sia AB il più grande di essi; prendete  $BO=AC$ , e tirate OC. I due lati BO, BC sono uguali ai due lati AC, BC; l'angolo compreso dai primi OBC è uguale all'angolo compreso dai secondi ACB. Dunque i due triangoli BOC, ACB hanno le altre parti uguali\*, e per conseguenza l'angolo OCB  $\equiv$   $\angle$  ABC: ma l'angolo ABC, per supposizione,  $\equiv$  ACB; dunque si avrebbe  $OCB \equiv ACB$ ; il che è impossibile. Dunque non si può supporre AB differente da AC; dunque i lati AB, AC opposti agli angoli uguali C, e B sono uguali.

*Scolio.* La medesima dimostrazione prova che l'angolo  $BAD \equiv DAC$ , e l'angolo  $BDA \equiv ADC$ . Dunque questi due ultimi sono retti: dunque l'arco condotto dal vertice d'un triangolo sferico isoscele al mezzo della sua base è perpendicolare a questa base, e divide l'angolo al vertice stesso in due parti uguali.

## PROPOSIZIONE XVI.

## TEOREMA

In un triangolo sferico ABC, se l'angolo A Fig. 232. è maggiore dell'angolo B, il lato BC opposto all'angolo A sarà maggiore del lato AC opposto all'angolo B: reciprocamente, se il lato BC è maggiore di AC, l'angolo A sarà maggiore dell'angolo B.

1.º Sia l'angolo  $A > B$ ; fate l'angolo  $BAD \equiv B$ , avrete  $AD \equiv DB$  \*; ma  $AB > DC$  \* 15.

è maggiore di AC; invece di AD mettèndo DB, si avrà  $DB+DC$ , o  $BC > AC$ .

2.<sup>o</sup> Se si suppone  $BC > AC$ , dico che l'angolo BAC sarà maggiore di ABC. Poichè, se BAC fosse uguale ad ABC, si avrebbe  $BC=AC$ ; e, se fosse  $BAC < ABC$ , ne nascerebbe secondo ciò, che si è dimostrato,  $BC < AC$ ; il che è contro la supposizione. Dunque BAC è maggiore di ABC.

### PROPOSIZIONE XVII.

#### TEOREMA

Fig. 233. *Se i due lati AB, AC del triangolo sferico ABC sono uguali ai due lati DE, DF del triangolo DEF fatto sopra una sfera uguale; se nello stesso tempo l'angolo A è maggiore dell'angolo D; dico che il terzo lato BC del primo triangolo sarà maggiore del terzo EF del secondo triangolo.*

La dimostrazione è assolutamente simile a quella della Prop. X., Lib. I.

### PROPOSIZIONE XVIII.

#### TEOREMA

*Se due triangoli descritti sulla medesima sfera, o sopra sfere uguali, sono equiangoli fra di loro, saranno anche equilateri.*

Siano A,\* e B i due triangoli dati; P, e Q i loro triangoli polari. Poichè gli angoli sono uguali nei triangoli A, e B, i lati saranno uguali nei polari P, e Q\*. Ma dall'essere i triangoli P, e Q equilateri fra loro ne segue \* 10. che sono ancora equiangoli\*. Finalmente \* 14.

dall' essere uguali gli angoli ne' triangoli  $P$ , e  $Q$  ne segue \* che i lati sono uguali nei loro polari  $A$ , e  $B$ . Dunque i triangoli equiangoli  $A$ , e  $B$  sono nel medesimo tempo equilateri fra di loro.

Si può ancor dimostrare la medesima proposizione senza il soccorso dei triangoli polari.

Siano  $ABC$ ,  $DEF$  due triangoli equiangoli fra loro, talmente che sia  $A=D$ ,  $B=E$ ,  $C=F$ ; dico che sarà il lato  $AB=DE$ ,  $AC=DF$ ,  $BC=EF$ . Fig. 234.

Sul prolungamento dei lati  $AC$ ,  $AB$  prendete  $AG=DE$ , e  $AH=DF$ ; tirate  $GH$ , e prolungate gli archi  $BC$ ,  $GH$  finchè s'incontrino in  $I$ , e  $K$ .

I due lati  $AG$ ,  $AH$  sono, per costruzione, uguali ai due  $DE$ ,  $DF$ ; l'angolo compreso  $GAH=BAC=EDF$ ; dunque \* i triangoli  $AGH$ ,  $DEF$  sono uguali in tutte le loro parti, e si ha l'angolo  $AGH=DEF=ABC$ , e l'angolo  $AHG=DFE=ACB$ .

Nei triangoli  $IBG$ ,  $KBG$  il lato  $BG$  è comune, l'angolo  $IGB=GBK$ ; e poichè  $IGB+BGK$  è uguale a due retti, come pure  $GBK+IBG$ , ne segue che  $BGK=IBG$ . Dunque i triangoli  $IBG$ ,  $GBK$  sono uguali \*, e si ha  $IG=BK$ , ed  $IB=GK$ .

Parimente dall' essere l'angolo  $AHG=ACB$ , si conchiuderà che i triangoli  $ICH$ ,  $HCK$  hanno un lato uguale adjacente a due angoli uguali. Dunque sono uguali; dunque  $IH=CK$ , e  $HK=IC$ .

Adesso, se dalle uguali  $BK$ ,  $IG$  si tolgono le uguali  $CK$ ,  $IH$ , i resti  $BC$ ,  $GH$  saranno uguali. D'altronde l'angolo  $BCA = AHG$ , e l'angolo  $ABC = AGH$ . Dunque i triangoli  $ABC$ ,  $AHG$  hanno un lato uguale adjacente a due angoli uguali; dunque sono uguali. Ma il triangolo  $DEF$  è uguale in tutte le sue parti al triangolo  $AHG$ ; dunque è uguale anche al triangolo  $ABC$ , e si avrà  $AB = DE$ ,  $AC = DF$ ,  $BC = EF$ . Dunque, se due triangoli sferici sono uguali fra loro, i lati opposti agli angoli uguali saranno uguali.

*Scolio.* Questa proposizion non ha luogo nei triangoli rettilinei, ove dall'uguaglianza degli angoli non si può dedurre altro che la proporzionalità rispettiva dei lati. Ma è facile di concepire la differenza, che passa rapporto a ciò tra i triangoli rettilinei, ed i triangoli sferici. Nella proposizione presente, come pure nelle proposizioni 12, 13, 14, e 17, ove si tratta del paragon dei triangoli, si dice espressamente che questi triangoli son descritti sulla medesima sfera, o sopra sfere uguali. Ora gli archi simili sono proporzionali ai raggi; dunque sopra sfere uguali due triangoli non possono esser simili senza essere uguali. Non fa meraviglia dunque che l'uguaglianza degli angoli porti seco l'uguaglianza dei lati.

Sarebbe altrimenti se i triangoli fosser descritti sopra sfere disuguali: allora, essendo uguali gli angoli, i triangoli sarebbero si-

mili, e i lati omologhi sarebber fra loro come i raggi delle sfere.

## PROPOSIZIONE XIX.

## TEOREMA

*La somma degli angoli d'ogni triangolo sferico è minore di sei, e maggiore di due angoli retti.*

Poichè 1.<sup>o</sup> ciascun angolo d'un triangolo sferico è minore di due angoli retti (*vedete lo scolio seguente*); dunque la somma dei tre angoli è minore di sei angoli retti.

2.<sup>o</sup> La misura di ciascun angolo d'un triangolo sferico è uguale alla mezza-circonferenza meno il lato corrispondente del triangolo polare \*. Dunque la somma dei tre angoli ha per misura tre mezza-circonferenze meno la somma dei lati del triangolo polare. Ora quest' ultima somma è minore di una circonferenza \*; dunque togliendola da tre mezza-circonferenze, resterà più d'una mezza-circonferenza, che è la misura di due angoli retti. Dunque 2.<sup>o</sup> la somma dei tre angoli di un triangolo sferico è maggiore di due angoli retti. <sup>10.</sup> <sup>4.</sup>

*Corollario I.* La somma degli angoli d'un triangolo sferico non è costante come quella dei triangoli rettilinei; varia da due angoli retti fino a sei, senza poter essere uguale nè all'uno, nè all'altro limite. Quindi è che due angoli dati non fan conoscere il terzo.

*Corollario II.* Un triangolo sferico può

avere due, o tre angoli retti, due o tre angoli ottusi.

Fig. 235. Se il triangolo ABC è *bi-rettangolo*, cioè se ha due angoli retti B, e C, il vertice A sarà il polo della base BC \*, ed i lati AB, AC saranno *quadranti*.

\* 6.

Se in oltre l'angolo A è retto, il triangolo ABC sarà *tri-rettangolo*, i suoi angoli saranno tutti retti, ed i suoi lati *quadranti*. Il triangolo *tri-rettangolo* è contenuto otto volte nella superficie della sfera, il che si vede per mezzo della fig. 236. supponendo l'arco MN uguale a un *quadrante*.

*Scolio.* Abbiamo supposto in tutto ciò, che precede, e conforme alla definizione 6., che i triangoli sferici hanno i. loro lati sempre minori della mezza-circonferenza; allora ne segue che gli angoli son sempre minori di due angoli retti. Perchè, se il lato AB è minore della mezza-circonferenza, come pure AC, questi archi deggiono essere prolungati ambedue per incontrarsi in D. Ora i due angoli ABC, CBD presi insieme equivalgono a due angoli retti; dunque l'angolo ABC solo è minore di due angoli retti.

Fig. 224.

Osserveremo però ch'esistono dei triangoli sferici, di cui certi lati son maggiori della circonferenza, e certi angoli son maggiori di due angoli retti. Perchè, se si prolunga il lato AC in una circonferenza intera ACE, ciò che resta togliendo dalla mezza-sfera il triangolo ABC, è un nuovo triangolo, che si può pure indicare con ABC, e i di cui lati



sono  $AB$ ,  $BC$ ,  $AEC$ . Si vede dunque che il lato  $AEC$  è maggiore della mezza-circonferenza  $AED$ ; ma nel medesimo tempo l'angolo opposto in  $B$  supera due angoli retti della quantità angolare  $CBD$ .

Del resto si sono esclusi dalla definizione i triangoli, i cui lati, ed angoli sono sì grandi, perchè la loro risoluzione, o la determinazione delle lor parti si riduce sempre a quella dei triangoli compresi nella definizione suddetta. Infatti si vede facilmente che, se si conoscono gli angoli, e i lati del triangolo  $ABC$ , si conosceranno immediatamente gli angoli, e i lati del triangolo, ch'è il resto della mezza-sfera.

## PROPOSIZIONE XX.

## TEOREMA

*Il fuso  $AMBNA$  stà alla superficie della sfera come l'angolo  $MAN$  di questo fuso stà a quattro angoli retti, o come l'arco  $MN$ , che misura quest'angolo, stà alla circonferenza.* Fig. 236.

Supponiamo primieramente che l'arco  $MN$  stia alla circonferenza  $MNPQ$  in un rapporto razionale, per esempio, come 5 stà a 48. Si dividerà la circonferenza  $MNPQ$  in 48 parti uguali, di cui  $MN$  ne conterrà 5; congiungendo dipoi il polo  $A$ , ed i punti di divisione con altrettanti quarti di circonferenza, si avranno 48 triangoli nella mezza-sfera  $AMNPQ$ , che saranno tutti uguali fra loro, poichè avranno tutte le loro parti ugua-

li. La sfera intera conterrà dunque 96 di tali triangoli parziali, ed il fuso  $AMBNA$  ne conterrà 10; dunque il fuso stà alla superficie della sfera come 10 stà a 96, o come 5 stà 48, cioè, come l'arco  $MN$  stà alla circonferenza.

Se l'arco  $MN$  non fosse commensurabile colla circonferenza, si proverà collo stesso ragionamento, di cui si son già veduti molti esempi, che il fuso stà sempre alla superficie della sfera come l'arco  $MN$  stà alla circonferenza.

*Corollario I.* Due fusi stanno fra loro come i loro angoli rispettivi.

\* 19. *Corollario II.* Si è già veduto che la superficie intera della sfera è uguale a otto triangoli tri-rettangoli \*. Dunque, se si prende per unità l'area d'uno di questi triangoli, la superficie della sfera sarà rappresentata da 8. Posto ciò, la superficie del fuso, il cui angolo è  $A$ , sarà espressa da  $2A$  (se però l'angolo  $A$  è valutato nella supposizione che l'angolo retto sia uguale all'unità); poichè si ha  $2A : 8 :: A : 4$ . Vi sono quì dunque due unità differenti; una per gli angoli, ed è l'angolo retto; l'altra per le superficie, ed è il triangolo sferico tri-rettangolo, ossia quello, di cui tutti gli angoli sono retti, e i lati son quarte parti di circonferenza.

*Scolio.* L'unghia sferica compresa fra i piani  $AMB$ ,  $ANB$  stà al solido interno della sfera come l'angolo  $A$  stà a quattro angoli

retti. Poichè, essendo uguali i fusi, le unghie sferiche saranno parimente uguali: Dunque due unghie sferiche stanno fra loro come i loro angoli formati dai piani, che le comprendono.

## PROPOSIZIONE XXI.

## T E O R E M A

*Due triangoli sferici simmetrici sono eguali in superficie.*

Sieno  $ABC$ ,  $DEF$  due triangoli simmetrici-*Fig. 237.* ei, vale a dir due triangoli, che hanno i lati eguali, cioè  $AB=DE$ ,  $AC=DF$ ,  $BC=EF$ , e che frattanto non posson essere sovrapposti; dico che la superficie  $ABC$  è eguale alla superficie  $DEF$ .

Sia  $P$  il polo del piccol circolo, che passerebbe per i tre punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$  (1); dal punto  $P$  sien condotti gli archi eguali  $PA$ ,  $PB$ ,  $PC$ ; al punto  $F$  fate l'angolo  $DFQ=ACP$ , l'arco  $FQ=CP$ , e tirate  $DQ$ ,  $EQ$ .

I lati  $DF$ ,  $FQ$  sono eguali ai lati  $AC$ ,  $CP$ ; l'angolo  $DFQ=ACP$ ; dunque i due triangoli  $DFQ$ ,  $ACP$  sono eguali in tutte le loro parti\*; dunque il lato  $DQ=AP$ , e\* 12. l'angolo  $DQF=APC$ .

(1) Il circolo, che passa per i tre punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , o ch'è circoscritto al triangolo  $ABC$ , non può essere che un piccol circolo della sfera; perchè, se questo fosse un gran circolo, i tre lati  $AB$ ,  $BC$ ,  $AC$  sarebbero situati in un medesimo piano, e il triangolo  $ABC$  si ridurrebbe ad un dei suoi lati.

\* 11. Nei triangoli divisati DFE, ABC gli angoli DFE, ACB opposti ai lati eguali DE, AB sono eguali; \* se si tolgono gli angoli DFQ, ACP, eguali per costruzione, resterà l'angolo QFE eguale a PCB. D'altronde i lati QF, FE sono eguali ai lati PC, CB; dunque i due triangoli FQE, CPB son eguali in tutte le loro parti; dunque il lato  $QE=PB$ , e l'angolo  $FQE=CPB$ .

Se si osserva adesso che i triangoli DFQ, ACP, che hanno i lati rispettivamente eguali, son nel medesimo tempo isosceli, si vedrà che posson essere sovrapposti l'uno all'altro; perchè, avendo situato PA sopra il suo eguale QF, il lato PC cadrà sopra il suo eguale QD, e così i due triangoli si confonderanno in un solo; dunque sono eguali; dunque la superficie  $DQF=APC$ . Per una simil ragione, la superficie  $FQE=CPB$ , e la superficie  $DQE=APB$ ; dunque si ha  $DQF+FQE=DQE=APC+CPB=APB$ , ovvero  $DFE=ABC$ ; dunque i due triangoli simmetrici ABC, DEF sono eguali in superficie.

*Scolio.* I poli P, e Q potrebbero essere situati dentro ai triangoli ABC, DEF; allora bisognerebbe aggiungere i tre triangoli DQF, FQE, DQE affin di comporne il triangolo DEF, e similmente bisognerebbe aggiungere i tre triangoli APC, CPB, APB per comporne il triangolo ABC; d'altronde la dimostrazione, e la conclusione sarebbero sempre le stesse.

PROPOSIZIONE XXII.

TEOREMA

*Se due gran cerchi AOB, COD si tagliano come si voglia nell' emisfero AOCBD, la somma dei triangoli opposti AOC, BOD sarà uguale al fuso, il cui angolo è BOD.* Fig. 238.

Poichè, prolungando gli archi OB, OD nell' altro emisfero finchè s'incontrino in N, OBN sarà una mezza-circonferenza, come pure AOB; togliendo OB da ambedue, si avrà  $BN=AO$ . Per una simil ragione  $DN=CO$ , e  $BD=AC$ . Dunque i due triangoli AOC, BDN hanno i tre lati uguali; d'altronde la lor posizione è tale ch'essi sono simmetrici l' uno dell' altro; dunque sono eguali in superficie\*, e la somma dei triangoli AOC, BOD è equivalente al fuso OBND, il cui angolo è BOD. 21.

*Scolio.* È chiaro pure che le due piramidi sferiche, che hanno per base i triangoli AOC, BOD, prese insieme equivalgono all' unghia sferica, il di cui angolo è BOD.

PROPOSIZIONE XXIII.

TEOREMA

*La superficie d' un triangolo sferico qualunque ha per misura l' eccesso della somma dei suoi tre angoli sopra due angoli retti.*

Sia ABC il triangolo proposto; prolungate i suoi lati finchè incontrino il gran circolo DEFG condotto a piacere fuor del triangolo. Per il teorema precedente i due triangoli Fig. 239.

ADE, AGH presi insieme equivalgono al  
 fuso, il cui angolo è A, e che ha per misura  
 2A \*. Laonde si avrà  $ADE + AGH = 2A$ ;  
 per una simil ragione  $BGF + BID = 2B$ ,  $CIH$   
 + CFE = 2C. Ma la somma di questi sei trian-  
 goli supera la mezza-sfera di due volte il  
 triangolo ABC; d'altronde la mezza-sfera è  
 rappresentata da 4; dunque il doppio del  
 triangolo ABC è uguale a  $2A + 2B + 2C - 4$ ,  
 e per conseguenza  $ABC = A + B + C - 2$ . Dun-  
 que un triangolo sferico ha per misura la  
 somma dei suoi angoli meno due angoli retti.

Corollario I. Quanti angoli retti vi saran-  
 no in tal misura, altrettanti triangoli tri-ret-  
 tangoli, od ottave parti di sfera, cia-scuna  
 delle quali è l'unità di superficie \*, saranno  
 contenute nel triangol proposto. Per esem-  
 pio, se gli angoli sono tutti uguali a  $\frac{1}{3}$  d'un  
 angolo retto, allora i tre angoli varranno 4  
 angoli retti, ed il triangolo proposto sarà  
 rappresentato da  $4 - 2$ , o 2; dunque sarà  
 uguale a due triangoli tri-rettangoli, o alla  
 quarta parte della superficie della sfera.

Corollario II. Il triangolo sferico ABC è  
 equivalente al fuso, il cui angolo è  $\frac{A+B+C}{2}$   
 — 1; ed anche la piramide sferica, la cui base  
 è AEC, equivale all'unglia sferica, il di  
 cui angolo è  $\frac{A+B+C}{2} - 1$ .

Scolio. Nello stesso tempo che si paragona  
 il triangolo sferico ABC al triangolo tri-ret-  
 tangolo, la piramide sferica, che ha per base

ABC, si paragona, e segue la medesima proporzione colla piramide tri-rettangola. L'angolo solido al vertice della piramide si paragona parimente coll'angolo solido al vertice della piramide tri-rettangola. Infatti il paragone si stabilisce per mezzo della coincidenza delle parti. Ora, se le basi delle piramidi coincidono, è chiaro che le piramidi stesse coincideranno, come pure gli angoli al loro vertice. Da ciò nascono più conseguenze.

1.<sup>o</sup> Due piramidi triangolari sferiche stanno fra loro come le loro basi; e poichè una piramide poligona si può dividere in più piramidi triangolari, ne segue che due piramidi sferiche qualunque stanno fra loro come i poligoni, che servono ad esse di basi.

2.<sup>o</sup> Gli angoli solidi al vertice delle medesime piramidi stanno ugualmente nella proporzione delle basi. Dunque, per paragonare due angoli solidi qualunque, bisogna situare i loro vertici al centro di due sfere uguali; e questi angoli solidi saranno fra loro come i poligoni sferici intercetti fra i loro piani o facce.

L'angolo al vertice della piramide tri-rettangola è formato da tre piani perpendicolari fra loro. Quest'angolo, che si può chiamare *angolo solido retto*, è adattatissimo per servire d'unità di misura agli altri angoli solidi. Posto ciò, il medesimo numero, che dà l'area del poligono sferico, darà la misura dell'angolo solido corrispondente. Per esempio, se l'area del poligono sferico è  $\frac{3}{4}$ ,

vale a dire, se è uguale a  $\frac{3}{4}$  del triangolo tri-rettangolo, l'angolo solido corrispondente sarà pure  $\frac{3}{4}$  dell'angolo solido retto.

## PROPOSIZIONE XXIV.

## TEOREMA

*La superficie d'un poligono sferico ha per misura la somma dei suoi angoli meno il prodotto di due angoli retti per il numero dei lati del poligono meno due.*

Fig. 240.

Da un medesimo vertice A siano condotte a tutti gli altri vertici le diagonali AC, AD; il poligono ABCDE sarà diviso in tanti triangoli meno due quanti lati egli contiene. Ma la superficie di ciascun triangolo ha per misura la somma dei suoi angoli meno due angoli retti; ed è chiaro che la somma di tutti gli angoli dei triangoli è uguale alla somma degli angoli del poligono. Dunque la superficie del poligono è uguale alla somma dei suoi angoli meno tante volte due angoli retti quanti sono i suoi lati men due.

*Scolio.* Sia  $s$  la somma degli angoli d'un poligono sferico,  $n$  il numero dei suoi lati; essendo supposto l'angolo retto per unità, la superficie del poligono avrà per misura  $s-2(n-2)$ , o  $s-2n+4$ .

## PROPOSIZIONE XXV.

## TEOREMA

*Sia S il numero degli angoli solidi d'un poliedro, H il numero delle sue facce; A il numero delle sue costole o spigoli; dico che sarà sempre  $S+H=A+2$ .*



Prendete dentro il polièdro, un punto da cui condurrete delle linee rette ai vertici di tutti gli angoli solidi; immaginate dipoi che dal medesimo punto, come centro, si descriva una superficie sferica, che sia incontrata da tutte queste linee in altrettanti punti; congiungete questi punti con archi di circoli grandi, in modo che si formino sulla superficie della sfera i poligoni corrispondenti, ed uguali in numero alle facce del poliedro. Sia  $ABCDE$  uno di questi poligoni, e sia  $n$  Fig. 240. il numero dei suoi lati; la sua superficie sarà  $s - 2n + 4$ , essendo  $s$  la somma degli angoli  $A, B, C, D, E$ . Se si valuti similmente la superficie di ciascuno degli altri poligoni sferici, e si sommino tutti insieme, se ne conchiuderà che la loro somma, o la superficie della sfera rappresentata da  $S$ , è uguale alla somma di tutti gli angoli dei poligoni meno due volte il numero dei loro lati, più 4 preso tante volte quante sono le facce. Ora, siccome tutti gli angoli formati intorno ad un medesimo punto  $A$  equivalgono a quattro angoli retti, la somma di tutti gli angoli dei poligoni è uguale a 4 preso tante volte quanti angoli solidi vi sono; è dunque uguale a  $4S$ . Dipiù il doppio del numero dei lati  $AB, BC, CD$ , ec. è uguale al quadruplo del numero delle costole, o  $= 4A$ ; giacchè la medesima costola serve di lato a due facce. Dunque si avrà  $8 = 4S - 4A + 4H$ ; e, prendendo la quarta parte di ciascun membro,  $2 = S - A + H$ ; dunque  $S + H = A + 2$ .

*Corollario.* Segue da ciò che la somma degli angoli piani, che formano gli angoli solidi d'un poliedro, è uguale a tante volte quattro angoli retti quante unità sono in  $S-2$ , essendo  $S$  il numero degli angoli solidi del poliedro.

Poichè, se si considera una faccia, il cui numero di lati sia  $n$ , la somma degli angoli di questa faccia sarà  $2n-4$  angoli retti \*. Ma la somma di tutti i  $2n$ , o il doppio del numero dei lati di tutte le facce,  $=4A$ , e 4 preso tante volte quante sono le facce  $=4H$ ; dunque la somma degli angoli di tutte le facce  $=4A-4H$ . Ora, per il teorema, che abbiamo già dimostrato, si ha  $A-H=S-2$ , e per conseguenza  $4A-4H=4(S-2)$ . Dunque la somma degli angoli piani ec.

## PROPOSIZIONE XXVI.

## TEOREMA

*Fig. 241. a*  
*e 241. b* Di tutti i triangoli sferici formati con due lati dati  $CB, CA$ , ed un terzo a piacimento, il più grande  $ABC$  è quello, nel quale l'angolo  $C$ , compreso tra i lati dati, è uguale alla somma degli altri due angoli  $A$ , e  $B$ .

Prolungate i due lati  $AC, AB$  fino al loro incontro in  $D$ ; avrete un triangolo sferico  $BCD$ , nel quale l'angolo  $DBC$  sarà parimente eguale alla somma degli altri due  $BDC, BCD$ ; perchè  $BCD+BCA$  essendo eguale a due angoli retti, come pure  $CBA+CBD$ , si ha  $BCD+BCA=CBA+CBD$ ; aggiungendo da una parte e dall'altra  $BDC=BAC$ , si

avrà  $BCD + BCA + BDC = CBA + CBD + BAC$ .  
Ora, per ipotesi,  $BCA = CBA + BAC$ ; dunque  $GBD = BCD + BDC$ .

Conducete adesso  $BI$ , che faccia l'angolo  $GBI = BCD$ , e per conseguenza  $IBD = BDC$ ; i due triangoli  $IBC$ ,  $IBD$  saranno isosceli, e si avrà  $IC = IB = ID$ ; dunque il punto  $I$ , mezzo di  $BC$ , è ad egual distanza dai tre punti  $B$ ,  $C$ ,  $D$ : per una simil ragione, il punto  $O$ , mezzo di  $AB$ , sarà egualmente distante dai tre punti  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .

Sia ora  $CA' = CA$ , e l'angolo  $BCA' > BCA$ ; Fig. 24.    
se si tiri  $AB$ , e si prolunghino gli archi  $A'C$ ,  $A'B$  fino al loro incontro in  $D'$ , l'arco  $D'CA'$  sarà una mezza - circonferenza, come pure  $DCA$ ; dunque, poichè si ha  $CA' = CA$ , si avrà ancora  $CD' = CD$ . Ma nel triangolo  $CID'$  si ha  $CI + ID' > CD'$ ; dunque  $ID' > CD - CI$ , o  $ID' > ID$ .

Nel triangolo isoscele  $CIB$  dividete l'angolo del vertice  $I$  in due parti eguali con l'arco  $EIF$ , che sarà perpendicolare sopra il mezzo di  $BC$ . Se si prende un punto  $L$  tra  $I$ , ed  $E$ , la distanza  $BL$ , eguale a  $LC$ , sarà minor di  $BI$ ; perchè si può dimostrare, come nella Proposizione IX. Lib. I., che si ha  $BL + LC < BI + IC$ ; dunque, prendendo le metà da una parte e dall'altra, si avrà  $BL < BI$ . Ma nel triangolo  $D'LC$  si ha  $D'L > D'C - CL$ , ed a maggior ragione  $D'L > DC - CI$ , o  $D'L > DI$ , o  $D'L > BI$ , o  $D'L > BL$ . Dunque, se si cerca sopra l'arco  $EIF$  un punto egualmente distante dai tre punti  $B$ ,  $C$ ,  $D$ , questo punto non potrebbe trovarsi

che sul prolungamento di EI verso F. Sia I' il punto cercato, di modo che s'abbia  $D'I' = BI' = CI'$ ; i triangoli  $I'CB$ ,  $I'CD'$ ,  $I'BD'$  essendo isosceli, si avranno gli angoli eguali, cioè,  $I'BC = I'CB$ ,  $I'BD' = I'D'B$ ,  $I'CD' = I'D'C$ . Ma gli angoli  $D'BC + CBA'$  equivalgono a due angoli retti, come ancora  $D'CB + BCA'$ ; dunque

$$D'BI' + I'BC + CBA' = 2,$$

$$BCI' - I'CD' + BCA' = 2.$$

Aggiungendo le due somme, e osservando che si ha  $I'BC = BCI'$ , e  $D'BI' - I'CD' = BD'I' - I'D'C = CD'B = CA'B$ , si avrà

$$2I'BC + CA'B + CBA' + BCA' = 4.$$

Dunque  $CA'B + CBA' + BCA' = 2$  (misura dell'area del triangolo  $A'BC$ )  $= 2 - 2$  angoli  $I'BC$ , di modo che si ha *area*  $A'BC = 2 - 2$  *angolo*  $I'BC$ ; similmente nel triangolo  $ABC$  si avrebbe  $ABC = 2 - 2$  *angolo*  $IBC$ . Ora si è dimostrato che l'angolo  $I'BC$  è maggiore di  $IBC$ ; dunque l'area  $A'BC$  è minore di  $ABC$ .

**F. 241. a.** La medesima dimostrazione e conclusione avrebbero luogo se, prendendo sempre l'arco  $CA' = CA$ , si facesse l'angolo  $BCA' < BCA$ ; dunque  $ABC$  è il triangolo il più grande tra tutti quelli, che hanno due lati dati, ed il terzo a piacere.

**Fig. 241.** *Scolio I.* Il triangolo  $ABC$ , più grande tra tutti quelli, che hanno due lati dati  $CA$ ,  $CB$ , può essere iscritto in un mezzo-circolo, di cui la corda del terzo lato  $AB$  sarà il diametro; perchè,  $O$  essendo il mezzo di  $AB$ , si è veduto che le distanze  $OC$ ,  $OB$  sono eguali; dunque la circonferenza del piccol cir-

colo descritto dal punto O, come polo, e con l'intervallo OB, passerà pe' i tre punti A, B, C. Di più la linea retta BA è un diametro di questo piccol circolo; poichè il centro, che dee trovarsi ad un tempo nel piano di questo piccol circolo, e nel piano dell'arco di circolo grande \* BCA, si troverà necessariamente nell'intersezione di questi due piani, ch'è la retta BA; e così BA sarà un diametro. \* Pr. 1.  
Cor 4.

II. Nel triangolo ABC l'angolo C essendo eguale alla somma degli altri due A, e B, ne segue che la somma dei tre angoli è eguale al doppio dell'angolo C. Ma questa somma è sempre maggiore di due angoli retti \*; \* 19. dunque l'angolo C è maggiore d'un retto.

III. Se si prolungano i lati CB, AC finchè s'incontrino in E, il triangolo BAE sarà uguale alla quarta parte della superficie della sfera. Poichè l'angolo  $E = C = ABC + CAB$ ; dunque i tre angoli del triangolo BAE equivalgono ai quattro ABC, ABE, CAB, BAE, la di cui somma è 4 angoli retti. Dunque la superficie del triangolo  $BAE^* = 4 - 2 = 2$ , \* 24. che è la quarta parte della superficie della sfera.

IV. Non vi sarebbe luogo a *massimo* se la somma dei due lati dati AC, BC fosse uguale, o maggiore d'una mezza-circonferenza d'un gran circolo; poichè, siccome il triangolo ABC debb'essere iscritto in un mezzo-circolo della sfera, bisogna che la somma dei due lati CB, AC sia minore della mezza-

- \* 3. circonferenza  $BCA^*$ , e per conseguente minore della mezza-circonferenza d'un gran circolo.

La ragione, per cui non vi è *massimo* quando la somma dei due lati dati è maggiore della mezza-circonferenza d'un gran circolo, si è perchè allora il triangolo va crescendo a misura che l'angolo compreso fra' lati dati è più grande. Finalmente, quando quest'angolo sarà uguale a due retti, i tre lati saranno in uno stesso piano, e formeranno una circonferenza intera: il triangolo sferico diventerà dunque uguale alla mezza-sfera, ma cesserà allora d'esser triangolo.

### PROPOSIZIONE XXVII.

#### TEOREMA

*Di tutti i triangoli sferici formati con un lato dato, ed un perimetro dato, il più grande è quello, in cui i due lati non determinati sono uguali.*

Fig. 242. Sia  $AB$  il lato dato comune ai due triangoli  $ACB$ ,  $ADB$ , e sia  $AC+CB=AD+DB$ ; dico che il triangolo isoscele  $ACB$ , nel quale  $AC=CB$ , è maggiore del non-isoscele  $ADB$ .

Poichè, avendo questi triangoli la parte comune  $AOB$ , basta di far vedere che il triangolo  $BOD$  è minore di  $AOC$ . L'angolo  $CBA$  uguale a  $CAB$  è maggiore di  $OAB$ ,  
 \* 16. onde il lato  $AO$  è maggiore di  $OB^*$ ; prendete  $OI=OB$ ; fate  $OK=OD$ ; e tirate  $KI$ :  
 \* 21. il triangolo  $OKI$  sarà uguale a  $DOB^*$ . Se si nega adesso che il triangolo  $DOB$ , o il

suo uguale KOI sia minore di OAC, bisognerà che sia uguale, o maggiore; in ambedue i casi, siccome il punto I è fra i punti A e O, bisognerà che il punto K sia sopra OC prolungato; altrimenti il triangolo OKI sarebbe contenuto nel triangolo CAO, e perciò sarebbe minore. Posto ciò, essendo CA il più corto cammino da C ad A, si ha  $CK + KI + IA > CA$ . Ma  $CK = OD - CO$ ,  $AI = AO - OB$ ,  $KI = BD$ ; dunque  $OD - CO + AO - OB + BD > CA$ , e riducendo  $AD - CB + BD > CA$ , o  $AD + BD > AC + CB$ . Ora questa disuguaglianza è contraria alla supposizione  $AD + BD = AC + CB$ ; dunque il punto K non può cadere sul prolungamento di OC; dunque cade fra O e C, e per conseguenza il triangolo KOI, o il suo uguale ODB è minore di ACO: dunque il triangolo isoscele ACB è maggiore del non-isoscele ADB della medesima base, e dello stesso perimetro.

*Scolio.* Queste due ultime proposizioni sono analoghe alle Proposizioni I. e III. dell'Appendice al Libro IV; onde si posson dedurre per rapporto ai poligoni sferici le conseguenze, che han luogo pe' i poligoni rettilinei. Ecco le principali.

1.<sup>o</sup> *Di tutti i poligoni sferici isoperimetri, e d'un medesimo numero di lati, il maggiore è un poligono equilatero.*

2.<sup>o</sup> *Di tutti i poligoni sferici formati con lati dati, e un ultimo a piacimento, il più grande è quello, che si può iscrivere in un mezzo-circolo, di cui la corda del lato non*

determinato è il diametro. Perchè sia possibile la soluzione bisogna che la somma dei lati dati sia minore d'una mezza-circonferenza di circolo grande.

3.<sup>o</sup> Il maggiore dei poligoni sferici formati con lati dati è quello, che si può iscrivere in un circolo della sfera.

4.<sup>o</sup> Il maggiore dei poligoni sferici, che hanno lo stesso perimetro, e il medesimo numero di lati, è quello, che ha i suoi angoli eguali, e parimente i suoi lati eguali.

Tutte le Proposizioni sul massimo, riguardanti i poligoni sferici, si applicano agli angoli solidi, di cui tali poligoni son la misura.

## APPENDICE AI LIBRI VI. E VII.

### I POLIÈDRI REGOLARI

#### PROPOSIZIONE I.

##### TEOREMA

*Non posson esservi che cinque polièdri regolari.*

Poichè si son definiti per *polièdri regolari* quelli, di cui tutte le facce sono poligoni regolari uguali, e di cui tutti gli angoli solidi sono uguali fra loro. Queste condizioni non possono aver luogo che in un piccol numero di casi.



1.° Se le facce son triangoli equilateri, si può formar ciascun angolo solido del poliedro con tre angoli di questi triangoli, o con quattro, o con cinque. Quindi nascono tre corpi regolari, che sono il *tetraedro*, l'*ottaedro*, e l'*icosaedro*. Non se ne può formare di più con dei triangoli equilateri, poichè sei angoli di questi triangoli equivalgono a quattro angoli retti, e non posson formare un angolo solido \*.

\* 21, 5.

2.° Se le facce sono quadrati, si posson riunire i loro angoli a tre a tre, e ne risulta l'*essaedro*, o *cubo*.

Quattro angoli di quadrato equivalgono a quattro angoli retti, e non posson formar un angolo solido.

3.° Finalmente, se le facce sono pentagoni regolari, si potran pure riunire i loro angoli a tre a tre, e ne risulterà il *dodecaedro* regolare.

Non si può andar più oltre; poichè tre angoli d'esagono regolare equivalgono a quattro angoli retti, e tre angoli d'ettagono sono ancor più.

Dunque non posson esservi che cinque poliedri regolari; tre formati con dei triangoli equilateri, uno con dei quadrati, ed uno con dei pentagoni.

*Scolio.* Si proverà nella Proposizione seguente che questi cinque poliedri esistono realmente, e che se ne possono determinare tutte le dimensioni quando si conosca una delle lor facce.

## PROPOSIZIONE II.

## PROBLEMA

*Essendo data una faccia d'uno dei polièdri regolari, o soltanto il suo lato, descrivere il polièdro.*

Questo problema ne presenta cinque, che risolveremo un dopo l'altro.

*Costruzione del Tetraedro.*

**Fig. 243.** Sia  $ABC$  il triangolo equilatero, che debb' essere una delle facce del tetraedro; dal punto  $O$ , centro di questo triangolo, alzate  $OS$  perpendicolare al piano  $ABC$ ; terminate questa perpendicolare al punto  $S$ , talmente che  $AS=AB$ ; tirate  $SB$ ,  $SC$ ; e la piramide  $SABC$  sarà il tetraedro richiesto.

Poichè, a cagione delle distanze uguali  $OA$ ,  $OB$ ,  $OC$ , le oblique  $SA$ ,  $SB$ ,  $SC$  si allontanano ugualmente dalla perpendicolare  $SO$ , e perciò sono uguali. Una di esse  $SA=AB$ ; dunque le quattro facce della piramide  $SABC$  sono triangoli uguali al triangolo dato  $ABC$ . D'altronde gli angoli solidi di questa piramide sono uguali fra loro, poichè ciascuno di essi è formato con tre angoli piani uguali. Dunque questa piramide è un tetraedro regolare.

*Costruzione dell'essaedro.*

**Fig. 244.** Sia  $ABCD$  un quadrato dato: sopra la base  $ABCD$  costruite un prisma retto, la cui altezza  $AE$  sia uguale al lato  $AB$ . È

chiaro che le facce di questo prisma saranno quadrati uguali, e che i suoi angoli solidi sono uguali fra loro, giacchè vengon formati con tre angoli retti; dunque questo prisma è un essaedro regolare, o cubo.

*Costruzione dell'ottaedro.*

Sia  $AMB$  un triangolo equilatero dato: Fig. 245. sul lato  $AB$  descrivete il quadrato  $ABCD$ , dal punto  $O$ , centro di questo quadrato, alzate sul suo piano la perpendicolare  $TS$ , terminata dalle due parti in  $T$ , e in  $S$  talmente che  $OT=OS=AO$ ; tirate dipoi  $SA$ ,  $SB$ ,  $TA$ , ec.: avrete un solido  $SABCDT$  composto di due piramidi quadrangolari  $SABCD$ ,  $TABCD$  riunite per la loro base comune  $ABCD$ : questo solido sarà l'ottaedro regolare cercato.

Infatti il triangolo  $AOS$  è rettangolo in  $O$ , come pure il triangolo  $AOD$ ; i lati  $AO$ ,  $OS$ ,  $OD$  sono uguali; dunque questi triangoli sono uguali, e si ha  $AS=AD$ . Si dimostrerà parimente che tutti gli altri triangoli rettangoli  $AOT$ ,  $BOS$ ,  $COT$ , ec. sono uguali al triangolo  $AOD$ ; dunque tutti i lati  $AB$ ,  $AS$ ,  $AT$ , ec. sono uguali fra loro, e per conseguenza il solido  $SABCDT$  è compreso da otto triangoli uguali al triangolo equilatero dato  $ABM$ . Dico di più che gli angoli solidi del poliedro sono uguali fra loro, per esempio, l'angolo  $S$  è uguale all'angolo  $B$ .

Poichè è manifesto che il triangolo  $SAC$  è uguale al triangolo  $DAC$ , e che perciò l'angolo  $ASC$  è retto: dunque la figura  $SATC$

è un quadrato uguale al quadrato ABCD. Ma, se si paragona la piramide BASCT colla piramide SABCD, la base ASCT della prima può situarsi sulla base ABCD della seconda; allora, essendo il punto O un centro comune, l'altezza OB della prima si confonderà coll'altezza OS della seconda, e le due piramidi si confonderanno in una sola; dunque l'angolo solido S è uguale all'angolo solido B; dunque il solido SABCDT è un *ottaedro regolare*.

*Scolio.* Se tre rette uguali AC, BD, ST sono perpendicolari fra loro, e si tagliano nel loro mezzo, le estremità di queste rette saranno i vertici d'un *ottaedro regolare*.

*Costruzione del dodecaedro.*

Fig. 6. Sia ABCDE un pentagono regolare dato; siano ABP, CBP due angoli piani uguali all'angolo ABC; con questi angoli piani formate l'angolo solido B, e determinate per la Proposizione XXIV. del Libro V. l'inclinazione scambievole di due di questi piani; inclinazione, ch'io chiamo K. Formate similmente ai punti C, D, E, A degli angoli solidi uguali all'angolo solido B, e situati nella stessa maniera; il piano CBP sarà lo stesso che il piano BCG, poichè sono inclinati l'uno e l'altro della medesima quantità K sul piano ABCD. Si può dunque nel piano PBCG descrivere il pentagono BCGFP uguale al pentagono ABCDE. Se si fa lo stesso in ciascuno degli altri piani CDI, DEL

ec., si avrà una superficie convessa  $PFGH$  ec. composta di sei pentagoni regolari uguali, ed inclinati ciascuno sul suo adjacente della quantità medesima  $K$ . Sia  $pfgh$  ec. una seconda superficie uguale a  $PFGH$  ec.; dico che queste due superficie posson esser riunite in tal modo da formare una sola superficie convessa continuata. Infatti l'angolo  $opf$ , per esempio, può unirsi ai due angoli  $OPB$ ,  $BPF$  per fare un angolo solido  $P$  uguale all'angolo  $B$ ; ed in questa riunione non si cambierà niente l'inclinazione dei piani  $BPF$ ,  $BPO$ , giacchè quest'inclinazione è qual' appunto bisogna per la formazione dell'angolo solido. Ma, nel tempo stesso che si forma l'angolo solido  $P$ , il lato  $pf$  si applicherà sul suo uguale  $PF$ , e nel punto  $F$  si troveranno riuniti tre angoli piani  $PFG$ ,  $pfe$ ,  $efg$ , che formeranno un angolo solido uguale a ciascuno degli angoli già formati: questa riunione farassi senza cambiar niente lo stato dell'angolo  $P$ , nè quello della superficie  $efgh$  ec., poichè i piani  $PFG$ ,  $efp$  digià riuniti in  $P$  hanno fra loro l'inclinazion convenevole  $K$ , come pure i piani  $efg$ ,  $efp$ . Continuando così di mano in mano si vede chiaro che le due superficie si aggiusteranno scambievolmente una coll'altra, onde formare una sola superficie continuata, e rientrante in se stessa. Questa superficie sarà quella d'un *dodecaedro regolare*, poichè è composta di dodici pentagoni regolari uguali, e tutti i suoi angoli solidi sono uguali fra loro.

*Costruzione dell' icosaedro.*

**Fig. 247.** Sia  $ABC$  una delle sue facce; bisogna prima formare un angolo solido con cinque piani uguali al piano  $ABC$ , ed ugualmente inclinati ciascuno sul suo adjacente. Perciò sul lato  $B'C'$  uguale a  $BC$  fate il pentagono regolare  $B'C'H'I'D'$ ; dal centro di questo pentagono alzate sul suo piano una perpendicolare, che terminerete in  $A'$  di modo che  $B'A' = B'C'$ ; tirate  $A'C'$ ,  $A'H'$ ,  $A'I'$ ,  $A'D'$ ; e l'angolo solido  $A'$  formato dai cinque piani  $B'A'C'$ ,  $C'A'H'$ , ec. sarà l'angolo solido domandato. Poichè le oblique  $A'B'$ ,  $A'C'$  ec. son uguali, ed una di esse  $A'B'$  è uguale al lato  $B'C'$ ; dunque tutti i triangoli  $B'A'C'$ ,  $C'A'H'$ , ec. sono uguali fra loro, ed al triangolo dato  $ABC$ .

È d'altronde patente che i piani  $B'A'C'$ ,  $C'A'H'$ , ec. sono ugualmente inclinati ciascuno sul suo adjacente, poichè gli angoli solidi  $B'$ ,  $C'$ , ec. sono uguali fra loro, a motivo che ciascuno di essi è formato con due angoli di triangolo equilatero, ed un di pentagono regolare. Chiamiamo  $K$  l'inclinazione dei due piani ove sono gli angoli uguali; inclinazione, che si può determinare mediante la Proposizione XXIV. del Lib. V; l'angolo  $K$  sarà nel tempo stesso l'inclinazione di ciascuno dei piani, che compongon l'angolo solido  $A'$ , sul suo adjacente.

Posto ciò, se si fanno ai punti,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  degli angoli solidi, uguali ognuno all'angolo

A', si avrà una superficie convessa DEFG ec. composta di dieci triangoli equilateri, di cui ciascuno sarà inclinato sul suo adjacente della quantità K, e gli angoli D, E, F, ec. del di lei contorno riuniranno alternativamente tre, e due angoli del triangolo equilatero. Immaginate una seconda superficie uguale alla superficie DEFG ec.; queste due superficie potranno adattarsi scambievolmente, unendo ciascun angolo triplo dell'una con un angolo doppio dell'altra; e, siccome i piani di questi angoli hanno già fra loro l'inclinazione K necessaria per formare un angolo solido quintuplo uguale all'angolo A, non si cambierà niente in questa riunione lo stato di ciascuna superficie in particolare, e le due insieme formeranno una sola superficie continua composta di venti triangoli equilateri. Questa superficie sarà quella dell'*icosaedro regolare*, poichè d'altronde tutti gli angoli solidi sono uguali fra loro.

## PROPOSIZIONE III.

## PROBLEMA

*Trovare l'inclinazione di due facce adjacenti d'un poliedro regolare.*

Questa inclinazione deducesi immediatamente dalla costruzione già data dei cinque poliedri regolari; al che bisogna aggiungere la Proposizione XXIV. del Libro V., in virtù della quale essendo dati i tre angoli piani, che formano un angolo solido, si determina l'angolo, che due di questi piani fanno fra loro.

- Fig. 243. *Nel tetraedro*. Ciascun angolo solido è formato da tre angoli di triangolo equilatero; bisogna dunque cercare col problema citato l'angolo, che due di questi piani fanno fra loro; quest'angolo sarà l'inclinazione di due facce adjacenti del tetraedro.
- Fig. 244. *Nell'essaedro*. L'angolo di due facce adjacenti è un angolo retto.
- Fig. 245. *Nell'ottaedro*. Formate un angolo solido con due angoli di triangolo equilatero, ed un angolo retto; l'inclinazion dei due piani, ove sono gli angoli dei triangoli, sarà quella di due facce adjacenti dell'ottaedro.
- Fig. 246. *Nel dodecaedro*. Ogni angolo solido è formato con tre angoli di pentagono regolare; laonde l'inclinazione dei piani di due di tali angoli sarà quella di due facce adjacenti del dodecadro.
- Fig. 247. *Nell'icosaedro*. Formate un angolo solido con due angoli di triangolo equilatero, ed un angolo di pentagono regolare; l'inclinazion dei due piani, ove sono gli angoli dei triangoli, sarà quella di due facce adjacenti dell'icosaedro.

## PROPOSIZIONE IV.

## PROBLEMA

*Essendo dato il lato d'un polièdro regolare, trovare il raggio della sfera iscritta, e quello della sfera circoscritta ad un tal polièdro.*

Bisogna prima dimostrare che ogni poliè-



dro regolare può essere iscritto, è circoscritto a una sfera.

Sia  $AB$  il lato comune a due facce adjacenti; siano  $C$  ed  $E$  i centri di queste due facce, e  $CD$ ,  $ED$  le perpendicolari abbassate da questi centri sul lato comune  $AB$ , le quali cadranno nel punto  $D$ , mezzo di questo lato. Le due perpendicolari  $CD$ ,  $DE$  fanno fra loro un angolo cognito, ch'è uguale all'inclinazione di due facce adjacenti determinata dal precedente problema. Ora, se nel piano  $CDE$ , perpendicolare ad  $AB$ , si conducano sopra  $CD$ , ed  $ED$  le perpendicolari indefinite  $CO$ , ed  $EO$ , che s'incontrino in  $O$ , dico che il punto  $O$  sarà il centro della sfera iscritta, e quello altresì della sfera circoscritta, essendo  $OC$  il raggio della prima, e  $OA$  quello della seconda. Fig. 248.

Infatti, poichè gli apotèmi  $CD$ ,  $DE$  sono uguali, e l'ipotenusa  $DO$  comune, il triangolo rettangolo  $CDO$  è uguale al triangolo rettangolo  $ODE$ , \* e la perpendicolare  $OC$  \* 18, 1. è uguale alla perpendicolare  $OE$ . Ma essendo  $AB$  perpendicolare al piano  $CDE$ , il piano  $ABC$  è perpendicolare a  $CDE$  \*, o \* 17, 5.  $CDE$  ad  $ABC$ : d'altronde  $CO$  nel piano  $CDE$  è perpendicolare a  $CD$ , intersezione comune dei piani  $CDE$ ,  $ABC$ ; dunque  $CO$  \* \* 18, 5. è perpendicolare al piano  $ABC$ . Per la medesima ragione,  $EO$  è perpendicolare al piano  $ABE$ ; dunque le due perpendicolari  $CO$ ,  $EO$ , condotte ai piani di due facce adjacenti dai centri di queste facce, s'incontrano in

uno stesso punto  $O$ , e sono uguali. Supponiamo adesso che  $ABC$ , ed  $ABE$  rappresentino due altre facce adjacenti qualunque; l'apotema  $CD$  resterà sempre della grandezza medesima, come pure l'angolo  $CDO$  metà di  $CDE$ ; dunque il triangolo rettangolo  $CDO$ , ed il suo lato  $CO$  saranno uguali per rapporto a tutte le facce del poliedro. Dunque, se dal punto  $O$ , come centro, e col raggio  $OC$ , si descriva una sfera, essa toccherà tutte le facce del poliedro nei loro centri (poichè i piani  $ABC$ ,  $ABE$  saranno perpendicolari all'estremità d'un raggio), e la sfera sarà iscritta nel poliedro, o il poliedro circoscritto alla sfera.

Tirate  $OA$ ,  $OB$ ; a cagione di  $CA=CB$ , le due oblique  $OA$ ,  $OB$ , allontanandosi ugualmente dalla perpendicolare, saranno uguali; sarà lo stesso di due altre linee rette qualunque condotte dal centro  $O$  alle estremità d'un medesimo lato: dunque tutte queste linee sono uguali fra loro. Dunque, se dal punto  $O$ , come centro, e col raggio  $OA$ , si descriva una superficie sferica, essa passerà per i vertici di tutti gli angoli solidi del poliedro; e la sfera sarà circoscritta al poliedro, o il poliedro iscritto nella medesima sfera.

Posto ciò, la soluzione del problema proposto non ha più difficoltà veruna, e può eseguirsi così:

Fig. 249.

Essendo dato il lato d'una faccia del poliedro, descrivete questa faccia, e sia  $CD$  il suo apotema. Cercate per il problema pre-

cedente l'inclinazione di due facce adjacenti del poliedro, e fate l'angolo CDE uguale a quest'inclinazione trovata. Prendete DE uguale a CD; conducete CO, ed EO perpendicolari a CD, ed ED; queste due perpendicolari s'incontreranno in un punto O; e CO sarà il raggio della sfera iscritta nel poliedro.

Sul prolungamento di DC prendete CA uguale al raggio del circolo circoscritto a una faccia del poliedro; ed OA sarà il raggio della sfera circoscritta a questo poliedro medesimo.

Poichè i triangoli rettangoli CDO, CAO della Figura 249. sono uguali ai triangoli dello stesso nome nella Figura 248. Quindi è che mentre CD, e CA sono i raggi dei circoli iscritto, e circoscritto a una faccia del poliedro, OC, ed OA sono i raggi delle sfere iscritta, e circoscritta al medesimo poliedro.

*Scolio.* Si posson dedurre dalle precedenti Propositioni diverse conseguenze immediate.

1.° Ogni poliedro regolare può esser diviso in tante piramidi regolari, quante facce ha il poliedro: il vertice comune di queste piramidi sarà il centro del poliedro, ch'è nel tempo stesso centro delle due sfere iscritta, e circoscritta.

2.° La solidità d'un poliedro regolare è uguale alla sua superficie moltiplicata per la terza parte del raggio della sfera iscritta.

3.° Due poliedri regolari del medesimo nome sono due solidi simili, e le lor dimen-

sioni omologhe sono proporzionali; dunque i raggi delle sfere iscritte, o circoscritte stanno fra loro come i lati di questi polièdri.

4.° Se s'isciva un polièdro regolare in una sfera, i piani condotti dal centro per i differenti lati divideranno la superficie della sfera in tanti poligoni uguali, e simili, quante sono le facce del polièdro.

---

## LIBRO OTTAVO

## I TRE CORPI ROTONDI

## DEFINIZIONI

1. Si chiama *cilindro* il solido prodotto Fig. 250.  
dalla rivoluzione d'un rettangolo ABCD,  
che s'immagina rivolgersi intorno il lato im-  
mobile AB.

In tal movimento i lati BC, AD, restan-  
do sempre perpendicolari ad AB, descrivono  
dei piani circolari uguali DHP, CGQ, che  
si chiaman le *basi del cilindro*, ed il lato CD  
ne descrive la *superficie convessa*.

La linea immobile AB si chiama *l'asse  
del cilindro*.

Ogni sezione KLM fatta nel cilindro per-  
pendicolarmente all'asse è un circolo uguale  
a ciascuna delle due basi. Poichè, mentre il  
rettangolo ABCD gira intorno ad AB, la  
linea retta IK perpendicolare ad AB descri-  
ve un pian circolare uguale alla base, e  
questo piano non è altro che la sezione fatta  
perpendicolarmente all'asse nel punto I.

Ogni sezione PQGH fatta per l'asse è un

rettangolo, doppio del rettangolo generatore  $ABCD$ .

Fig. 251.

2. Si chiama *cono* il solido prodotto dalla rivoluzione del triangolo rettangolo  $SAB$ , che s'immagina girare intorno al lato immobile  $SA$ .

In questo movimento il lato  $AB$  descrive un piano circolare  $BDCE$ , che si chiama *base del cono*; e l'ipotenusa  $SB$  ne descrive *la superficie convessa*.

Il punto  $S$  si chiama *il vertice del cono*,  $SA$  l'*asse*, o l'*altezza*, e  $SB$  il *lato*, o *apotema*.

Ogni sezione  $HKFI$  fatta perpendicolarmente all'*asse* è un circolo; ogni sezione  $SDE$  fatta per l'*asse* è un triangolo isoscele, doppio del triangolo generatore  $SAB$ .

3. Se dal cono  $SCDB$  si toglie, mediante una sezione parallela alla base, il cono  $SFKH$ , il solido restante  $CBHF$  si chiama *cono troncato*, o *tronco di cono*. Si può supporre che sia descritto dalla rivoluzione del trapezio  $ABHG$ , i cui angoli  $A$ , e  $G$  sono retti, intorno al lato  $AG$ . La linea immobile  $AG$  si chiama *asse*, o *altezza del tronco*, i circoli  $BDC$ ,  $HKF$  ne sono *le basi*, e  $BH$  n'è *il lato*.

4. Due cilindri, o due coni son *simili* quando i lor assi stanno fra loro come i diametri delle lor basi.

Fig. 252.

5. Se nel circolo  $ACD$ , che serve di base a un cilindro, s'iscrive un poligono  $ABCDE$ , e sulla base  $ABCDE$  s'inalza un prisma retto

uguale in altezza al cilindro, il prisma si dice *iscritto nel cilindro*, o il cilindro *circoscritto al prisma*.

È ehario che li spigoli o costole  $AF$ ,  $BG$ ,  $CH$ , ec. del prisma, essendo perpendicolari al pian della base, son comprese nella superficie convessa del cilindro. Dunque il prisma, e il cilindro si toccano lungo di queste costole.

6. Parimente, se  $ABCD$  è un poligono circoscritto alla base d'un cilindro, e sulla base  $ABCD$  si costruisce un prisma retto uguale in altezza allo stesso cilindro, il prisma si chiama *circoscritto al cilindro*, o il cilindro *iscritto nel prisma*. Fig. 253.

Siano  $M$ ,  $N$ , ec. i punti di contatto dei lati  $AB$ ,  $BC$  ec., e siano alzate dai punti  $M$ ,  $N$ , ec. le perpendicolari  $MX$ ,  $NY$  ec. al pian della base; è chiaro che queste perpendicolari saranno a un tempo stesso nella superficie del cilindro, ed in quella del prisma circoscritto; dunque esse saranno le linee lor di contatto.

*Nota*. Il cilindro, il cono, e la sfera sono i tre corpi rotondi, di cui si tratta negli *Elementi*.

LEMMI PRELIMINARI SULLE SUPERFICIE

I.

Una superficie piana  $OABCD$  è minore di ogni altra superficie  $PABCD$  terminata dal medesimo contorno  $ABCD$ . Fig. 254.

Questa proposizione è abbastanza evidente per esser posta nel numero degli assiomi; poichè si potrebbe supporre che il piano sia tra le superficie ciò, che la linea retta è fra le altre linee. La linea retta è la più corta fra due punti dati; parimente il piano è la superficie più piccola fra tutte quelle, che hanno un istesso contorno. Nonostante, siccome conviene ridur gli assiomi al più piccol numero possibile, ecco un ragionamento, che non lascerà verun dubbio su questa Proposizione.

Essendo la superficie un'estensione in lunghezza, e larghezza, non si può concepire che una superficie sia maggiore d'un'altra salvo che le dimensioni della prima non superino in qualche senso quelle della seconda; e se accade che le dimensioni d'una superficie siano in ogni senso minori delle dimensioni d'un'altra superficie, è chiaro che la prima superficie sarà la minor delle due. Ora in qualunque senso si faccia passare il piano BPD, che taglierà la superficie piana in BD, e l'altra superficie in BPD, la linea retta BD sarà sempre minore di BPD. Dunque la superficie piana OABCD è minore della superficie circondante PABCD.

## II.

Fig. 255. *Ogni superficie convessa OABCD è minore d'un'altra superficie qualunque, che circondasse la prima appoggiandosi sul medesimo contorno ABCD.*



Ripeteremo quì che intendiamo per *superficie convessa* una superficie, che non può esser incontrata da una linea retta in più di due punti. E per altro possibile che una linea retta si applichi esattamente in un certo senso sopra una superficie convessa; se ne vedono degli esempj nelle superficie del cono, e del cilindro. Osserveremo pure che la denominazione di *superficie convessa* non è ristretta alle sole superficie curve; comprende le *superficie polièdre*, o composte di più piani, ed anche le superficie in parte curve, in parte polièdre.

Ciò posto, se la superficie OABCD non è minore di tutte quelle, che la circondano, sia tra queste PABCD la superficie più piccola, che sarà al più uguale ad OABCD. Per un punto qualunque O fate passare un piano, che tocchi la superficie OABCD senza tagliarla; questo piano incontrerà la superficie PABCD; e la parte, che ne riciderà, sarà maggiore del piano stesso terminato alla medesima superficie. Dunque conservando il resto della superficie PABCD, si potrebbe sostituire il piano alla parte recisa, e s'avrebbe una nuova superficie, che circonderebbe sempre la superficie OABCD, e sarebbe minore di PABCD.

Ma questa è la minore di tutte, per supposizione; dunque questa supposizione non può sussistere. Dunque la superficie convessa OABCD è minore d'ogni altra superficie,

che circondasse  $OABCD$ , o fosse terminata al medesimo contorno  $ABCD$ .

*Scolio.* Con un ragionamento interamente simile si proverà

Fig. 256. 1.<sup>o</sup> Che se una superficie convessa terminata da due contorni  $ABC$ ,  $DEF$  è circondata da un'altra superficie qualunque terminata ai contorni medesimi, la superficie circondata sarà la minor d'esse due.

Fig. 257. 2.<sup>o</sup> Che se una superficie convessa  $AB$  è circondata per tutte le parti da un'altra superficie  $MN$ , o abbiano entrambe dei punti, linee, o piani comuni, o non abbiano verun punto comune, la superficie circondata sarà sempre minore della superficie circondante.

Poichè fra queste non può esservene alcuna, che sia un *minimo*, atteso che in qualunque supposizione si potrebbe sempre condurre il piano  $CD$  tangente alla superficie convessa, il qual piano sarebbe minore della superficie  $CMD$ ; e però la superficie  $CND$  sarebbe minore di  $MN$ ; il che è contrario all'ipotesi che  $MN$  sia un *minimo*. Dunque la superficie convessa  $AB$  è minore di tutte quelle, che la circondano.

## PROPOSIZIONE I.

### TEOREMA

*La solidità d'un cilindro è uguale al prodotto della sua base per la sua altezza*

Fig. 258. Sia  $CA$  il raggio della base del cilindro dato,  $H$  la sua altezza; rappresentiamo con *sup.*  $CA$  la superficie del circolo; il di cui

raggio è  $CA$ ; dico che la solidità del cilindro sarà *sup.*  $CA \times H$ . Poichè, se *sup.*  $CA \times H$  non è la misura del cilindro dato, questo prodotto sarà la misura d'un cilindro maggiore, o minore. E prima supponiamo che sia la misura d'un cilindro minore, per esempio, del cilindro, di cui  $CD$  è il raggio della base, e  $H$  l'altezza.

Circoscrivete al circolo, il cui raggio è  $CD$ , un poligono regolare  $GHIP$ , i lati del quale non incontrino la circonferenza, di cui  $CA$  è il raggio \*: immaginate dipoi \* 20, 4. un prisma retto, che abbia per base il poligono  $GHIP$ , e per altezza  $H$ , il qual prisma sarà circoscritto al cilindro, il raggio della cui base è  $CD$ . Posto ciò, la solidità del prisma \* è uguale alla sua base  $GHIP$  mol- \* 14, 6. tiplicata per l'altezza  $H$ ; la base  $GHIP$  è minore del circolo, di cui  $CA$  è il raggio; dunque la solidità del prisma è minore di *sup.*  $CA \times H$ . Ma *sup.*  $CA \times H$  è, per supposizione, la solidità del cilindro iscritto nel prisma. Dunque il prisma sarebbe minor del cilindro. Ora, al contrario, il cilindro è minore del prisma, poichè v'è contenuto. Dunque è impossibile che *sup.*  $CA \times H$  sia la misura del cilindro, la cui base ha per raggio  $CD$ , e la cui altezza è  $H$ , o, in termini più generali, *il prodotto della base d'un cilindro per la sua altezza non può misurare un cilindro minore.*

Dico in secondo luogo che questo stesso prodotto non può misurare un cilindro mag-

giore. Poichè, per non moltiplicar le Figure, sia  $CD$  il raggio della base del cilindro dato, e sia, s'è possibile, *sup.*  $CD \times H$  la misura d'un cilindro maggiore, per esempio, del cilindro, la di cui base ha per raggio  $CA$ , e la cui altezza è sempre  $H$ .

Se si fa la stessa costruzione del primo caso, il prisma circoscritto al cilindro dato avrà per misura  $GHIP \times H$ ; l'area  $GHIP$  è maggiore di *sup.*  $CD$ ; dunque la solidità del prisma, di cui si tratta, è maggiore di *sup.*  $CD \times H$ : il prisma sarebbe dunque maggior del cilindro della medesima altezza, che ha per base *sup.*  $CA$ . Ora, all'opposto, il prisma è minor del cilindro, poichè v'è contenuto. Dunque è impossibile che la base d'un cilindro moltiplicata per la sua altezza sia la misura d'un cilindro maggiore.

Dunque finalmente la solidità d'un cilindro è uguale al prodotto della sua base per la sua altezza.

**Corollario I.** I cilindri della medesima altezza stanno fra loro come le basi, e i cilindri della medesima base stanno fra loro come le altezze.

**Corollario II.** I cilindri simili stanno come i cubi delle altezze, o come i cubi dei diametri delle basi. Poichè le basi stanno come i quadrati dei loro diametri, e, siccome i cilindri son simili, i diametri delle basi stanno come le altezze \*: dunque le basi stanno come i quadrati delle altezze; dunque le basi moltiplicate per l'altezze, o i cilindri stessi stanno come i cubi delle altezze predette.

\* Def. 4.

*Scolio.* Sia  $R$  il raggio della base d'un cilindro,  $H$  la sua altezza; la superficie della base sarà  $pR^2$ , e la solidità del cilindro \* 12, 4. sarà  $pR^2 \times H$ , o  $pR^2H$ .

PROPOSIZIONE II.

LEMMA

*La superficie convessa d'un prisma retto è uguale al perimetro della sua base moltiplicato per la sua altezza.*

Poichè questa superficie è uguale alla somma dei rettangoli  $AFGB$ ,  $BGHC$ ,  $CGID$ , ec., dei quali è composta; ora le altezze  $AF$ ,  $BG$ ,  $CH$ , ec. di questi rettangoli sono uguali all'altezza del prisma; le loro basi  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ , ec. prese insieme fanno il perimetro della base del prisma. Dunque la somma di questi rettangoli, o la superficie convessa del prisma, è uguale al perimetro della sua base moltiplicato per la sua altezza.

*Corollario.* Se due prismi retti hanno la medesima altezza, le superficie convesse di questi prismi staranno fra loro come i perimetri delle lor basi.

PROPOSIZIONE III.

LEMMA

*La superficie convessa del cilindro è maggiore della superficie convessa d'ogni prisma iscritto, e minore della superficie convessa d'ogni prisma circoscritto.*

Poichè la superficie convessa del cilindro Fig. 252\* è quella del prisma iscritto  $ABCDEF$  pos-

sono essere considerate della medesima altezza, a motivo che ogni sezione fatta nell' uno, e nell'altro parallelamente ad  $AF$  è eguale ad  $AF$ ; e se, per aver le larghezze di queste superficie, si tagliano con dei piani paralleli alla base, o perpendicolari alla costola, o spigolo  $AF$ , le sezioni saranno eguali, una alla circonferenza della base, l'altra al contorno del poligono  $ABCDE$  minore di questa circonferenza: dunque, poichè a lunghezza od altezza eguale la larghezza della superficie cilindrica è maggior di quella della superficie prismatica, ne segue che la prima superficie è maggiore della seconda.

Con un ragionamento interamente simile si proverà che la superficie convessa del cilindro è minore che quella d'ogni prisma circoscritto  $BCDKLH$ .

#### PROPOSIZIONE IV.

##### TEOREMA

*La superficie convessa d'un cilindro è uguale alla circonferenza della sua base moltiplicata per la sua altezza.*

Fig. 258. Sia  $CA$  il raggio della base del cilindro dato,  $H$  la sua altezza; se si rappresenta con *circ.*  $CA$  la circonferenza, che ha per raggio  $CA$ , dico che *circ.*  $CA \times H$  sarà la superficie convessa di questo cilindro. Poichè, se ciò si nega, bisognerà che *circ.*  $CA \times H$  sia la superficie d'un cilindro maggiore, o minore; e prima supponiamo che sia la su-

perficie d'un cilindro minore, per esempio, del cilindro, la cui base ha per raggio  $CD$ , e la di cui altezza è  $H$ .

Circoscrivete al circolo, il cui raggio è  $CD$ , un poligono regolare  $GHIP$ , i di cui lati non incontrino la circonferenza, della quale  $CA$  è il raggio; immaginate dipoi un prisma retto, che abbia per altezza  $H$ , e per base il poligono  $GHIP$ . La superficie convessa di questo prisma sarà uguale al contorno del poligono  $GHIP$  moltiplicato per l'altezza  $H$  \*; questo contorno è minore \* 2. della circonferenza, il cui raggio è  $CA$ ; dunque la superficie convessa del prisma è minore di *circ.*  $CA \times H$ . Ma *circ.*  $CA \times H$  è, per supposizione, la superficie convessa del cilindro, la di cui base ha per raggio  $CD$ , il qual cilindro è iscritto nel prisma; dunque la superficie convessa del prisma sarebbe minore di quella del cilindro iscritto. Ora, al contrario, dev'esser maggiore \*; dunque \* 3. la supposizione, da cui siamo partiti, è assurda. Dunque 1.° *la circonferenza della base d'un cilindro moltiplicata per la sua altezza non può misurare la superficie convessa d'un cilindro minore.*

Dico in secondo luogo che questo medesimo prodotto non può misurare la superficie d'un cilindro maggiore. Poichè, per non cambiar figura, sia  $CD$  il raggio della base del cilindro dato, e sia, s'è possibile, *circ.*  $CD \times H$  la superficie convessa d'un cilindro, che colla medesima altezza avesse una base

maggiore, per esempio, il circolo, di cui il raggio è CA. Si farà la in desima costruzione come nella prima supposizione, e la superficie convessa del prisma sarà sempre uguale al contorno del poligono GHIP moltiplicato per l'altezza H. Ma questo contorno è maggiore di *circ.* CD; dunque la superficie del prisma sarebbe maggiore di *circ.* CD×H, che per supposizione è la superficie del cilindro della medesima altezza, la di cui base ha per raggio CA. Dunque la superficie del prisma sarebbe maggiore di quella di questo cilindro. Ma, quand'anche il prisma fosse iscritto nel cilindro, la sua superficie sarebbe minore di quella del cilindro \*; molto più essa è minore quando il prisma non arriva fino al cilindro; dunque la seconda supposizione è assurda quanto la prima. Dunque 2.<sup>o</sup> *la circonferenza della base d'un cilindro moltiplicata per la sua altezza non può misurare la superficie d'un cilindro maggiore.*

Dunque finalmente la superficie convessa d'un cilindro è uguale alla circonferenza della sua base moltiplicata per la sua altezza.

## PROPOSIZIONE V.

## TEOREMA

*La solidità d'un cono è uguale al prodotto della sua base per la terza parte della sua altezza.*

Fig. 259. Sia SO l'altezza del cono dato, AO il rag-



gio della base; se si rappresenta con *sup.* AO la superficie della base, io dico che la solidità di questo cono sarà eguale a *sup.*  $AO \times \frac{1}{3}SO$ .

Infatti supponiamo 1.º che *sup.*  $AO \times \frac{1}{3}SO$  sia la solidità d'un cono maggiore, per esempio, del cono della stessa altezza SO, che abbia per raggio della sua base OB maggiore di AO.

Al circolo, di cui il raggio è AO, circoscrivete un poligono regolare MNPT, che non incontri la circonferenza, il di cui raggio è OB \*; immaginate quindi una piramide, che abbia per base il poligono, e per vertice il punto S. La solidità di questa piramide \* è uguale all'area del poligono MNPT \* 10, 4. moltiplicata per la terza parte dell'altezza SO. Ma il poligono è maggiore del circolo iscritto rappresentato da *sup.* AO; dunque la piramide è maggiore di *sup.*  $AO \times \frac{1}{3}SO$ , che, per supposizione, è la misura del cono, di cui S è il vertice, e che ha OB per raggio della sua base. Ora, al contrario, la piramide è minore del cono, poichè v'è contenuta. Dunque 1.º è impossibile che la base d'un cono moltiplicata per la terza parte della sua altezza sia la misura d'un cono maggiore.

Dico 2.º che questo medesimo prodotto non può essere la misura d'un cono minore. Poichè, per non cambiar figura, sia OB il raggio della base del cono dato, e sia, s'è possibile, *sup.*  $OB \times \frac{1}{3}SO$  la solidità del cono,

che ha per altezza  $SO$ , e per base il circolo, di cui  $AO$  è il raggio. Si farà la medesima costruzione di sopra, e la piramide  $SMNPT$ , avrà per misura l'area  $MNPT$  moltiplicata per  $\frac{1}{3}SO$ . Ma l'area  $MNPT$  è minore di *sup.*  $OB$ ; dunque la piramide avrebbe una misura minore di *sup.*  $OB \times \frac{1}{3}SO$ , e per conseguenza sarebbe minore del cono, che ha  $AO$  per raggio della base, e  $SO$  per altezza. Ora, al contrario, la piramide è maggiore del cono, poichè il cono v'è contenuto. Dunque 2.° è impossibile che la base d'un cono moltiplicata per la terza parte della sua altezza sia la misura d'un cono minore.

Dunque finalmente la solidità d'un cono è uguale al prodotto della sua base per la terza parte della sua altezza.

*Corollario.* Dunque un cono è la terza parte d'un cilindro della medesima base, e della medesima altezza; e da ciò segue

- 1.° Che i coni d'uguali altezze stanno fra loro come le basi;
- 2.° Che i coni di basi uguali stanno fra loro come le altezze;
- 3.° Che i coni simili stan come i cubi dei diametri delle lor basi, o come i cubi delle loro altezze.

*Scolio.* Sia  $R$  il raggio della base d'un cono,  $H$  la sua altezza; la solidità del cono sarà  $pR^2 \times \frac{1}{3}H$ , o  $\frac{1}{3}pR^2H$ .

PROPOSIZIONE VI.

TEOREMA

*Il cono troncato ADEB, di cui OA, e PD sono i raggi delle basi, e PO l'altezza, ha* Fig. 160

*per misura  $\frac{p}{3}OP(\overline{AO}^2 + \overline{DP}^2 + AO \times DP)$ .*

Sia TFGH una piramide triangolare della medesima altezza del cono SAB, e la di cui base FGH sia equivalente alla base del cono. Si può supporre che queste due basi sian situate sopra un medesimo piano; allora i vertici T, e S saranno a distanze uguali dal pian delle basi, ed il piano EPD prolungato farà nella piramide la sezione IKL. Ora io dico che questa sezione IKL è equivalente alla base DE. Poichè le basi AB, DE stanno fra loro come i quadrati dei raggi AO, DP \*, o come i quadrati delle altezze SO, SP; i triangoli FGH, IKL stanno fra loro come i quadrati di queste medesime altezze \*; dunque i circoli AB, DE stanno fra loro come i triangoli FGH, IKL. Ma, per supposizione, il triangolo FGH è equivalente al circolo AB; dunque il triangolo IKL è equivalente al circolo DE. \* 11, 4. \* 15, 6.

Ora la base AB moltiplicata per  $\frac{1}{3}$  SO è la misura del cono SAB, e la base FGH moltiplicata per  $\frac{1}{3}$  SO la è della piramide TFGH; dunque, a motivo delle basi equivalenti, la solidità della piramide è equivalente a quella del cono. Per una simil ragione, la piramide TIKL è equivalente al cono SDE; dunque

il tronco di cono ADEB è equivalente al tronco di piramide FGHIKL. Ma la base FGH, equivalente al circolo, il di cui raggio è AO, ha per misura  $p \times \overline{AO}^2$ ; parimente la base IKL  $= p \times \overline{DP}^2$ ; e la media proporzionale fra  $p \times \overline{AO}^2$ , e  $p \times \overline{DP}^2$  è  $p \times \overline{AO} \times \overline{DP}$ . Dunque la solidità del tronco di piramide, o sia quella del tronco di cono, ha per misura  $\frac{1}{3} OP \times (p \times \overline{AO}^2 + p \times \overline{DP}^2 + p \times \overline{AO} \times \overline{DP})^*$ , ch'è lo stesso che  $\frac{p}{3} \times OP \times (\overline{AO}^2 + \overline{DP}^2 + \overline{AO} \times \overline{DP})$ .

## PROPOSIZIONE VII.

## T E O R E M A

*La superficie convessa d'un cono è uguale alla circonferenza della sua base moltiplicata per la metà del suo lato.*

Fig. 259.

Sia AO il raggio della base del cono dato, S il suo vertice, e SA il di lui lato; dico che la superficie conica sarà *circ.*  $AO \times \frac{1}{2} SA$ . Poichè sia, se è possibile, *circ.*  $AO \times \frac{1}{2} SA$  la superficie d'un cono, che avesse per vertice il punto S, e per base il circolo descritto col raggio OB maggiore di AO.

Circoscrivete al circolo minore un poligono regolare MNPT, i cui lati non incontrino la circonferenza, che ha per raggio OB; e sia SMNPQ la piramide regolare, che avesse per base il poligono, e per vertice il punto S. Il triangolo SMN, uno di quelli che com-

pongono la superficie convessa della piramide, ha per misura la sua base MN moltiplicata per la metà dell'altezza SA, ch'è nel tempo stesso il lato del cono dato; essendo uguale quest'altezza in tutti gli altri triangoli SNP, SPQ, ec., ne segue che la superficie convessa della piramide è uguale al contorno MNPTM moltiplicato per  $\frac{1}{2}SA$ . Ma il contorno MNPTM ec. è maggiore di *circ.* AO; dunque la superficie convessa della piramide è maggiore di *circ.*  $AO \times \frac{1}{2}SA$ , e per conseguenza maggiore della superficie convessa del cono, che col medesimo vertice S avesse per base il circolo descritto col raggio OB. Ora, per il contrario, la superficie convessa del cono è maggiore di quella della piramide; perchè, se si congiunge base con base, cioè, la piramide a una piramide uguale, il cono ad un cono uguale, la superficie dei due coni circonda da tutte le parti la superficie delle due piramidi; dunque la prima superficie sarà maggiore della seconda\*; \* Lem. 2. dunque la superficie del cono è maggiore di quella della piramide, che v'è contenuta. Dalla nostra supposizione nasceva il contrario; dunque questa supposizione non può aver luogo: dunque 1.º la circonferenza della base d'un cono dato moltiplicata per la metà del suo lato non può misurare la superficie d'un cono maggiore.

Dico 2.º che lo stesso prodotto non può misurare la superficie d'un cono minore. Poichè, sia BO il raggio della base del co-

no dato, e sia, se è possibile, *circ.*  $BO \times \frac{1}{2}SB$  la superficie del cono, di cui S è il vertice, ed AO, minore di OB, il raggio della base.

Avendo fatta la medesima costruzione di sopra, la superficie della piramide SMNPT ec. sarà sempre uguale al contorno MNPT ec. moltiplicato per  $\frac{1}{2}SA$ . Ora il contorno MNPT ec. è minore di *circ.* BO; SA è minore di SB; dunque, per questa doppia ragione, la superficie convessa della piramide è minore di *circ.*  $BO \times \frac{1}{2}SB$ , che, per supposizione, è la superficie del cono, della cui base il raggio è AO; dunque la superficie della piramide sarebbe minore di quella del cono iscritto. Ora, al contrario, è maggiore; poichè congiungendo base con base, cioè, la piramide a una piramide uguale, il cono ad un cono uguale, la superficie delle due piramidi circonderà quella dei due coni, e per conseguenza sarà la maggiore. Dunque 2.<sup>o</sup> è impossibile che la circonferenza della base d'un cono dato moltiplicata per la metà del suo lato misuri la superficie d'un cono minore.

Dunque finalmente la superficie convessa d'un cono è uguale alla circonferenza della sua base moltiplicata per la metà del suo lato.

*Scolio.* Sia L il lato d'un cono, R il raggio della sua base; la circonferenza di questa base sarà  $2pR$ , e la superficie del cono avrà per misura  $2pR \times \frac{1}{2}L$ , o  $pRL$ .

PROPOSIZIONE VIII.

TEOREMA

La superficie convessa del tronco di cono *Fig. 261.*  
**ADEB** è uguale al suo lato **AD** moltiplicato  
 per la mezza-somma delle circonferenze delle  
 sue due basi **AB**, **DE**.

Nel piano **SAB**, che passa per l'asse **SO**,  
 conducete perpendicolarmente a **SA** la linea  
 retta **AF** uguale alla circonferenza, che ha  
 per raggio **AO**; tirate **SF**; e conducete **DH**  
 parallela ad **AF**.

A motivo dei triangoli simili **SAO**, **SDG**  
 si avrà  $AO : DC :: SA : SD$ ; ed a cagion dei  
 triangoli simili **SAF**, **SDH** s'avrà  $AF : DH$   
 $:: SA : SD$ ; dunque  $AF : DH :: AO : DC$ ,  
 o  $:: circ. AO : circ. DC$  \*. Ma, per costru- \* 11, 4.  
 zione,  $AF = circ. AO$ ; dunque  $DH = circ. DC$ .  
 Posto ciò, il triangolo **SAF**, che ha per mi-  
 sura  $AF \times \frac{1}{2} SA$ , è uguale alla superficie del  
 cono **SAB**, che ha per misura  $circ. AO \times \frac{1}{2} SA$ .  
 Per una simil ragione, il triangolo **SDH** è  
 uguale alla superficie del cono **SDE**. Dun-  
 que la superficie del tronco **ADEB** è uguale  
 a quella del trapezio **ADHF**. Questa ha per  
 misura \*  $AD \times \left( \frac{AF + DH}{2} \right)$ ; dunque la su- \* 7, 2.

perficie del tronco di cono **ADEB** è uguale  
 al suo lato **AD** moltiplicato per la mezza-  
 somma delle circonferenze delle sue due basi.

*Corollario.* Per il punto **I**, mezzo di **AD**,  
 conducete **IKI** parallela ad **AB**, ed **IM** pa-  
 rallela ad **AF**; si dimostrerà, come sopra,

che  $IM = \text{circ.} IK$ . Ma il trapezio  $ADHF = AD \times IM = AD \times \text{circ.} IK$ . Dunque si può ancora dire che *la superficie d'un tronco di cono è uguale al suo lato moltiplicato per la circonferenza d'una sezione fatta ad ugual distanza dalle due basi*.

Fig. 262. *Scolio.* Se una linea  $AD$  situata tutta intera da una medesima parte della linea  $OC$ , e nello stesso piano, fa una rivoluzione intorno ad  $OC$ , la superficie descritta da  $AD$  avrà per misura  $AD \times \left( \frac{\text{circ.} AO + \text{circ.} DC}{2} \right)$ , o  $AD \times \text{circ.} IK$ , essendo le linee  $AO$ ,  $DC$ ,  $IK$  perpendicolari abbassate dalle estremità, e dal mezzo della linea  $AD$  sopra l'asse  $OC$ .

Poichè, se si prolungano  $AD$ , ed  $OC$  finchè s'incontrino scambievolmente in  $S$ , è chiaro che la superficie descritta da  $AD$  è quella d'un cono troncato, delle cui basi  $AO$ , e  $DC$  sono i raggi, avendo il cono intero per vertice il punto  $S$ . Dunque questa superficie avrà la misura indicata.

Questa misura avrebbe sempre luogo quand'anche il punto  $D$  cadesse in  $S$ , il che darebbe un cono intero; ed anche quando la linea  $AD$  fosse paralella all'asse, il che darebbe un cilindro. Nel primo caso  $DC$  sarebbe nullo; nel secondo  $DC$  sarebbe uguale ad  $AO$ , e ad  $IK$ .



## PROPOSIZIONE IX. \*

## TEOREMA

*Siano AB, BC, CD più lati successivi Fig. 208.  
d' un poligono regolare, O il suo centro, ed  
OI il raggio del circolo iscritto; se si sup-  
pone che la porzion di poligono ABCD, si-  
tuata tutta da una medesima parte del dia-  
metro FG, faccia una rivoluzione intorno a  
questo diametro, la superficie descritta da  
ABCD avrà per misura  $MQ \times \text{circ. OI}$ , es-  
sendo MQ l' altezza di questa superficie, o  
la parte dell' asse compresa fra le perpendi-  
colari estreme AM, DQ.*

Essendo il punto I quello di mezzo di AB,  
ed essendo IK una perpendicolare all' asse  
abbassata dal punto I, la superficie descritta  
da AB avrà per misura  $AB \times \text{circ. IK}^*$ . Con- \* 8.  
ducete AX parallela all' asse; i triangoli ABX,  
OIK avranno i lati rispettivamente perpen-  
dicolari, cioè, OI ad AB, IK ad AX, e OK  
a BX; dunque questi triangoli son simili,  
e danno la proporzione  $AB : AX$ , o  $MN ::$   
 $OI : IK$ , o  $:: \text{circ. OI} : \text{circ. IK}$ ; dunque  $AB \times$   
 $\text{circ. IK} = MN \times \text{circ. OI}$ . Donde segue che la  
superficie descritta da AB è uguale alla sua  
altezza MN moltiplicata per la circonferenza  
del circolo iscritto. Parimente la superficie  
descritta da BC è  $= NP \times \text{circ. OI}$ ; la super-  
ficie descritta da CD è  $= PQ \times \text{circ. OI}$ . Dun-  
que la superficie descritta dalla porzion di  
poligono ABCD ha per misura  $(MN + NP +$   
 $PQ) \times \text{circ. OI}$ , o  $MQ \times \text{circ. OI}$ ; dunque è

uguale alla sua altezza moltiplicata per la circonferenza del circolo iscritto.

*Corollario.* Se il poligono intero è d'un numero pari di lati, e se l'asse FG passa per due vertici opposti F, e G, la superficie intera descritta dalla rivoluzione del mezzo-poligono FAGG sarà uguale al suo asse FG moltiplicato per la circonferenza del circolo iscritto. Quest'asse FG sarà nel tempo stesso il diametro del circolo circoscritto.

### PROPOSIZIONE X.

#### TEOREMA

*La superficie della sfera è uguale al suo diametro moltiplicato per la circonferenza d'un circolo grande.*

Dico 1.<sup>o</sup> che il diametro d'una sfera moltiplicato per la circonferenza del suo gran circolo non può misurare la superficie d'una sfera maggiore. Poichè sia, se è possibile, Fig. 264.  $AB \times circ.AC$  la superficie della sfera, che ha per raggio CD.

Al circolo, che ha per raggio CA, circoscrivete un poligono regolare d'un numero pari di lati, che non incontri la circonferenza, il cui raggio è CD; siano M, e S due vertici opposti di questo poligono; e intorno al diametro MS fate girare il mezzo-poligono MPS. La superficie descritta da questo mezzo-poligono avrà per misura  $MS \times circ.AC^*$ ; ma MS è maggiore di AB; dunque la superficie descritta dal mezzo-poligono è maggiore di  $AB \times circ.AC$ , e per conseguenza maggiore della

\* 9.

superficie della sfera, il di cui raggio è  $CD$ . Ora, per il contrario, la superficie della sfera è maggiore della superficie descritta dal mezzo-poligono, poichè la prima circonda la seconda da tutte le parti. Dunque 1.<sup>o</sup> il diametro d'una sfera moltiplicato per la circonferenza del suo gran circolo non può misurare la superficie d'una sfera maggiore.

Dico 2.<sup>e</sup> che questo stesso prodotto non può misurare la superficie d'una sfera minore. Poichè sia, se è possibile,  $DE \times circ.CD$  la superficie della sfera, che ha per raggio  $CA$ . Si farà la medesima costruzione come nel primo caso, e la superficie del solido generato dal mezzo-poligono sarà sempre uguale a  $MS \times circ.AC$ . Ma  $MS$  è minore di  $DE$ , e  $circ.AC$  minore di  $circ.CD$ : dunque con doppia ragione la superficie del solido prodotto dal mezzo-poligono sarebbe minore di  $DE \times circ.CD$ , e per conseguenza minore della superficie della sfera, il cui raggio è  $AC$ . Ora, al contrario, la superficie descritta dal mezzo-poligono è maggiore della superficie della sfera descritta col raggio  $AC$ , poichè la prima superficie circonda per ogni verso la seconda; dunque 2.<sup>o</sup> il diametro d'una sfera moltiplicato per la circonferenza del suo gran circolo non può essere la misura della superficie d'una sfera minore.

Dunque la superficie della sfera è uguale al suo diametro moltiplicato per la circonferenza del suo gran circolo.

*Corollario.* La superficie del gran circolo

si misura moltiplicando la sua circonferenza per la metà del raggio, o per la quarta parte del diametro; dunque *la superficie della sfera è quadrupla di quella d'un gran circolo.*

*Scolio.* Essendo così misurata la superficie della sfera, e paragonata a superficie piane, sarà facile d'aver il valore assoluto dei fusi, e triangoli sferici, di cui si è determinato di sopra il rapporto coll'intera superficie della sfera.

Primieramente il fuso, il cui angolo è  $A$ , stà alla superficie della sfera come l'angolo  $A$  stà a quattro angoli retti \*, o come l'arco di gran circolo, che misura l'angolo  $A$ , stà alla circonferenza di questo medesimo gran circolo. Ma la superficie della sfera è uguale a questa circonferenza moltiplicata per il diametro; dunque la superficie del fuso è uguale all'arco, che misura l'angolo di questo fuso, moltiplicato per il diametro.

In secondo luogo ogni triangolo sferico è equivalente ad un fuso, il cui angolo è uguale alla metà dell'eccesso della somma dei suoi tre angoli sopra due angoli retti \*. Siano dunque  $P, Q, R$  gli archi di gran circolo, che misurano i tre angoli del triangolo; sia  $C$  la circonferenza d'un gran circolo, e  $D$  il suo diametro: il triangolo sferico sarà equivalente al fuso, il cui angolo ha per misura  $\frac{P+Q+R-\frac{1}{2}C}{2}$ , e per conseguenza la sua su-

perficie sarà  $D \times \left( \frac{P+Q+R-\frac{1}{2}C}{2} \right)$ .

Quindi è che nel caso del triangolo tri-rettangolo ciascuno degli archi P, Q, R è uguale ad  $\frac{1}{4}C$ , la loro somma è  $\frac{3}{4}C$ , l'eccesso di questa somma sopra  $\frac{1}{2}C$  è  $\frac{1}{4}C$ , e la metà di quest'eccesso  $= \frac{1}{8}C$ ; dunque la superficie del triangolo tri-rettangolo  $= \frac{1}{8}C \times D$ , ch'è l'ottava parte della superficie total della sfera.

La misura dei poligoni sferici nasce immediatamente da quella dei triangoli, e d'altronde è interamente determinata dalla Prop. XXIII. Lib. VII., giacchè l'unità di misura, ch'è il triangolo tri-rettangolo, s'è ora valutata in superficie piana.

## PROPOSIZIONE XI.

## L E M M A

*Poste le medesime cose che nella proposizione IX; se di più il punto F, estremità dell'asse, è uno dei vertici del poligono, e si abbia  $FK < FO$ ; dico che la superficie generata dalla porzion di poligono FAI, composta di più lati interi FA, e d'un mezzo lato AI, è minore di  $FK \times \text{circ.OI}$ .* Fig. 268.

Perchè la superficie descritta dalla parte FA ha per misura  $* FM \times \text{circ.OI}$ , e la superficie descritta dal mezzo-lato AI ha per misura  $* AI \times (\frac{1}{2}\text{circ.AM} + \frac{1}{2}\text{circ.IK})$ : ora AM è minore di IK, poichè FK è minore di FO; dunque la superficie descritta da AI è minore di  $AI \times \text{circ.IK}$ , o della sua eguale  $MK \times \text{circ.OI}$ : dunque la superficie intera de-

scritta da FAI è minore di  $FM \times \text{circ.OI} + MK \times \text{circ.OI}$ , o  $FK \times \text{circ.OI}$ .

## PROPOSIZIONE XII.

## TEOREMA

*La superficie d'una zona sferica qualunque è uguale all'altezza di questa zona moltiplicata per la circonferenza d'un gran circolo.*

Fig. 271.

Sia primieramente AB un arco minore, o non maggiore del quarto della circonferenza, e sia condotta BD perpendicolare al raggio AC; dico che la zona descritta dalla rivoluzione dell'arco AB intorno ad AC ha per misura  $AD \times \text{circ.AC}$ .

Poichè supponghiamo primieramente che questa zona abbia una maggior misura, e sia, s'è possibile, questa misura  $= DE \times \text{circ.AC}$ . Circoscrivete all'arco AB una porzion di poligono regolare Bxyz, che non incontri l'arco descritto col raggio CE, e sia composto di più lati interi uzxx, seguiti da un mezzo-lato Bx (1): ciò posto la superficie descritta dal poligono Bxyz, che gira intorno a Du, è minore di  $Du \times \text{circ.AC}$ , \* ed a maggior ragione minore di  $DE \times \text{circ.}$

---

(1) Queste due condizioni saranno soddisfatte se si divida l'arco AB in un numero dispari di parti eguali, di cui una Am sia minore di AT determinata dalla tangente ET e condotta dal punto E.

AC, che, per ipotesi, è la misura della zona descritta da AB. Dunque la superficie descritta dal poligono sarebbe minore della superficie descritta dall'arco iscritto: ora, al contrario, la prima superficie è maggiore della seconda, perchè è circondata da quella per tutte le parti; dunque l'ipotesi, da cui siamo partiti, non può sussistere; dunque 1.° la misura d'una zona sferica non può esser maggiore del prodotto dell'altezza di questa zona moltiplicata per la circonferenza d'un gran circolo.

Dico in secondo luogo che la misura d'una zona sferica non può esser minore del prodotto dell'altezza di questa zona moltiplicata per la circonferenza d'un gran circolo. Poichè supponiamo che si tratti della zona descritta dall'arco FE, e sia, s'è possibile, la misura di questa zona  $= GE \times circ.AC$  minore di  $GE \times circ.CE$ . Iscrivete nell'arco EF una porzion di poligono regolare EMNF, i cui lati non incontrino l'arco descritto col raggio CA, ed abbassate CI perpendicolare sopra il lato EM. La superficie descritta dal poligono EOF avrà per misura  $EG \times circ.CI^*$ , \* 9. maggiore di  $EG \times circ.CA$ , che, per supposizione, è la misura della zona descritta dall'arco FE. Dunque la superficie descritta dal poligono FOE sarebbe maggiore della zona descritta dall'arco circoscritto FE: ora, per lo contrario, la seconda superficie è maggior della prima, poichè questa è circondata da tutte le parti. Dunque 2.° la misura d'una

zona sferica non può esser minor del prodotto dell'altezza di questa zona moltiplicata per la circonferenza d'un gran circolo.

Fig. 220. Segue da ciò che la zona descritta dall'arco DF ha per misura  $OD \times \text{circ.DC}$ , almeno finchè l'arco DF non superi la quarta parte della circonferenza. Ma la sfera intera composta di due zone descritte dagli archi DF, FE ha per misura  $DE \times \text{circ.DC}$ , o  $OD \times \text{circ.DC} + OE \times \text{circ.DC}$ ; dunque, poichè  $OD \times \text{circ.DC}$  è eguale alla zona descritta dall'arco DF, bisognerà che  $OE \times \text{circ.DC}$  sia la misura della zona descritta dall'arco FE maggiore della quarta parte della circonferenza; dunque ogni zona d'una sola base ha per misura la sua altezza moltiplicata per la circonferenza d'un gran circolo.

Consideriamo finalmente una zona qualunque descritta dalla rivoluzione dell'arco FH intorno all'asse DE, e siano abbassate sopra l'asse le due perpendicolari FO, HQ. La zona descritta dall'arco DF ha per misura  $DO \times \text{circ.DC}$ ; la zona descritta dall'arco DH ha per misura  $DQ \times \text{circ.DC}$ ; dunque la differenza di queste due zone, o la zona descritta dall'arco FH ha per misura  $(DQ - DO) \times \text{circ.DC}$ , o  $OQ \times \text{circ.DC}$ . Dunque ogni zona sferica d'una, o due basi ha per misura l'altezza di questa zona moltiplicata per la circonferenza d'un gran circolo.

*Corollario.* Due zone stanno fra loro come le rispettive altezze; ed una zona qualunque stà alla superficie della sfera come l'altezza della zona stà al diametro.



PROPOSIZIONE XIII.

TEOREMA

*Se il triangolo BAC, ed il rettangolo BCEF della medesima base, e della medesima altezza girano simultaneamente intorno alla base comune BC, il solido descritto dalla rivoluzione del triangolo sarà la terza parte del cilindro descritto dalla rivoluzione del rettangolo.* Fig. 266.  
• 267.

Abbassate sull'asse la perpendicolare AD; Fig. 266. il cono descritto dal triangolo ABD è la terza parte del cilindro descritto dal rettangolo AFBD\*; parimente il cono descritto dal triangolo ADC è la terza parte del cilindro descritto dal rettangolo ADCE; dunque la somma dei due con, o il solido descritto da ABC, è la terza parte della somma dei due cilindri, o del cilindro descritto dal rettangolo BCEF.

Se la perpendicolare AD cadesse fuor del triangolo, allora il solido descritto da ABC sarebbe la differenza dei con descritti da ABD, ACD; ma nel tempo stesso il cilindro descritto da BCEF sarebbe la differenza dei cilindri descritti da AFBD, AECD. Dunque il solido descritto dalla rivoluzione del triangolo sarà sempre la terza parte del cilindro descritto dalla rivoluzione del rettangolo della medesima base, e della medesima altezza.

*Scolio.* Il circolo, di cui AD è il raggio,

ha per superficie  $p \times \overline{AD}^2$ ; dunque  $p \times \overline{AD} \times \overline{BC}$  è la misura del cilindro descritto da  $BCEF$ ,  
 e  $\frac{p}{3} \times \overline{AD} \times \overline{BC}$  è la misura del solido descritto dal triangolo  $ABC$ .

## PROPOSIZIONE XIV.

## P R O B L E M A

Fig. 268. *Supponendosi che il triangolo CAB faccia una rivoluzione intorno la linea CD condotta a piacimento fuor del triangolo da un dei suoi vertici C, trovar la misura del solido così generato.*

Prolongate il lato AB finchè incontri l'asse CD in D; dai punti A, e B abbassate sull'asse le perpendicolari AM, BN.

Il solido descritto dal triangolo ADC ha

- \* 13. per misura  $\frac{p}{3} \times \overline{AM}^2 \times \overline{CD}$ ; il solido descritto dal triangolo CBD ha per misura  $\frac{p}{3} \times \overline{BN}^2 \times \overline{CD}$ ; dunque la differenza di questi solidi, o il solido descritto da ABC avrà per misura  $\frac{p}{3} (\overline{AM}^2 - \overline{BN}^2) \times \overline{CD}$ .

Si può dare un'altra forma a quest'espressione. Dal punto I, mezzo di AB, conducete IK perpendicolare a CD, e per il punto B conducete BO parallela a CD; si avrà

- \* 7, 3.  $\overline{AM} + \overline{BN} = 2IK$ \*, ed  $\overline{AM} - \overline{BN} = \overline{AO}$ ; dunque  $(\overline{AM} + \overline{BN})(\overline{AM} - \overline{BN})$ , o  $\overline{AM}^2 - \overline{BN}^2 = 2IK \times \overline{AO}$  \*.  
 \* 10, 5. La misura del solido, di cui si tratta, è dunque espressa ancora da  $\frac{2}{3} p \times IK \times \overline{AO} \times \overline{CD}$ .

Ma, se si abbassa CP perpendicolare sopra AB, i triangoli ABO, DCP saranno simili, e daranno la proporzione  $AO : CP :: AB : CD$ , d'onde resulta  $AO \times CD = CP \times AB$ ; d'altronde  $CP \times AB$  è il doppio dell'area del triangolo ABC; laonde si ha  $AO \times CD = 2ABC$ : dunque il solido descritto dal triangolo ABC ha ancor per misura  $\frac{4}{3}p \times ABC \times KI$ , o, il che è lo stesso,  $ABC \times \frac{2}{3} \text{circ.} KI$ ; (poichè  $\text{circ.} IK = 2p.IK$ ). Dunque il solido descritto dalla rivoluzione del triangolo ABC ha per misura l'area di questo triangolo moltiplicata per i due terzi della circonferenza, che descrive girando il punto I mezzo della sua base.

*Corollario.* Se il lato  $AC = CB$ , la linea CI Fig. 169. sarà perpendicolare ad AB, l'area ABC sarà uguale ad  $AB \times \frac{1}{2}CI$ , e la solidità  $\frac{4}{3}p \times ABC \times IK$  diventerà  $\frac{2}{3}p \times AB \times IK \times CI$ . Ma i triangoli ABO CIK sono simili, e danno la proporzione  $AB : BO$  o  $MN :: CI : IK$ ; dunque  $AB \times IK = MN \times CI$ ; dunque il solido descritto dal triangolo isoscele ABC avrà per misura  $\frac{2}{3}p \times MN \times \overline{CI}^2$ .

*Scolio.* La dimostrazion precedente sembra supporre che la linea AB prolungata incontri l'asse; ma i risultati sarebbero ugualmente veri quando la linea AB fosse parallela all'asse.

Infatti il cilindro descritto da AMNB ha Fig. 170. per misura  $p \cdot \overline{AM}^2 \cdot MN$ , il cono descritto da  $ACM = \frac{p}{3} \cdot \overline{AM}^2 \cdot CM$ , ed il cono descritto da

$BCN = \frac{p}{3} \times \overline{AM}^2 \cdot CN$ . Aggiungendo insieme i due primi solidi, e togliendone il terzo, s'avrà, per il solido descritto da ABC,  $p \cdot \overline{AM}^2 (MN + \frac{1}{3}CM - \frac{1}{3}CN)$ : ora, a motivo di  $CN - CM = MN$ , quest'espressione si riduce a  $p \cdot \overline{AM}^2 \cdot \frac{1}{3}MN$ , o  $\frac{2p}{3} \times \overline{CP}^2 \cdot MN$ ; il che si accorda coi risultati di già trovati.

## PROPOSIZIONE XV.

## TEOREMA

*Siano AB, BC, CD più lati successivi d'un poligono regolare, O il suo centro, ed Ol il raggio del circolo iscritto; se s'immagina che il settore poligono AOD situato da una stessa parte del diametro FG faccia una rivoluzione intorno a questo diametro, il solido descritto avrà per misura  $\frac{2p}{3} \cdot \overline{OI}^2 \cdot MQ$ , essendo QM la porzione dell'asse terminata dalle perpendicolari estreme AM, DQ.*

Infatti, poichè il poligono è regolare, tutti i triangoli AOB, BOC, ec. sono uguali, ed isosceli. Ora, il solido prodotto dal triangolo isoscele AOB ha per misura, secondo il corollario della proposizion precedente,  $\frac{2p}{3} \cdot \overline{OI}^2 \cdot MN$ ; il solido descritto dal triangolo BOC ha per misura  $\frac{2p}{3} \cdot \overline{OI}^2 \cdot NP$ ; ed il solido descritto dal triangolo COD ha per misura  $\frac{2p}{3} \cdot \overline{OI}^2 \cdot PQ$ . Dunque la somma di questi solidi, o il solido intero descritto dal settore poligono AOD

avrà per misura  $\frac{2p}{3} \times \overline{OI}^2 (MN + NP + PQ)$ , o  $\frac{2p}{3} \times \overline{OI}^2 . MQ$ .

## PROPOSIZIONE XVI.

## TEOREMA

*Ogni settore sferico ha per misura la zona, che gli serve di base, moltiplicata per la terza parte del raggio; e la sfera intera ha per misura la sua superficie moltiplicata parimente per la terza parte del raggio.*

Sia ABC il settor circolare, che colla sua Fig. 271.  
rivoluzione intorno ad AC descrive il settore sferico; la zona descritta da AB essendo  $AD \times \text{circ. AC}$ , o  $2p.AC . AD$ ; \* dico che il settore \* 18.  
sferico avrà per misura questa zona moltiplicata per  $\frac{1}{3} AC$ , o sia  $\frac{2p}{3} \times \overline{AC} . AD$ .

Infatti 1.<sup>o</sup> supponiamo, s'è possibile, che questa quantità  $\frac{2p}{3} \times \overline{AC} . AD$  sia la misura d'un settore sferico maggiore, per esempio, del settore sferico descritto dal settor circolare ECF simile ad ACB.

Iscrivete nell'arco EF la porzion di poligono regolare EMNF, i di cui lati non incontrino l'arco AB; immaginate quindi che il settore poligono ENFC giri intorno ad EC nel medesimo tempo del settor circolare ECF. Sia CI il raggio del circolo iscritto nel poligono, e sia abbassata FG perpendicolare sopra EC. Il solido descritto dal settore poligono avrà per misura  $\frac{2p}{3} \times \overline{CI}^2 \times EG$  \*: ora CI \* 15.

è maggiore di AC, per costruzione, ed EG è maggiore di AD; poichè, tirando AB, EF, i triangoli EFG, ABD, che son simili, danno la proporzione  $EG : AD :: EF : AB :: CF : CB$ ; dunque  $EG > AD$ .

Per questa doppia ragione  $\frac{2p}{3} \times \overline{CI}^2 \times EG$  è maggiore di  $\frac{2p}{3} \times \overline{CA}^2 \times AD$ ; la prima espressione è la misura del solido descritto dal settore poligono; la seconda è, per supposizione, quella del settore sferico descritto dal settore circolare ECF; dunque il solido descritto dal settore poligono sarebbe maggior del settore sferico descritto dal settore circolare ECF. Ora, all'opposto, è evidente che il solido di cui si parla, è minor del settore sferico, giacchè v'è contenuto. Dunque la supposizione, dalla quale siamo partiti, non può sussistere. Dunque 1.º la zona, o base d'un settore sferico moltiplicata per la terza parte del raggio non può misurare un settore sferico maggiore.

Dico 2.º che il medesimo prodotto non può misurare un settore sferico minore. Poichè sia CEF il settore circolare, che colla sua rivoluzione produce il settore sferico dato, e supponiamo, s'è possibile, che  $\frac{2p}{3} \times \overline{CE}^2 \times EG$  sia la misura d'un settore sferico minore, per esempio, di quello ch'è prodotto dal settore circolare ACB.

Restando la stessa la costruzione precedente, il solido descritto dal settore poligono

avrà sempre per misura  $\frac{2p}{3} \times \overline{CI} \times \overline{EG}^2$ ; ma  $CI$  è \* r5. minor di  $CE$ ; dunque il solido è minore di  $\frac{2p}{3} \times \overline{CE} \times \overline{EG}^2$ , che, per supposizione, è la misura del settor circolare  $ACB$ . Dunque il solido descritto dal settore poligono sarebbe minor del settore sferico descritto da  $ACB$ : ora, all'opposto, il solido, di cui si tratta, è maggior del settore sferico, poichè questo è contenuto in quello. Dunque 2.º è impossibile che la zona d'un settore sferico moltiplicata per la terza parte del raggio sia la misura d'un settore sferico minore.

Dunque ogni settore sferico ha per misura la zona, che gli serve di base, moltiplicata per la terza parte del raggio.

Un settor circolare  $ACB$  può aumentare fino a divenire uguale al mezzo-circolo; allora il settore sferico descritto dalla di lui rivoluzione è la sfera intera. Dunque *la solidità della sfera è uguale alla sua superficie moltiplicata per la terza parte del raggio.*

*Corollario.* Stando le superficie delle sfere come i quadrati dei loro raggi, queste superficie moltiplicate pe' raggi staranno come i cubi dei raggi medesimi. Dunque *le solidità di due sfere stan come i cubi dei loro raggi, o come i cubi dei lor diametri.*

*Scolio.* Sia  $R$  il raggio d'una sfera; la sua superficie sarà  $4pR^2$ , e la sua solidità  $\frac{4pR^3}{3}$ , o  $\frac{1}{3}pR^3$ . Se si chiama  $D$  il diametro, a motivo di  $R = \frac{1}{2}D$ , si ha  $R^3 = \frac{1}{8}D^3$ , e perciò la solidità esprimeasi ancora con  $\frac{1}{6}p \times \frac{1}{8}D^3$ , o  $\frac{1}{48}p.D^3$ .

## PROPOSIZIONE XVII.

## T E O R E M A

*La superficie della sfera stà alla superficie totale del cilindro circoscritto ( comprendendovi le sue basi ) come 2 stà a 3. Le solidità di questi due corpi stanno fra loro nel rapporto medesimo,*

Fig. 272. Sia MPNQ il gran circolo della sfera, ABCD il quadrato circoscritto: se si fa girare insieme il mezzo-circolo PMQ, ed il mezzo-quadrato PADQ intorno al diametro PQ, il mezzo-circolo descriverà la sfera, ed il mezzo-quadrato descriverà il cilindro circoscritto alla stessa sfera.

L'altezza AD di questo cilindro è uguale al diametro PQ; la base del cilindro è uguale al gran circolo, giacchè ha per diametro AB uguale a MN; dunque la superficie convessa del cilindro \* è uguale alla circonferenza del gran circolo moltiplicata per il suo diametro. Questa misura è la medesima di quella della superficie della sfera \*; d'onde segue che la superficie della sfera è uguale alla superficie convessa del cilindro circoscrittole.

Ma la superficie della sfera è uguale a quattro gran circoli; dunque la superficie convessa del cilindro circoscritto è anch'essa uguale a quattro gran circoli: se vi si aggiungano le due basi, che equivalgono a due gran circoli, la superficie total del cilindro circoscritto sarà uguale a sei gran circoli; dunque la superficie della sfera stà alla superficie



totale del cilindro circoscritto come 4 stà a 6, o come 2 stà a 3. Quest'è il primo punto, che si trattava di dimostrare.

In secondo luogo, poichè la base del cilindro circoscritto è uguale a un gran circolo, e la sua altezza al diametro, la solidità del cilindro sarà uguale al gran circolo moltiplicato per il diametro \*. Ma la solidità della \* 1.  
sfera è uguale a quattro gran circoli moltiplicati per la terza parte del raggio \*, il che \* 16.  
è lo stesso che un gran circolo moltiplicato per  $\frac{4}{3}$  del raggio, o per  $\frac{2}{3}$  del diametro; dunque la sfera stà al cilindro circoscritto come 2 stà a 3, e per conseguenza le solidità di questi due corpi stanno fra loro come le lor superficie.

*Scolio.* Se s'immagina un polièdro, tutte le di cui facce tocchin la sfera, questo polièdro potrà considerarsi come composto di piramidi, che hanno tutte per vertice il centro della sfera, e le cui basi sono le differenti facce del polièdro. Ora è chiaro che tutte queste piramidi avranno per altezza comune il raggio della sfera; talmente che ogni piramide sarà uguale alla faccia del polièdro, che le serve di base, moltiplicata per la terza parte del raggio: dunque il polièdro intero sarà uguale alla sua superficie moltiplicata per la terza parte del raggio della sfera iscritta.

Si vede da ciò che le solidità dei polièdri circoscritti alla sfera stanno fra loro come le superficie di questi medesimi polièdri. Di quì è che la proprietà, che abbiám dimostrata per il cilindro circoscritto, è comune a uu' infinità d'altri corpi.

Si sarebbe potuto osservare ugualmente che le superficie dei poligoni circoscritti al circolo stanno fra loro come i rispettivi contorni o perimetri .

## PROPOSIZIONE XVIII.

## TEOREMA

Fig. 273. *Supponendoci che il segmento circolare BMD faccia una rivoluzione intorno il diametro AG , che stà fuori di questo segmento , trovare il valore del solido generato .*

Abbassate sull'asse le perpendicolari BE, DF; conducete CI perpendicolar sulla corda BD; e tirate i raggi CB, CD.

- \* 16. Il solido descritto dal settore  $BCA = \frac{2}{3}p \times \overline{CB}^2 \times AE^*$ ; il solido descritto dal settore  $DCA = \frac{2}{3}p \times \overline{CA}^2 \times AF$ ; dunque la differenza di questi due solidi, o il solido descritto dal settore  $DCB = \frac{2}{3}p \cdot \overline{CB}^2 (\overline{AF} - \overline{AE}) = \frac{2}{3}p \cdot \overline{CB}^2 \cdot \overline{EF}$ . Ma il solido descritto dal triangolo isoscele DCB ha per
- \* 14. misura  $\frac{2}{3}p \cdot \overline{CI}^2 \cdot \overline{EF}^*$ ; dunque il solido descritto dal segmento  $BMD = \frac{2}{3}p \cdot \overline{EF} (\overline{CB}^2 - \overline{CI}^2)$ . Ora nel triangolo rettangolo CBI si ha  $\overline{CB}^2 - \overline{CI}^2 = \overline{BI}^2 = \frac{1}{4}\overline{BD}^2$ ; dunque, a motivo di  $CA = CB$ , il solido descritto dal segmento BMD avrà per misura  $\frac{2}{3}p \cdot \overline{EF} \cdot \frac{1}{4}\overline{BD}^2$ , o  $\frac{p}{6} \cdot \overline{BD}^2 \cdot \overline{EF}$ .

## PROPOSIZIONE XIX.

## TEOREMA

*Ogni segmento di sfera compreso fra due*

*piani paralleli ha per misura la mezza-somma delle sue basi moltiplicata per la sua altezza, più la solidità della sfera, di cui questa medesima altezza è il diametro.*

Siano BE, DF i raggi delle basi del segmento, EF la sua altezza; talmente che il segmento sia prodotto dalla rivoluzione dello spazio circolare BMDFE intorno all'asse FE. Fig. 273.

Il solido descritto dal segmento  $BMD^* = \frac{p}{6} \times \overline{BD}^2 \times EF$  \* 18.

EF; il tronco di cono descritto dal trapezio BDFE  $= \frac{p}{3} \cdot EF \cdot (\overline{BE}^2 + \overline{DF}^2 + BE \cdot DF)$ ; dunque \* 6.

il segmento di sfera, ch'è la somma di questi due solidi,  $= \frac{p}{6} \cdot EF \cdot (2\overline{BE}^2 + 2\overline{DF}^2 + 2BE \cdot DF + \overline{BD}^2)$ .

Ma, tirando BO parallela ad EF, s'avrà  $DO = DF - BE$ ,  $\overline{DO}^2 = \overline{DF}^2 - 2DF \cdot BE + \overline{BE}^2$ , \* 9. 3.

e per conseguenza  $\overline{BD}^2 = \overline{BO}^2 + \overline{DO}^2 = \overline{EF}^2 + \overline{DF}^2 - 2DF \times BE + \overline{BE}^2$ . Mettendo questo valore in

vece di  $\overline{BD}^2$  nell'espression del segmento, e scancellando ciò, che distruggesi, s'avrà per la solidità del segmento

$$\frac{p}{6} \cdot EF \cdot (3\overline{BE}^2 + 3\overline{DF}^2 + \overline{EF}^2);$$

espressione che si decompone in due parti; una

$$\frac{p}{6} \times EF \times (3\overline{BE}^2 + 3\overline{DF}^2), \text{ o } EF \cdot \left( \frac{p}{2} \cdot \overline{BE}^2 + \frac{p}{2} \cdot \overline{DF}^2 \right)$$

è la mezza-somma delle basi moltiplicata per

l'altezza; l'altra  $\frac{p}{6} \times \overline{EF}^3$  rappresenta la sfera, il cui diametro è EF \*. Dunque ogni segmento \* 16. Scol.

*Corollario.* Se una delle basi fosse nulla, il segmento, di cui si tratta, diventa un segmento sferico d'una sola base; dunque ogni segmento sferico d'una sola base ha per valore la metà del cilindro della stessa base, e della stessa altezza, più la sfera, che ha per diametro quest'altezza medesima.

*Scolio generale.*

Sia  $R$  il raggio della base d'un cilindro,  $H$  la sua altezza; la solidità del cilindro sarà  $pR^2 \times H$  o  $pR^2H$ .

Sia  $R$  il raggio della base d'un cono,  $H$  la sua altezza; la solidità del cono sarà  $pR^2 \times \frac{1}{3}H$ , o  $\frac{1}{3}pR^2H$ .

Siano  $A$ , e  $B$  i raggi delle basi d'un cono troncato,  $H$  la sua altezza; la solidità del tronco di cono sarà  $\frac{p}{3}H(A^2 + B^2 + A.B)$ .

Sia  $R$  il raggio d'una sfera; la sua solidità sarà  $\frac{4}{3}pR^3$ .

Sia  $R$  il raggio d'un settore sferico,  $H$  l'altezza della zona, che gli serve di base; la solidità del settore sarà  $\frac{2}{3}pR^2H$ .

Siano  $P$ , e  $Q$  le due basi d'un segmento sferico,  $H$  la sua altezza; la solidità di questo segmento sarà  $\left(\frac{P+Q}{2}\right)H + \frac{1}{6}pH^3$ .

Se il segmento sferico ha una sola base  $P$ , essendo l'altra nulla, la sua solidità sarà  $\frac{1}{2}PH + \frac{1}{6}pH^3$ .

*Fine degli Elementi di Geometria.*